

الدّوال الأّسيّة

1. الدالة الأسية النميرية:

أ. تعريف:

الدالة العكسية للدالة \ln تسمى الدالة الأسية النميرية و نرمز لها ب :
 $\exp(x) = e^x$ ملاحظة:

ب. نتائج :

$$\begin{cases} e^x = y \\ (x \in \mathbb{R}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \ln(y) \\ (y > 0) \end{cases} \diamond$$

$$\exp: \mathbb{R} \mapsto [0, +\infty[\quad \diamond$$

$$x \mapsto \exp(x) \quad \diamond$$

$\forall x \in \mathbb{R}: e^x > 0$ و $D_{\exp} = \mathbb{R}$ \diamond
ليكن x و y من \mathbb{R} لدينا :

$$e^x = e^y \Leftrightarrow x = y \quad \bullet$$

$$e^x < e^y \Leftrightarrow x < y \quad \bullet$$

$$e^x \geq e^y \Leftrightarrow x \geq y \quad \bullet$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: \ln(e^x) = x \quad \diamond$$

$$\forall x > 0: e^{\ln x} = x \quad \diamond$$

$$e^1 = e \quad \text{و} \quad e^0 = 1 \quad \diamond$$

ج. العمليات :

ليكن x و y من \mathbb{R} لدينا :

$$e^x \times e^y = e^{x+y} \quad (1)$$

$$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y} \quad (2)$$

$$\frac{1}{e^x} = e^{-x} \quad (3)$$

$$(r \in \mathbb{Q}) \quad (e^x)^r = e^{rx} \quad (4)$$


د. النهايات:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0^-$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = \begin{cases} 0^+ & n : \text{pair} \\ 0^- & n : \text{impair} \end{cases}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	

٥. الاشتراق و الأصلية:

الأصلية	الدالة
e^x $\frac{1}{r}e^{rx}$ $e^{U(x)}$	e^x e^{rx} $U'(x)e^{U(x)}$

و. التمثيل المباني للدالة \exp



2. الدالة الأسيّة للأساس a حيث $a \neq 1$ و $a > 0$

أ. تعريف:

الدالة الأسيّة للأساس a هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :

ب. نتائج:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exp_a(x) = a^x = e^{x \ln a} \quad \diamond$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \ln(a^x) = x \ln a \quad \diamond$$

$$\begin{cases} \exp_a(x) = y \\ (x \in \mathbb{R}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \log_a(y) \\ (y > 0) \end{cases} \quad \diamond$$

$$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y \quad \diamond$$

ج. العمليات :

ليكن x و y من \mathbb{R} لدينا :

$\frac{1}{a^x} = a^{-x}$ ♦♦♦	$a^x \times a^y = a^{x+y}$ ♦♦♦
$(a^x)^y = a^{xy}$ ♦♦♦	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ ♦♦♦

د. الإشتقاق والتغيرات :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (a^x)' = \ln a \times a^x$$

نتيجة :

<ul style="list-style-type: none"> إذا كان : $a > 1$ • فإن \exp_a تزايدية قطعا على \mathbb{R} $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = +\infty$
<ul style="list-style-type: none"> إذا كان : $0 < a < 1$ • فإن \exp_a تناظرية قطعا على \mathbb{R} $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = 0$