

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2022

- الموضوع -

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم الأول والثالث

المركز الوطني للتقويم والامتحانات



المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم الأول والثالث

المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NS 34

3

مدة الإجابة

علوم الحياة والأرض

المادة

5

المعامل

شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية

الشعبة أو المسلك

الجزء الأول: استرداد المعارف (5 ن)

I. أجب (ي) في ورقة تحريرك على الأسئلة الآتية:

1. عرف (ي): السلسلة التنفسية - المردود الطاقوي. (1 ن)

2. أذكر (ي) مسلكين استقلابيين لتجديد جزيئة ATP داخل الخلية العضلية وأكتب (ي) المعادلة الإجمالية لكل منهما. (1 ن)

II. يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرفقة من 1 إلى 4. أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك (ك) ثم أكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المناسب للاقتراح الصحيح. (2 ن)  
(1, ...) - (2, ...) - (3, ...) - (4, ...)

1. في مستوى الميتوكوندري:

- تنتقل الكرية ذات شمراخ  $H^+$  إلى الحيز البيغشائي؛
- الكرية ذات شمراخ مسؤولة عن تفسر ADP؛
- يضم الغشاء الخارجي البروتينات التي تنقل الإلكترونات إلى ثنائي الأوكسجين؛
- يضم الغشاء الخارجي أنزيمات أكسدة-اختزال.

2. يتم اختزال  $NAD^+$  إلى  $NADH, H^+$  أثناء:

- انحلال الكليكوز وتفاعلات حلقة كربيس؛
- انحلال الكليكوز وتفاعلات السلسلة التنفسية؛
- دورة كربيس وتفاعلات السلسلة التنفسية؛
- تفاعلات السلسلة التنفسية وتفسر ADP.

3. تبين فوق بنية الساركومير أن:

- الشريط الداكن محاط بحزي Z؛
- الشريط الداكن محاط بشريطي H؛
- الساركومير محاط بحزي Z؛
- الساركومير محاط بشريطي H.

4. تتشكل الخييطات الدقيقة للييف العضلي من:

- الأكتين والميوزين والتروبونين؛
- الأكتين والميوزين والتروبوميوزين؛
- الأكتين والتروبونين والتروبوميوزين؛
- الميوزين والتروبونين والتروبوميوزين.

III. أنقل (ي) على ورقة تحريرك الأزواج (1, ...) - (2, ...) - (3, ...) - (4, ...)؛ ثم أنسب (ي) لكل رقم من الأرقام الأربعة للمجموعة 1 الحرف المناسب له من الحروف الخمسة للمجموعة 2 (1 ن).

المجموعة 2: المفعول

أ. تثبتت على التروبونين.

ب. تثبتت على رأس الميوزين.

ج. متقبل نهائي للإلكترونات.

د. حلماة ATP.

هـ. ناقل للهيدروجين.

المجموعة 1: العناصر الكيميائية

1. ثنائي الأوكسجين

2.  $Ca^{2+}$ 3.  $NADH, H^+$ 

4. ATP


الجزء الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين 1 (5 نقط)


في إطار دراسة تعبير الخبر الوراثي وانتقاله، نقدم المعطيات الآتية:

**I.** فقر الدم "Blackfan-Diamond" مرض وراثي نادر يتميز أساسا بنقص حاد في عدد الكريات الحمراء وفي كمية الخضاب الدموي المتواجد بهذه الخلايا، بالإضافة إلى وهن عضلي ومشاكل في التنفس وفي عمل القلب. لتحديد الأصل الوراثي لهذا المرض، نقترح المعطيات الآتية:

❖ **المعطى الأول:** نقوم بقياس كمية الوحدات الكبرى وكمية الوحدات الصغرى للريبوزوم عند شخص مريض وعند شخص سليم. يبين الشكل (أ) من الوثيقة 1 نتائج هذا القياس ويبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة دور الريبوزومات في تركيب الخضاب الدموي داخل الخلايا الأصل للكريات الحمراء عند شخص سليم وعند شخص مريض.



كمية وحدات الريبوزوم (UA)



الشكل (ب)

الوحدة الصغرى للريبوزوم (●) الوحدة الكبرى للريبوزوم (○)

الوثيقة 1

الشكل (أ)

1. اعتمادا على الشكل (أ) من الوثيقة 1، قارن كمية الوحدات الصغرى بكمية الوحدات الكبرى للريبوزومات عند الشخص السليم، ثم عند الشخص المصاب. **فسر(ي)**، انطلاقا من الشكل (ب) للوثيقة 1، نقص الخضاب الدموي الملاحظ عند الشخص المصاب. (1ن)

❖ **المعطى الثاني:** بينت التحاليل، عند الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، أن الخلايا الأصل (précurseurs) للكريات الحمراء تعرف نقصا في إنتاج بروتين RSP19 الضروري لإنتاج الوحدات الصغرى للريبوزوم. وقد تمكن الباحثون من التعرف على المورثة الرامزة لهذا البروتين. تقدم الوثيقة 2 جزء من الخيط غير المنسوخ من التحليل العادي عند شخص سليم وجزء من الخيط غير المنسوخ من التحليل غير العادي المسؤول عن المرض. تقدم الوثيقة 3 مستخرجا من جدول الرمز الوراثي.

11	15	20	أرقام الثلاثيات
CAGCAGGAGTTCGTCAGAGCCCTAAGAAGA			جزء الخيط غير المنسوخ للتحليل العادي
CAGCAGGAGTTCCTCAGAGCCCGAAGAAGA			جزء الخيط غير المنسوخ للتحليل غير العادي
منحى القراءة →			


الوثيقة 2

CGA	AUA	CAA	CUU	GCU	GUU	GAA	UUU	الوحدات الرمزية
AGA	AUU	CAG	CUA	GCC	GUC	GAG	UUC	
Arg	Ile	Gln	Leu	Ala	Val	Ac.glu	Phe	الأحماض الأمينية

الوثيقة 3

2. بالاعتماد على الوثيقتين 2 و3، أعط (ي) متتالية ARNm ومنتالية الأحماض الأمينية المقابلة لجزء الحليل العادي وجزء الحليل غير العادي ثم بين (ي) العلاقة موروثة - بروتين - صفة. (5,1 ن)

II. من أجل دراسة كيفية انتقال صفتين وراثيتين تتعلقان بقدر الأجنحة ولون الجسم عند ذبابة الخل، تم إنجاز التزاوجين التاليين باستعمال ثلاث سلالات: سلالتان A و B ذات أجنحة طويلة ( $vg^+$ ) و جسم فاتح ( $b^+$ ) والسلالة C ذات أجنحة أثرية ( $vg$ ) و جسم أسود (b).



الوثيقة 4

• التزاوج الأول: تم بين أفراد من السلالة A وأفراد من السلالة C. أعطى هذا التزاوج جيلا مكونا من أفراد جميعهم بأجنحة طويلة و جسم فاتح.

تقدم الوثيقة 4 التوضع النسبي في الصبغي رقم 2 للمورثتين المسؤولتين عن الصفتين المدروستين.

3. باستثمار نتائج التزاوج الأول ومعطيات الوثيقة 4، حدد (ي) كيفية انتقال المورثتين المدروستين. (5,0 ن)

• التزاوج الثاني: تم بين أفراد من السلالة B وأفراد من السلالة C. أعطى هذا التزاوج النتائج الآتية:

مظهران خارجيان أبويان	مظهران خارجيان جديدا التركيب
- ذبابات خل بأجنحة طويلة و جسم فاتح؛	- ذبابات خل بأجنحة طويلة و جسم أسود؛
- ذبابات خل بأجنحة أثرية و جسم أسود.	- ذبابات خل بأجنحة أثرية و جسم فاتح.

4. اعتمادا على نتيجة التزاوجين ومعطيات الوثيقة 4، أعط (ي) الأنماط الوراثية للسلالات الثلاث A و B و C، علل (ي) إجابتك. (1 ن)


استعمل (ي) الرموز الآتية: ( $vg^+$ ,  $vg$ ) بالنسبة للحليلين المسؤولين عن قد الأجنحة و ( $b^+$ ,  $b$ ) بالنسبة للحليلين المسؤولين عن لون الجسم.

5. اعتمادا على الوثيقة 4 ومستعينا بشبكة التزاوج، أعط (ي) التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني (سلالة B × سلالة C) محددًا النسب المنتظرة لكل من الأمشاج ومختلف المظاهر الخارجية. (1 ن)


### التمرين 2 (5 نقط)

يؤدي نظام الزراعة المكثف للأرز إلى رفع الإنتاجية، لكنه يشكل مصدرا لانبعاث غاز الميثان الذي يعتبر من الغازات الدفيئة. لإبراز الآثار السلبية لهذا النظام واقتراح تدابير للحد من تأثيره على البيئة، نقترح دراسة المعطيات التالية:

● **المعطي الأول:** في عدة مناطق من العالم يقوم المزارعون بتحويل مساحات كبيرة من المستنقعات إلى مزارع للأرز، ونتيجة لذلك ارتفعت مساحات مزارع الأرز على حساب مساحات المستنقعات، حيث انخفضت بشكل مهم بين سنتي 1800 و2000. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 تغير كمية الميثان في الغلاف الجوي بين سنتي 1600 و2000، ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة، مساهمة مختلف مصادر الميثان في الإنتاج العالمي لهذا الغاز في الغلاف الجوي خلال سنة 1986 كما يوضح الشكل (ج) نسبة مساهمة الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري.



الوثيقة 1



1. باستغلالك للشكل (أ) من الوثيقة 1 ، صف (ي) تغير كمية الميثان في الغلاف الجوي. (0.5 ن)


2. باستغلالك للمعطي الأول وأشكال الوثيقة 1، بيّن (ي) العلاقة بين زراعة الأرز والاحتباس الحراري. (1.25 ن)

● **المعطي الثاني:** يبين الشكل (أ) من الوثيقة 2 مراحل تشكل الميثان في تربة مزرعة الأرز بواسطة البكتيريا. ويبين الشكل (ب) مساحة مزارع الأرز وكمية الأرز المنتجة خلال سنتي 1950 و1986 على المستوى العالمي.

سنة 1986	سنة 1950	الشكل (ب)
2 000 000	200 000	مساحة مزارع الأرز (ب : الهكتار)
8 000 000	300 000	إنتاج الأرز (ب الطن/سنة)

ملحوظة: يحرر كل هكتار من مزارع الأرز 0.6 طن من الميثان في السنة.

الوثيقة 2




ملحوظة: ميتانوتريكس (*Methanotrix*) بكتيريا حي لاهوائية قادرة على إنتاج الميثان (*bactérie méthanogène*) وتوجد في تربة مزارع الأرز.

3. بالاعتماد على الشكل (أ) من الوثيقة 2، فسّر (ي) تشكل الميثان في مزارع الأرز. (0.5 ن)

4. بالاعتماد على الشكل (ب) من الوثيقة 2، أحسب (ي) كمية الميثان التي حررتها مزارع الأرز خلال سنة 1950 و خلال سنة 1986، ثم فسّر (ي) كيف تساهم مزارع الأرز في تطور كمية الميثان الملاحظة بعد سنة 1950 في الوثيقة 1. (1.5 ن)

● المعطى الثالث : من أجل إيجاد حلول لمشكلة التلوث المرتبط بزراعة الأرز، نقترح استغلال الوثيقة 3.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 3 نتيجة دراسة حول تأثير طرق الري على انبعاثات غاز الميثان.
- يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تستهلك الميثان في وجود ثنائي الأوكسجين (La méthanotrophie) وتستعمله كمصدر للكربون والطاقة. يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 3 نتيجة دراسة حول إنتاج الميثان في وجود وفي غياب هذه البكتيريا.




الوثيقة 3

5. باستغلالك للوثيقة 3، قارن (ي) النتائج المحصل عليها في كل دراسة، ثم اقترح (ي) حلين من أجل تقليص تأثير التلوث المرتبط بزراعة الأرز. (1.25 ن)

### التمرين 3 (5 نقط)

يلاحظ في مستوى مناطق الطمر، وجود نشاط صهاري مهم مصحوب ببركانية انفجارية. نقبل حالياً أن هذه الصهارة ناتجة عن الانصهار الجزئي لصخور البيريدوتيت المشكّلة للرداء. تبين الوثيقة 1 بعض خصائص منطقة الطمر ومكان تموضع الصهارة وكذا موقع صخرتين A و B من القشرة المحيطية.




الوثيقة 1

1. انطلاقاً من الوثيقة 1، استخراج (ي) أربع خصائص مميزة لمنطقة الطمر. (1ن)

تقدم الوثيقة 2 :

■ النتائج التجريبية لانصهار صخرة البيريدوتيت حسب ظروف الضغط ودرجة الحرارة، في حالتين:




- حالة البيريدوتيت غير المميَّهة ①؛
- حالة البيريدوتيت المميَّهة ②.

2. باستثمار معطيات الوثيقة 2،  
قارن (ي) النتائج التجريبية للانصهار  
الجزئي للبيريدوتيت، ثم حدد (ي)  
الشروط الضرورية للانصهار الجزئي  
للبيريدوتيت. (1ن).

3. انطلاقا من معطيات الوثيقة 1،  
بين (ي) أن هذه الشروط تتحقق في  
منطقة الطمر. (1ن).

من أجل تحديد كيفية تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت في منطقة الطمر، نقدم الوثيقة 3 التي تبين رسمين مبسطين لصفيحتين دقيقتين (الشكلان أ و ب)، للصخرتين A و B المشار إلى موقعهما في الوثيقة 1. ويمثل الشكل (ج) التفاعل العيداني المميز للتحويل المسؤول عن تشكل الصخور المتحولة بهذه المنطقة. ويعطي الشكل (د) مجالات استقرار بعض المجموعات المعدنية بدلالة الضغط ودرجة الحرارة.



4. اعتمادا على أشكال الوثيقة 3، استخراج (ي) ظروف الضغط ودرجة الحرارة لتشكل الصخرتين A و B، واستنتج (ي) نمط التحويل السائد في هذه المنطقة. ثم بين (ي) العلاقة بين التغيرات التي خضعت لها صخور الغلاف الصخري المنغرز وتشكل الصهارة في منطقة الطمر. (2 ن)

\*\*\* § انتهى § \*\*\*