

## تصحيح الفرض 01

② - صورة A (Z<sub>A</sub>) صورة E (Z<sub>E</sub>) بالدوران E :

$$Z_A = e^{i\frac{\pi}{3}} Z_E \quad \text{تعني}$$

$$Z_A = i \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right); \quad Z_E = e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{حيث}$$

$$Z_A = \frac{1}{2} i + \frac{\sqrt{3}}{2} i, \quad Z_E = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$Z_A = \frac{Z_B + Z_O}{2} \Leftrightarrow \text{A منتصف } [OB]$$

$$\frac{Z_B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i = Z_A$$

إذن A منتصف [OB].

- 1 - ③

صورة C (Z<sub>C</sub>) صورة E (Z<sub>E</sub>) بالإضافة T: Z<sub>E</sub> = 2i

$$Z_C = Z_E + 2i \quad \text{تعني}$$

$$Z_C = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i + 2i$$

$$Z_C = \frac{1}{2} + i \left( 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \frac{\frac{1}{2} + i \left( 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} i}{\sqrt{3} + i - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} i}$$

$$= \frac{1 + i(4 - \sqrt{3}) - \sqrt{3} - i}{2\sqrt{3} + 2i - \sqrt{3} - i}$$

$$= \frac{(1 - \sqrt{3}) + i(3 - \sqrt{3})}{\sqrt{3} + i}$$

$$= \frac{[(1 - \sqrt{3}) + i(3 - \sqrt{3})][\sqrt{3} - i]}{4}$$

$$= \frac{-4i + 4i\sqrt{3}}{4}$$

$$= (\sqrt{3} - 1)i$$

التصحيح الأول :

$$Z^2 - 2\sqrt{3}Z + 4 = 0 \quad \text{I}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Leftrightarrow \Delta = 12 - 16$$

$$\Delta = -4$$

$$\Delta = (2i)^2$$

$$Z_1 = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} \quad \text{أو} \quad Z_2 = \frac{2\sqrt{3} - 2i}{2}$$

$$Z_1 = \sqrt{3} + i \quad \text{و} \quad Z_2 = \sqrt{3} - i$$

$$S = \{ \sqrt{3} + i, \sqrt{3} - i \}$$

II

$$Z_B = \sqrt{3} + i \quad \text{①}$$

$$Z_B = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$Z_B = 2 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$Z_B = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$Z_D = \sqrt{3} - i \quad \text{II}$$

$$Z_D = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} i \right)$$

$$= 2 \left( \cos \left( -\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{6} \right) \right)$$

$$= 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

$$\left( \frac{b}{d} \right) = \frac{[2, \frac{\pi}{6}]}{[2, -\frac{\pi}{6}]} = [1, \frac{\pi}{3}]$$

$$\arg \left( \frac{b-d}{d-d} \right) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

$$(\vec{OB}, \vec{OD}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

إذن OBD مثلث متساوي الأضلاع

التعمير الثاني:

الجزء الأول:

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / 1-x > 0\}$  -1

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x < 1\}$

$D_g = ]-\infty, 1[$

-2

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x - \ln(1-x)$

$= -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1-x) = +\infty$  لأن

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x - \ln(1-x)$

$= +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1-x) = -\infty$

-2 حساب المشتقة  $g'(x)$ :

$g'(x) = 1 - \frac{(1-x)'}{1-x}$

$g'(x) = 1 + \frac{x}{1-x}$

$g'(x) = \frac{2-x}{1-x} = \frac{x-2}{x-1}$

	$-\infty$	0	1
$g'(x)$		+	
$g(x)$	$-\infty$		$+\infty$

لدينا على المجال  $g(]-\infty, 0[) = ]-\infty, 0[$  ;  $]-\infty, 0[$

$\forall x \in ]-\infty, 0[$   $g(x) < 0$  إذن

وعلى المجال  $g(]0, 1[) = ]0, +\infty[$   $]0, 1[$

$\forall x \in ]0, 1[$   $g(x) > 0$  إذن

نبين أن (CD) واسط [OB].

لدينا OBD مثلث متساوي الأضلاع

و A منتصف [OB]

إذن  $(AD) \perp (AB)$

و لدينا  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$  إذن:

$\arg(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$


وعليه  $(AC) \perp (AB)$

إذن  $ABC$  قائم الزاوية في A.

وبالتالي A تنتمي إلى المستقيم (CD)

و A منتصف [OB]

إذن (CD) واسط القطعة [OB].



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + \ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1-x) = -\infty$$

$x$	$-\infty$			$1$
$\ln(1-x)$			+	

لأن  $f$  غير قابلة للاشتقاق على مسار 1

وبالتالي  $f$  يقبل مقارباتها  $x=1$

### 3- حساب المشتقة:

$$f'(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \times 2x \times \frac{1}{1-x} \times \ln(1-x)$$

$$= \frac{1-x + \ln(1-x)}{1-x}$$

$$= \frac{x - \ln(1-x)}{x-1}$$

$$= \frac{g(x)}{x-1}$$

$x$	$-\infty$	$0$	$1$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$0$	$-\infty$

### 4- الوضع النسيب $f$ و $y=x$

$$f(x) - y = \ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2$$

$$\ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2 = 0 \quad \text{لحل المعادلة}$$

$$\ln(1-x) \left( 1 - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2 \right) = 0$$

$$\ln(1-x) = 0 \quad \text{أو} \quad 1 - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2 = 0$$

$$\ln(1-x) = \ln(1) \quad \text{أو} \quad \ln(1-x) = 2$$

$$x = 0 \quad \text{أو} \quad x = -e^2 + 1$$

$$f(x) = x + \ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln \sqrt{x^2}}{\sqrt{x}} \right)^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2 \ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2$$

$$= 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2$$

$$x = 1-x \quad \text{نضع}$$

$$x \rightarrow -\infty \Leftrightarrow x \rightarrow +\infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1-x + \ln(x) - \frac{1}{2} (\ln(x))^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{1}{x} - 1 + \frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{2} \frac{(\ln(x))^2}{x} \right)$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1-x) - \frac{1}{2} (\ln(1-x))^2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1-x) \left( 1 - \frac{1}{2} \ln(1-x) \right)$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1-x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{1}{2} \ln(1-x) = -\infty$$

$f$  يقبل فرعاً متديجياً باتجاه

المتشعب  $y=2$  بجوار  $-\infty$

⑤ رتابة المتتالية  $u_n$

$u_0 = -1$  و  $u_1 = -0,54$

$u_0 > u_1$

نفترض ان  $u_n > u_{n+1}$

ونريد ان  $u_{n+1} > u_{n+2}$

لدينا  $u_n > u_{n+1}$

و  $f$  تنازلية على  $] -\infty, 0[$

اذن  $f(u_n) > f(u_{n+1})$

$u_{n+1} > u_{n+2}$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n > u_{n+1}$  فاذن

وعليه فان  $u_n$  تناقصية.

3- نهاية  $u_n$ :

$u_n$  تناقصية ومحدودة بـ  $1-e^2$

اذن  $u_n$  متقاربة

$u_n(1-n) \rightarrow 0$  متصلة على

$]1-e^2, 0[$

اذن  $f$  متصلة على  $]1-e^2, 0[$

$f(]1-e^2, 0[) = ]1-e^2, 0[$

$f(]1-e^2, 0[) \subset ]1-e^2, 0[$


نماية  $u_n$  هي حل للمعادلة  $f(x) = x$

حسب المنحنى:  $x = 1-e^2$ ;  $x = 0$

اذن  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

الجزء: جميع حاكمة

$x$	$-\infty$	$1-e^2$	$0$	$1$
$f(x) - x$		-	+	-
الوضع النسبي لـ $f$ و $y=x$		تحت $y=x$	فوق $y=x$	تحت $y=x$



الجزء 03

1- نبين ان  $1-e^2 < u_n < 0$

من اجل  $n=0$   $1-e^2 < u_0 = -1 < 0$  (v)

نفترض ان  $1-e^2 < u_n < 0$

ونريد ان  $1-e^2 < u_{n+1} < 0$

لدينا  $1-e^2 < u_n < 0$

و  $f$  دالة تنازلية على  $]1-e^2, 0[$

اذن  $f(1-e^2) < f(u_n) < f(0)$

$1-e^2 < u_{n+1} < 0$