

التمرين الأول

(I) حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة : $Z^2 - 2\sqrt{3}Z + 4 = 0$ (II) المستوى العقدي (P) منسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) نعتبر نقطتين B ; D اللتين $\frac{\pi}{2}$ لقاهما على التوالي i و يكن R الدوران الذي مركزه O و زاويته $\frac{\pi}{2}$ 1) حدد الرمز الأسوي للعدد z_B و بين أن OBD مثلث متساوي الأضلاع2) نعتبر النقطة E ذات اللحق ذات النقطة A صورة النقطة E بالدوران R و يكن z_A

$$\text{بين أن } z_A = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \text{ و استنتج أن } A \text{ منتصف } [OB]$$

3) أ- أثبت أن $z_C = \frac{1}{2} + i \left(2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ هو لحق النقطة C صورة النقطة E بالإزاحة T التي مجدها $2\vec{v}$

$$\text{ب- بين أن } i \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = (\sqrt{3} - 1)i \text{ و استنتاج أن } (CD) \text{ واسط الفطعة } [OB]$$

التمرين الثاني

الجزء (1) : لنكن g دالة بحيث $g(x) = x - \ln(1-x)$ 1) حدد مجموعة تعريف g وأحسب النهايتين $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} g(x)$ 2) أحسب $(g')'$ و بين أن g تزايدية قطعا على $[-\infty, 1]$ 3) أبغز جدول تغيرات الدالة g و استنتاج إشارة $(g(0)=0)$ (لاحظ أن $g'(0)=1$)الجزء (2) : نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[-\infty, 1]$ بما يلي :

$$1) \text{ أ- بين أن } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ ثم استنتاج أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = -\infty$$

ب- بين أن المستقيم $y = x$ (Δ) اتجاه مقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$

$$2) \text{ بين أن } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty \text{ و أعط تاويلا هندسيا للنتيجة}$$

$$3) \text{ أ- أحسب المشتقة } (f')(x) \text{ و بين أن } f'(x) = \frac{g(x)}{x-1}$$

ب- ضع جدول تغيرات الدالة f 4) أ- أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم $y = x$ (Δ)ب- أرسم للمنحنى (C_f) و المستقيم $y = x$ (Δ) (نأخذ $1 - e^2 \approx -6,4$)الجزء (3) : نعتبر المتالية (U_n) المعرفة بما يلي :

$$1) \text{ بين أن } 0 < U_n < 1 - e^{-2} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

2) أدرس رتبة المتالية $(U_n)_n$ 3) استنتاج أن المتالية $(U_n)_n$ متقاربة وحدد نهايتها