

## عناصر الإجابة و سلم التنقيط

### أولا : استرداد المعارف :

ينتج التحول الدينامي حراري عن ارتفاع مهم في قيم الضغط و الحرارة الذين تعرفهما منطقة الاصطدام بين صفيحتين تكتونيتين من الغلاف الصخري القاري ، مما يؤدي إلى ظهور المتتالية التحولية الطينية

طين ----- شيبست ----- ميكاشيبست ----- غنايس ( 0.25 ن )

إلا أن تجاوز قيم الضغط و الحرارة لمجال التحول يخضع الغنايس لبداية الانصهار أو الانصهار الجزئي ، يسمى مجال الانصهار الجزئي هذا بمجال الأنتيكتية و ينتج عنه جزء صلب يمثله ما تبقى من الغنايس و جزء سائل له تركيب الغرانيت ، فهو عبارة عن صهارة غرانيتية ( 0.5 ن )

يؤدي انخفاض الضغط و الحرارة ، إلى التبلور البطيء للصهارة الغرانيتية الناتجة:

\* فيعطي جزء الصهارة المختلط ببقايا الغنايس عند تبلوه صخرة يختلط فيها الغنايس بالگرانيت لإعطاء صخرة وسيطة تسمى الميكمايت ، صخرة شاهدة على الانتقال من التحول إلى الأنتيكتية ( 0.25 ن )

\* في حين تعطي الصهارة المتعددة عن الغنايس صخرة الغرانيت ، يسمى هذا النوع من الغرانيت المرتبط بالميكمايت بالگرانيت الأنتيكتي ذو البنية المحببة. ( 0.5 ن )

في بعض الأحيان و بسبب انخفاض كثافة الصهارة الغرانيتية يمكنها أن تستغل الشقوق و الفوالق الناتجة عن الاصطدام لتتحرك من الأعماق نحو السطح هذه الهجرة تخضعها لانخفاض الضغط و الحرارة ، فتندس في الطبقات الصخرية القديمة لتحدث تحول التماس ثم تبلور ببطء لإعطاء الغرانيت الاندساسى ذو البنية المحببة و الذي يتميز بإحاطته بهالة تحولية. ( 0.5 ن )

### ثانيا : استثمار المعارف و المعطيات :

- 1- سحنة التحول هي مجموع ظروف الضغط و الحرارة التي حدث فيها التحول ( 0.5 ن )
- 2- انقلاع مياسر لانتقال كل كتلة إلى يسار الأخرى ( 0.5 ن )
- 3- سحنة الشيبست الأزرق : P و T منخفضتين ( 0.5 ن )  
سحنة الإيكولوجيت : P و T متوسطتين ( 0.5 ن )  
سحنة UHP : مرتفعة و T متوسطة ( 0.5 ن )
- 4- يتكون الماس عند  $250 < T < 580$  و  $30 < P < 40$  (  $2 \times 0.5$  ن )
- 5- يتكون الماس عند نهاية الرداء العلوي و بداية الأسطينوسفير ( 1 ن )
- 6- تحول دينامي ( 1 ن )
- 7- ظاهرة الاصطدام ( 0.5 ن )  
سلسلة اصطدام ( 0.5 ن )
- 8- أدى الاصطدام إلى تشوه المنطقة و ظهور طيات و فوالق معكوسة ، فارتفعت الكتل الباطنية للغلاف الصخري حاملة معها معدن الماس نحو السطح . ( 1.5 ن )