

## الأعداد العقدية

### (IV) التمثيل الهندسي لعدد عقدي.

نفترض أن المستوى  $P$  منسوب إلى معلم متقاعد ممنظم  $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

#### (1) تعريف:

(a) لكل  $M(x, y)$  من  $P$  العدد  $z = a + ib$  يسمى لحق النقطة  $M$  ونكتب  $aff(M)$ .

(b) لكل  $\vec{u}(x, y)$  من  $\vec{v}$  من العدد  $z = a + ib$  يسمى لحق المتجهة  $\vec{u}$  ونكتب  $aff(\vec{u}) = z$ .

(c) لكل  $z = a + ib$  من  $\mathbb{C}$  النقطة  $M(x, y)$  تسمى صورة العدد  $z$  في  $P$  ونكتب  $M(z)$ .

(d) لكل  $z = a + ib$  من  $\mathbb{C}$  المتجهة  $\vec{u}(x, y)$  تسمى صورة العدد  $z$  في  $v_2$  ونكتب  $\vec{u}(z)$ .

(ملاحظة:  $aff(\vec{e}_2) = i$  .  $aff(\vec{e}_1) = 1$  .  $aff(o) = 0$ )

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow M(z) \in (x'ox) \\ z \in \mathbb{R}^+ &\Leftrightarrow M(z) \in [ox] \\ z \in \mathbb{R}^- &\Leftrightarrow M(z) \in (x'o] \end{aligned} \quad (b)$$

$$\begin{aligned} z \in i\mathbb{R} &\Leftrightarrow M(z) \in (y'oy) \\ z \in i\mathbb{R}^+ &\Leftrightarrow M(z) \in [oy] \\ z \in i\mathbb{R}^- &\Leftrightarrow M(z) \in (y'o] \end{aligned} \quad (c)$$

#### (2) خاصيات:

$$\begin{aligned} aff(M) = aff(M') &\Leftrightarrow M = M' \\ aff(\overline{MM'}) &= aff(M') - aff(M) \\ MM' &= |aff(M') - aff(M)| \end{aligned} \quad (a)$$

$$\begin{aligned} aff(\vec{u}) = aff(\vec{v}) &\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v} \\ aff(\vec{u} + \vec{v}) &= aff(\vec{u}) + aff(\vec{v}) \\ aff(\alpha\vec{u}) &= \alpha aff(\vec{u}) \\ \|\vec{u}\| &= |aff(\vec{u})| \end{aligned} \quad (b)$$

(c) ليكن  $G$  مرجع  $\{(A, \alpha)(B, \beta)\}$  لدينا

$$aff(G) = \frac{1}{\alpha + \beta} (\alpha aff(A) + \beta aff(B))$$

(d) ليكن  $I$  منتصف  $[AB]$

(e) لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  ثلاث نقط الحاقها على التوالي  $z_C, z_B, z_A$  بحيث  $A \neq B$  تكون النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمة إذا فقط إذا كان

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

### (I) عموميات.

(1)  $\mathbb{C} = \{z = a + ib / (a, b) \in \mathbb{R}^2, i^2 = -1\}$  كل عدد  $z$  من  $\mathbb{C}$  يكتب بطريقة وحيدة على شكل  $z = a + ib$  حيث  $a, b \in \mathbb{R}$  و  $i$  عنصر من  $\mathbb{C}$  يحقق  $i^2 = -1$  ( $i \notin \mathbb{R}$ )

(c) \* الكتابة  $z = a + ib$  تسمى الكتابة الجبرية أو الشكل الجبري للعدد  $z$ .  
\* العدد  $a$  يسمى الجزء الحقيقي للعدد  $z$  ونكتب  $Re(z) = a$   
\* العدد  $b$  يسمى الجزء التخيلي للعدد  $z$  ونكتب  $Im(z) = b$   
\* إذا كان  $b = 0$  فإن  $z = a \in \mathbb{R}$ .  
\* إذا كان  $a = 0$  فإن  $z = ib \in \mathbb{R}$  ونقول إن  $z$  تخيلي صرف.  
(2) ليكن  $a$  و  $b$  و  $a'$  و  $b'$  من  $\mathbb{R}$  و  $\alpha \in \mathbb{R}$

$$a + ib = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$a + ib = a' + ib' \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$$

### (II) مرافق عدد عقدي.

(1) تعريف ليكن  $z = a + ib$  من  $\mathbb{C}$  مع  $a, b \in \mathbb{R}$  نسمي مرافق العدد  $z$  العدد الذي نرسم له  $\bar{z}$  والمعروف بما يلي  $\bar{z} = a - ib$ .  
(2) خاصيات:

$$\begin{aligned} z = z' &\Leftrightarrow \bar{z} = \bar{z}' \\ \bar{\bar{z}} &= z \end{aligned} \quad (b)$$

$$\begin{aligned} \bar{z} = z &\Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \\ \bar{z} = -z &\Leftrightarrow z \in i\mathbb{R} \end{aligned} \quad (a)$$

$$\begin{aligned} z \cdot z' &= \bar{z} \cdot \bar{z}' \\ \bar{z}_1 \bar{z}_2 \dots \bar{z}_n &= \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot \dots \cdot \bar{z}_n \\ \bar{z}^n &= \bar{z}^n \quad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned} \quad (d)$$

$$\begin{aligned} \overline{z + z'} &= \bar{z} + \bar{z}' \\ \overline{z_1 + z_2 + \dots + z_n} &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_n \end{aligned} \quad (c)$$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \quad \text{و} \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (e)$$

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= x^2 + y^2 & z + \bar{z} &= 2x = 2Re(z) \\ z - \bar{z} &= 2iy = 2i Im(z) \end{aligned} \quad \text{ليكن } z = x + iy \text{ لدينا} \quad (f)$$

### (III) معيار عدد عقدي

(1) تعريف: ليكن  $z = a + ib$  من  $\mathbb{C}$  مع  $a, b \in \mathbb{R}$  نسمي معيار العدد  $z$  العدد الحقيقي الموجب الذي نرسم له  $|z|$  والمعروف بما يلي:

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

#### (2) خاصيات:

(a) إذا كان  $z = a \in \mathbb{R}$  فإن  $|z| = |a|$

إذا كان  $z = ib \in \mathbb{R}$  فإن  $|z| = |b|$

$$|z| = |\bar{z}| = |-z| \quad \text{و} \quad |z|^2 = z\bar{z} = a^2 + b^2 \quad (b)$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \quad \text{و} \quad |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0 \quad (c)$$

$$\begin{aligned} |z^n| &= |z|^n \quad \text{و} \quad |zz'| = |z||z'| \\ |z_1 z_2 \dots z_n| &= |z_1| |z_2| \dots |z_n| \end{aligned} \quad (d)$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad \text{و} \quad \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \quad (e)$$

(ملاحظة: للحصول على الشكل الجبري لعدد عقدي على شكل كسر نتبع ما يلي:

$$\frac{z}{z'} = \frac{z\bar{z}'}{z\bar{z}'} = \frac{z\bar{z}'}{|z'|^2} \quad (*)$$

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2} \quad (*)$$

**ملاحظة:**

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = [1, \theta] \text{ إذا كان}$$

$$\frac{AC}{AB} = \frac{|z_C - z_A|}{|z_B - z_A|} = \frac{|z_C - z_A|}{|z_B - z_A|} = 1 \Rightarrow AC = AB$$

$$\left(\overline{AB}, \overline{AC}\right) \equiv \arg \left( \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) \equiv 0[2\pi]$$

**(6) صيغة Moivre**

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

**(7) صيغة Euler**

$$e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x \quad \cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

$$e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$$

**ملاحظة:** للحصول على الشكل المثلثي لمجموع عددين لهما نفس المعيار هناك طريقتان

**الطريقة 1.** نستعمل الصيغ المثلثية .

$$z_2 = e^{i\beta} \quad z_1 = e^{i\alpha} \text{ ليكن}$$

$$z_1 + z_2 = e^{i\alpha} + e^{i\beta} = \cos \alpha + i \sin \alpha + \cos \beta + i \sin \beta$$

$$= \cos \alpha + \cos \beta + i(\sin \alpha + \sin \beta)$$

$$= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + i 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \left( \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + i \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

$$z_1 - z_2 = \cos \alpha - \cos \beta + i(\sin \alpha - \sin \beta)$$

$$= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} + i 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \left( \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + i \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

**الطريقة 2.** نستعمل الترميز الأسّي .

$$z_1 + z_2 = e^{i\alpha} + e^{i\beta} = e^{i \frac{\alpha + \beta}{2}} \left( e^{i \frac{\alpha - \beta}{2}} + e^{-i \frac{\alpha - \beta}{2}} \right)$$

$$= e^{i \frac{\alpha + \beta}{2}} 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$z_1 - z_2 = e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i \frac{\alpha + \beta}{2}} \left( e^{i \frac{\alpha - \beta}{2}} - e^{-i \frac{\alpha - \beta}{2}} \right)$$

$$= e^{i \frac{\alpha + \beta}{2}} 2i \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

**(VI) الجذور النونية لعدد عقدي غير منعدم.**

(1) ليكن  $z \in \mathbb{C}^*$  و  $n \in \mathbb{N}^*$  نسمي جذر نوني للعدد  $z$  كل عدد عقدي  $z$  يحقق  $z^n = z$ .

(2) حلول المعادلة  $z^n = a$  هي الجذور النونية للعدد  $a$ .

(3) ليكن  $Z = [r, \theta]$  من  $\mathbb{C}^*$  الجذور النونية للعدد  $Z$  هي الأعداد

$$z_k = \left[ \sqrt[n]{r}, \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right] / k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

(4) الجذور النونية للعدد 1 هي الأعداد  $w_k = \left[ 1, \frac{2k\pi}{n} \right]$  حيث

$$k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

**(V) الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم.**

(1) \* ليكن  $z \in \mathbb{C}^*$  و  $M(z)$  نسمي عمدة العدد  $z$  كل قياس

للزاوية  $(\vec{e}_1, \overline{OM})$  ونرمز له  $\arg z$

$$\arg z \equiv \left( \vec{e}_1, \overline{OM} \right) [2\pi] \quad (*)$$

**ملاحظة:**

$$z \in i\mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg z \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$$

$$z \in i\mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg z \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi]$$

$$z \in i\mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg z \equiv \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$z \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg z \equiv 0[2\pi]$$

$$z \in \mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg z \equiv \pi[2\pi]$$

$$z \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg z = k\pi$$

(2) كل عدد  $z$  من  $\mathbb{C}^*$  يكتب بطريقة وحيدة على شكل  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  حيث  $|z| = r$  و  $\arg z \equiv \theta[2\pi]$  وهذه الكتابة

تسمى الشكل المثلثي للعدد  $z$  ونكتب  $z = [r, \theta]$  أو  $z = re^{i\theta}$ .

(3) **ملاحظة:**  $[r, \theta] = [r', \theta'] \Leftrightarrow r = r'$  و  $\theta \equiv \theta'[2\pi]$  (a)

(b) للحصول على الشكل المثلثي للعدد  $z = a + ib$  نتبع ما يلي

$$z = a + ib = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \theta + i \sin \theta) = [\sqrt{a^2 + b^2}, \theta]$$

$$\cos \alpha - i \sin \alpha = \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha) \quad (c)$$

$$-\cos \alpha + i \sin \alpha = \cos(\pi - \alpha) + i \sin(\pi - \alpha)$$

$$-\cos \alpha - i \sin \alpha = \cos(\pi + \alpha) + i \sin(\pi + \alpha)$$

$$\sin \alpha + i \cos \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

(4)

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$$

$$\arg z^n \equiv n \arg z [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg z [2\pi]$$

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z [2\pi]$$

$$[r, \theta] \cdot [r', \theta'] = [rr', \theta + \theta']$$

$$[r, \theta]^n = [r^n, n\theta]$$

$$\frac{[r, \theta]}{[r', \theta']} = \left[ \frac{r}{r'}, \theta - \theta' \right]$$

$$\frac{1}{[r, \theta]} = \left[ \frac{1}{r}, -\theta \right]$$

$$[r, \theta] = [r, -\theta]$$

$$e^{-i\theta} = e^{-i\theta} \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad e^{i\theta} \cdot e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')}$$

$$\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta - \theta')}$$

$$-i = e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad i = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad -1 = e^{i\pi} \quad \text{ملاحظة}$$

$$\left(\vec{e}_1, \overline{u}\right) \equiv \arg(\text{aff}(\vec{u})) [2\pi]$$

$$\left(\overline{u}, \overline{v}\right) \equiv \arg(\text{aff}(\vec{v})) - \arg(\text{aff}(\vec{u})) [2\pi]$$

(5)

$$\left(\vec{e}_1, \overline{AB}\right) \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi]$$

$$\left(\overline{AB}, \overline{CD}\right) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$$

## (VII) المعادلات من الدرجة II: خاصة:

نعتبر المعادلة  $az^2 + bz + c = 0$  مع  $a \neq 0$   
نضع  $\Delta = b^2 - 4ac$

1- إذا كان  $\Delta = 0$  فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا:  $z = -\frac{b}{2a}$

2- إذا كان  $\Delta \neq 0$  فإن  $\Delta$  يقبل جذرين مربعين  $u$  و  $-u$

يكون للمعادلة حلان:  $z = \frac{-b+u}{2a}$  و  $z = \frac{-b-u}{2a}$

### ملاحظات:

(\* نعتبر المعادلة  $az^2 + bz + c = 0$  مع  $a \neq 0$   
إذا كان  $z_1$  و  $z_2$  حلي المعادلة فإن:

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

(\* نعتبر المعادلة  $az^2 + 2b'z + c = 0$  مع  $a \neq 0$   
من أجل حل المعادلة نستعمل المميز المختصر

$$\Delta' = b'^2 - ac$$

1- إذا كان  $\Delta' = 0$  المعادلة لها حل وحيد  $z = -\frac{b'}{a}$

2- إذا كان  $\Delta' \neq 0$  المعادلة لها حلان:

$z_1 = \frac{-b'+u}{2a}$  و  $z_2 = \frac{-b'-u}{2a}$  حيث  $u$  جذر مربع  $\Delta'$ .

## (5) الجذور المربعة لعدد من $\mathbb{C}^*$

### (a) الطريقة المثلثية:

ليكن  $Z = [r, \theta] \in \mathbb{C}^*$

لنحدد الجذرين المربعين ل  $Z$ .  
 $Z = [r, \theta] = \left[ \sqrt{r}, \frac{\theta}{2} \right]^2$

إذن جذري  $Z$  هما:  $u = \left[ \sqrt{r}, \frac{\theta}{2} \right]$  و  $-u$

### (b) الطريقة الجبرية:

**(1) إذا كان  $Z = a \in \mathbb{R}_+^*$**

لدينا:  $Z = a = (\sqrt{a})^2$

إذن جذري  $Z$  هما  $u = \sqrt{a}$  و  $-u$

**(2) إذا كان  $Z = -a (a \in \mathbb{R}_+^*)$**

$$Z = -a = i^2 (\sqrt{a})^2 = (i\sqrt{a})^2$$

إذن جذري  $Z$  هما  $u = i\sqrt{a}$  و  $-u$

**3- إذا كان  $Z = ib (b \in \mathbb{R}_+^*)$**

$$Z = ib = 2i \cdot \frac{b}{2} = \left( \sqrt{\frac{b}{2}} \right)^2 (1+i)^2 = \left( \sqrt{\frac{b}{2}} (1+i) \right)^2$$

إذن جذري  $Z$  هما  $u = \sqrt{\frac{b}{2}} (1+i)$  و  $-u$

**(4) إذا كان  $Z = -ib (b \in \mathbb{R}_+^*)$**

$$Z = -ib = -2i \cdot \frac{b}{2} = \left( \sqrt{\frac{b}{2}} \right)^2 (1-i)^2 = \left( \sqrt{\frac{b}{2}} (1-i) \right)^2$$

إذن جذري  $Z$  هما  $u = \sqrt{\frac{b}{2}} (1-i)$  و  $-u$

**(5) إذا كان  $Z = a + ib$  مع  $(a \neq 0 \text{ و } b \neq 0)$**

### مثال:

لنحدد الجذرين المربعين للعدد:

$$Z = -3 + 4i$$

نضع  $z = x + iy$  لدينا  $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$

$$|z|^2 = x^2 + y^2 \text{ و } |Z| = 5$$

$$z^2 = Z \Leftrightarrow \begin{cases} z^2 = Z \\ |z|^2 = |Z| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 & (1) \\ 2xy = 4 & (2) \\ x^2 + y^2 = 5 & (3) \end{cases}$$

من (1) + (3) نستنتج أن  $2x^2 = 2$  يعني  $x = 1$  أو  $x = -1$

ومن (1) - (3) نستنتج أن  $2y^2 = 8$

$$y^2 = 4 \text{ يعني}$$

$$y = 2 \text{ أي } y = -2 \text{ أو } y = 2$$

ومن خلال (2) لدينا  $xy = 2$  إذن  $x$  و  $y$  لهما نفس الإشارة

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \text{ إذن}$$

إذن جذري  $Z$  هما  $u = 1 + 2i$  و  $-u$