

# ع 2

## الأعداد العقدية

**تعريف : ( المراافق )**

ليكن  $z = x + iy$  عدداً عقدياً حيث  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين .  
العدد العقدي  $x - iy$  يسمى مراافق العدد العقدي  $z$  ويرمز له بالرمز  $\bar{z}$

**خاصية : ( المراافق والعمليات )**

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  عددين عقديين .

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} .$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2} .$$

$$(z_2 \neq 0) \quad \left( \frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} .$$

$$z \in C^* \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{حيث } \overline{z^n} = (\overline{z})^n .$$



**تعريف : ( المعيار )**

ليكن  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  عدداً عقدياً مع

العدد الحقيقي  $a = \sqrt{a^2 + b^2}$  يسمى معيار العدد  $z$  ونرمز له بالرمز  $|z|$

**ملاحظة :**

ليكن  $z$  عدداً عقدياً و  $M$  صورته في المستوى العقدي : لدينا

$AB = |z_B - z_A|$  نقطتين احافها على التوالي  $z_A$  و  $z_B$  لدينا:

$$|z| = \sqrt{zz} .$$

**خاصية : ( المعيار و العمليات )**

$$|z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2| , \quad z_2 \neq 0 \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} .$$

$$. |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| .$$

$$z \in C^* \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{حيث } |z^n| = |z|^n .$$

**تعريف : ( العمدة )**

ليكن  $z$  عدداً عقدياً غير منعدم و  $M$  صورته  $(O \neq M)$

المتجهتان  $\vec{e}_1$  و  $\overrightarrow{OM}$  الغير منعدمتين تحددان زاوية موجهة

ولدينا  $\arg(z) \equiv \left( \vec{e}_1, \overrightarrow{OM} \right)$  كل قياس للزاوية

بـ  $\arg(z)$

$$\arg(z) \equiv \left( \vec{e}_1, \overrightarrow{OM} \right) [2\pi]$$

**خاصية : ( العمدة و العمليات )**

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  عددين عقديين غير منعدمين

$$\arg(\bar{z}_1) \equiv -\arg(z_1) [2\pi] .$$

$$\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi] .$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi] .$$

$$z \in C^* \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{حيث } \arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi] .$$

**1. مجموعة الأعداد العقدية :**

توجد مجموعة يرمز لها بالرمز  $C$  وتحقق :  $R \subset C$  .

العمليات الجبرية في  $C$  هي امتداد للعمليات في  $\mathbb{R}$  .

تحتوي على عدد غير حقيقي يكتب  $i$  وتحقق  $i^2 = -1$  .

كل عنصر  $z$  من  $C$  يكتب بكيفية وحيدة على شكل :

$. R$  و  $a+ib$  حيث  $a$  و  $b$  من .

**مصطلحات :**

كل عنصر من  $C$  يسمى عدد عقدي .

المجموعة  $C$  تسمى مجموعة الأعداد العقدية .

الكتابة  $z=a+ib$  تسمى الشكل الجبري للعدد العقدي  $z$  .

العدد الحقيقي  $a$  يسمى الجزء الحقيقي للعدد  $z$  ورمزه  $\operatorname{Re}(z)$  .

العدد الحقيقي  $b$  يسمى الجزء التخييلي للعدد  $z$  ورمزه  $\operatorname{Im}(z)$  .

**خاصية : ( الشكل الجيري والعمليات في مجموعة الأعداد العقدية )**

ليكن  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد حقيقة .

$$a+ib=0 \iff a=b=0 .$$

$$a+ib=c+id \iff \begin{cases} a=c \\ b=d \end{cases} .$$

$$(a+ib)+(c+id)=(a+c)+i(b+d) .$$

$$(a+ib)\times(c+id)=(ac-bd)+i(ad+bc) .$$

**2. التمثيل الهندسي لعدد عقدي :**

المستوى المزود بعلم  $m$  يسمى المستوى العقدي  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

**تعريف : ( اللحق و الصورة )**

نعتبر عدداً عقدياً  $z = a + ib$  حيث  $z = a + ib$

النقطة  $M(a, b)$  تسمى صورة العدد  $z$  ونرمز لها بالرمز  $M(z)$  .

العدد العقدي  $z = a + ib$  يسمى لحق  $M(a, b)$  ويكتب  $z_M$  .

المتجهة  $\vec{u} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$  تسمى المتجهة الصورة للعدد  $z$  ونرمز لها بالرمز  $\vec{u}(z)$  .

العدد العقدي  $z = a + ib$  يسمى لحق المتجهة  $\vec{u}$  ونرمز له بـ  $z_{\vec{u}}$  .

**خاصية : ( اللحق و العمليات )**

ل حق نقطة  $M$  هو لحق المتجهة  $\overrightarrow{OM}$

$$\overrightarrow{AB} = z_B - z_A .$$

$$\overrightarrow{z_u - z_v} = \overrightarrow{z_u} + \overrightarrow{z_v} .$$

$$z_{\vec{u}} = z_{\vec{v}} \iff \vec{u} = \vec{v} .$$

لحق المتجهة  $\vec{u}$  هو  $\alpha \vec{u}$



# الأعداد العقدية

## 2 ع ت

خاصية: (قياس الزوايا)

لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  اربع نقط من المستوى الاقart على التوالي:

$$z_D \text{ و } z_C \text{ و } z_B \text{ و } z_A$$

$$O \neq A \text{ حيث } (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{OA}) \equiv \arg(z_A) [2\pi].$$

$$A \neq B \text{ حيث } (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi].$$

$$A \neq C \text{ و } A \neq B \text{ حيث } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$D \neq C \text{ و } A \neq B \text{ حيث } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

3. الشكل المثلثي:

خاصية: (الشكل المثلثي)

كل عدد عقدي غير منعدم  $z$  يكتب على الشكل:

$$|z| = r \text{ و } \arg(z) \equiv \theta [2\pi] \text{ حيث } z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

. نقول إننا كتبنا العدد العقدي  $z$  على الشكل الاسي

تعريف: (صيغتا او لير)

ترميز:

$$[r, \theta] = r(\cos\theta + i\sin\theta) \text{ بالرمز}$$

خاصية: (العلاقة بين الشكل الجيري والشكل المثلثي)

لكل عدد حقيقي  $\theta$  الصيغتان:

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

تسميات صيغتا او لير

5. المعادلات من الدرجة الثانية:

خاصية: (المعادلات من الدرجة الثانية)

$S$  مجموعة حلول المعادلة  $az^2 + bz + c = 0$  حيث  $a$  و  $b$  و  $c$

أعداد حقيقة و  $a$  غير منعدم. مميز المعادلة

$$S = \left\{ \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right\} \text{ . اذا كان } \Delta > 0 \text{ فان:}$$

$$S = \left\{ -\frac{b}{2a} \right\} \text{ . اذا كان } \Delta = 0 \text{ فان:}$$

$$S = \left\{ \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}, \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right\} \text{ . اذا كان } \Delta < 0 \text{ فان:}$$

خاصية: (العلاقة بين المعاملات و الجذور)

ليكن  $z_1$  و  $z_2$  حلّي للمعادلة  $az^2 + bz + c = 0$

حيث  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد حقيقة و  $a$  غير منعدم.

$$z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \text{ : لدينا:}$$

$$z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$$



$$z = a + ib = [r, \theta] \iff \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \cos\theta = \frac{a}{r} \\ \sin\theta = \frac{b}{r} \end{cases}$$

خاصية: (الشكل المثلثي و العمليات)

ليكن  $r$  و  $\theta$  عددين حقيقيين قطعاً و  $\theta$  عددين حقيقيين

$$[\overline{r}, \overline{\theta}] = \left[ \frac{1}{r}, -\theta \right] \text{ و } [\overline{r}, \overline{\theta}] = [r, -\theta]$$

$$[\overline{r}, \overline{\theta}] \times [\overline{r'}, \overline{\theta'}] = [rr', \theta + \theta']$$

$$[\overline{r}, \overline{\theta}] = \left[ \frac{r}{r'}, \theta - \theta' \right]$$

$$n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } [\overline{r}, \overline{\theta}]^n = [r^n, n\theta]$$

خاصية: (صيغة موافق)

لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  و  $\theta$  من  $\mathbb{R}$  لدينا:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$[r, \theta]^n = [r^n, n\theta]$$

4. الترميز الاسي لعدد عقدي غير منعدم:

# الأعداد العقدية

# ع 2

. الكتابة العقدية للتحاكي الذي مركزه  $\Omega(\omega)$  ونسبة  $k$  هي :

$$z' = k(z - \omega) + \omega$$

. الكتابة العقدية للدوران الذي مركزه  $\Omega(\omega)$  وزاويته  $\theta$  هي :

$$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$$

علاقة في الحساب المثلثي :

$$\cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$$

$$-\cos\theta + i\sin\theta = \cos(\pi - \theta) + i\sin(\pi - \theta)$$

$$-\cos\theta - i\sin\theta = \cos(\pi + \theta) + i\sin(\pi + \theta)$$

$$\sin\theta + i\cos\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$x$ بالراديان	$\cos x$	$\sin x$	$\tan x$
0	1	0	0
$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}$
$\pi/2$	0	1	غير معروف
$2\pi/3$	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}$
$3\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	-1
$5\pi/6$	$-\sqrt{3}/2$	$1/2$	$-\sqrt{3}/3$
$\pi$	-1	0	0
$2\pi$	1	0	0

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\tan(\pi + x) = \tan x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\tan(x + 2\pi) = \tan x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \frac{-1}{\tan x}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

6. تطبيقات هندسية للأعداد العقدية :

خاصية : ( الاستقامة - التوازي - التعماد - التداور )

لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  نقط مختلفة مثنى مثنى .

. تكون  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية اذا وفقط اذا كان  $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in R$

$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in R$  يكافي  $(AB) // (DC)$  .

$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0 [\pi]$  يكافي

$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in iR$  يكافي  $(AB) \perp (DC)$  .

$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$  يكافي

. النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  متداورة يكافي  $\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \cdot \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C}\right) \in R$



خاصية : ... طبيعة مثلث

$A, B, C$  مثلث قائم الزاوية في  $A$  يكافي  $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in iR$  .

$|z_B - z_A| = |z_C - z_A|$  يكافي  $A, B, C$  مثلث متساوي الساقين في  $A$  .

$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \pm i$  يكافي  $A, B, C$  متساوي الساقين و قائم الزاوية في  $A$  .

$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \left[1; \pm \frac{\pi}{3}\right]$  يكافي  $A, B, C$  متساوي الأضلاع .

خاصية: .... طبيعة رباعي

$A, B, C, D$  متوازي الأضلاع يكافي  $z_B - z_A = z_C - z_D$  .

$A, B, C, D$  مستطيل يكافي  $ABCD$  متوازي الأضلاع و  $(AB) \perp (AD)$  .

$A, B, C, D$  معين يكافي  $ABCD$  متوازي الأضلاع و  $(AC) \perp (BD)$  .

$AB = AC$  مربع يكافي  $ABCD$  مستطيل و .

$\frac{z_B - z_A}{z_D - z_A} = \pm i$  و  $z_B - z_A = z_C - z_D$  يكافي  $ABCD$  .

خاصية: ..... التحويلات الإعيادية

نعتبر تحويلات في المستوى يربط كل نقطة  $M(z)$  بالنقطة  $M'(z')$

. الكتابة العقدية للإزاحة ذات المتجهة  $u$  هي :  $z' = z + z_{\vec{u}}$