

جداول تمكنا من البحث عن الدوال الأصلية

الدالة الأصلية للدالة f على مجال I	الدالة f
$x \mapsto kx + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto k; k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{x^2}{2} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto x$
الدالة الأصلية للدالة f على مجال I	الدالة f
$x \mapsto \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto x^n; n \in \mathbb{N}^*$
$x \mapsto -\frac{1}{x} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{-n+1} x^{-n+1} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{x^n}; n \in (\mathbb{N}^* - \{1\})$
$x \mapsto 2\sqrt{x} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$
$x \mapsto \frac{1}{r+1} x^{r+1} + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto x^r; r \in (\mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$x \mapsto \sin(x) + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto -\cos(x) + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x) + c; c \in \mathbb{R}$	$x \mapsto 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
دالة f معرفة على مجال I	مجال I
$u + v$	$u' + v'$
uv	$uv' + vu'$
$\frac{1}{n+1} u^{n+1}$	$u'u^n; n \in \mathbb{N}^*$
$-\frac{1}{u}$	$\frac{u'}{u^2}$
$\frac{1}{r+1} u^{r+1}$	$u'u^r; r \in (\mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$2\sqrt{u}$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$x \mapsto \frac{1}{a} u(ax+b)$	$x \mapsto u'(ax+b); a \in \mathbb{R}^*; b \in \mathbb{R}$

تمرين 1: نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} كالتالي:

$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$

1. حدد دالة F قابلة للاشتاقاق

$$(\forall x \in \mathbb{R}); F'(x) = f(x)$$

2. هل توجد دالة أخرى بحسب

$$(\forall x \in \mathbb{R}); G'(x) = f(x)$$

3. كم توجد من دالة F بحسب

? $(\forall x \in \mathbb{R}); F'(x) = f(x)$ **الأجوبة 1:** الدالة المعرفة كالتالي :

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x$$

على \mathbb{R} وتحقق $(\forall x \in \mathbb{R}); F'(x) = f(x)$

نقول أن : F دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R}

(2) الدالة المعرفة كالتالي :

$$G(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x + 2$$

وتحقق أيضا $(\forall x \in \mathbb{R}); G'(x) = f(x)$

اذن أيضا : G دالة أصلية أخرى للدالة f على \mathbb{R}

(3) هناك عدد لا متناهي من الدوال الأصلية للدالة f

ونقول مجموعة الدوال الأصلية للدالة f على \mathbb{R} هي

$$x \mapsto \frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x + k$$

حيث k عدد حقيقي.

تمرين 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty)$ كالتالي:

$$f(x) = 2x^2 + x + 1 + \frac{1}{x^2}$$

1. حدد مجموعة الدوال الأصلية للدالة f على $[0; +\infty)$

2. حدد الدالة الأصلية F للدالة f بحسب $F(1) = 3$

$$f(x) = 2x^2 + x + 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$F(x) = 2 \times \frac{1}{3}x^{2+1} + \frac{1}{2}x^{1+1} + 1x - \frac{1}{x^2} + k$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{x} + k$$

$$\frac{2}{3} \times 1^3 + \frac{1}{2} \times 1^2 + 1 - \frac{1}{1} + k = 3 \quad (2)$$

$$\frac{7}{6} + k = 3 \quad \text{يعني } \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 1 - 1 + k = 3$$

$$k = 3 - \frac{7}{6} \quad \text{يعني } k = \frac{11}{6}$$

ومنه الدالة الأصلية F للدالة f بحسب $F(1) = 3$

$$F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{x} + \frac{11}{6}$$

هي الدالة المعرفة كالتالي :

تمرين 5: حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad (2) \quad f(x) = 2\sqrt{2x+1} \quad (1)$$

$$f(x) = 2\sqrt{2x+1} = (2x+1)' (2x+1)^{\frac{1}{2}} \quad (1: \text{أجوبة})$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} (2x+1)^{\frac{1}{2}+1} + k$$

$$\text{ومنه } F(x) = \frac{2}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + k$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{2}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} (\sqrt{2x+1})^3 + k$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{(x^2 + 1)'}{2\sqrt{x^2 + 1}} \quad (2)$$

$$\text{اذن } F(x) = \sqrt{x^2 + 1} + k$$

تمرين 6: حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية :

$$f(x) = \sin(4x-1) \quad (3) \quad f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{8+x^3}} \quad (2) \quad f(x) = x\sqrt{x^2+1} \quad (1)$$

$$f(x) = (\sin x)^2 \cos x \quad (5) \quad f(x) = \cos(2x+8) \quad (4)$$

$$f(x) = x\sqrt{x^2+1} = \frac{1}{2}(x^2+1)' (x^2+1)^{\frac{1}{2}} \quad (1: \text{أجوبة})$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} (x^2+1)^{\frac{1}{2}+1} + k = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + k$$

$$\text{ومنه } F(x) = \frac{1}{3} (\sqrt{x^2+1})^3 + k$$

$$f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{8+x^3}} = \frac{2}{3} \frac{(8+x^3)'}{2\sqrt{8+x^3}} \quad (2)$$

$$\text{اذن } F(x) = \frac{2}{3} \sqrt{8+x^3} + k$$

$$k \in \mathbb{R} \quad F(x) = -\frac{1}{4} \cos(4x-1) + k \quad \text{اذن } f(x) = \sin(4x-1) \quad (3)$$

$$k \in \mathbb{R} \quad F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x+8) + k \quad \text{اذن } f(x) = \cos(2x+8) \quad (4)$$

$$f(x) = (\sin x)' (\sin x)^2 \quad \text{يعني} \quad f(x) = (\sin x)^2 \cos x \quad (5)$$

$$F(x) = \frac{1}{2+1} (\sin x)^{2+1} + k \quad \text{ومنه}$$

$$k \in \mathbb{R} \quad F(x) = \frac{1}{3} (\sin x)^3 + k \quad \text{يعني}$$

تمرين 7: نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty]$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} : \text{كالتالي}$$

حدد العددين الحقيقيين a و b بحيث :

$$\forall x \in [0; +\infty[\quad f(x) = a + \frac{b}{(x+1)^2}$$

$$F(1) = \frac{5}{2} \quad \text{حدد الدالة الأصلية } F \text{ للدالة } f \quad \text{بحيث} \quad .2$$

$$(1: \text{أجوبة})$$

$$f(x) = a + \frac{b}{(x+1)^2} = \frac{a(x+1)^2 + b}{(x+1)^2} = \frac{ax^2 + 2ax + a + b}{(x+1)^2}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \quad \text{بالمقارنة مع الكتابة :}$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} a=1 \\ a=1 \\ b=-1 \end{cases} \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} a=1 \\ 2a=2 \\ a+b=0 \end{cases} \quad \text{نجد أن :}$$

تمرين 3: حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \cos x + \sin x - 1 \quad (2) \quad f(x) = 5x^4 + 3x + 1 \quad (1)$$

$$f(x) = (2x-1)^3 \quad (4) \quad f(x) = \sin x + x \cos x \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{x}{(x^2-1)^2} \quad (5)$$

$$(1: \text{أجوبة})$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = 5 \times \frac{1}{5} x^5 + 3 \times \frac{1}{2} x^2 + 1x + k$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \cos x + \sin x - 1 \quad (2)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = 2\sqrt{x} + \sin x - \cos x - x + k$$

$$f(x) = \sin x + x \cos x = x' \sin x + x(\sin x)' \quad (3)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = x \times \sin x + k \quad \text{اذن}$$

$$f(x) = (2x-1)^3 = \frac{1}{2} (2x-1)' (2x-1)^3 \quad (4)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3+1} (2x-1)^{3+1} + k$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{8} (2x-1)^4 + k \quad \text{ومنه}$$

$$f(x) = -\frac{(x^2-1)'}{(x^2-1)^2} \quad \text{يعني} \quad f(x) = -\frac{x}{(x^2-1)^2} \quad (5)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{x^2-1} + k$$

تمرين 4: حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية :

$$f(x) = 2\cos x - \sin x - 3 \quad (2) \quad f(x) = 8x^3 + 4x^2 + x + 6 \quad (1)$$

$$(5) \quad f(x) = (4x+5)^2 \quad (4) \quad f(x) = 2x\sin x + x^2 \cos x \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{x^2}{(x^3+2)^2}$$

$$(1: \text{أجوبة})$$

$$f(x) = 8x^3 + 4x^2 + x + 6 \quad (1)$$

$$F(x) = 8 \times \frac{1}{4} x^4 + 4 \times \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 6x + k = 2x^4 + \frac{4}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 6x + k$$

$$k \in \mathbb{R} \quad \text{حيث}$$

$$f(x) = 2\cos x - \sin x - 3 \quad (2)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } f(x) = 2\sin x + \cos x - 3x + k$$

$$f(x) = 2x\sin x + x^2 \cos x = (x^2)' \sin x + x^2 (\sin x)' \quad (3)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = x^2 \times \sin x + k$$

$$f(x) = (4x+5)^2 \quad (4)$$

$$f(x) = (4x+5)^2 = \frac{1}{4} (4x+5)' (4x+5)^2$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2+1} (4x+5)^{2+1} + k$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = \frac{1}{12} (4x+5)^3 + k \quad \text{ومنه}$$

$$f(x) = -\frac{1}{3} \left(-\frac{(x^3+2)'}{(x^3+2)^2} \right) \quad \text{يعني} \quad f(x) = \frac{x^2}{(x^3+2)^2} \quad (5)$$

$$k \in \mathbb{R} \text{ حيث } F(x) = -\frac{1}{3} \frac{1}{x^3+2} + k$$

$$f(x) = 10 \frac{(x^2 + 4)'}{(x^2 + 4)^2} + 5 \quad \text{يعني} \quad f(x) = \frac{20x}{(x^2 + 4)^2} + 5 \quad (2)$$

$\forall x \in [0; +\infty[\quad k \in \mathbb{R} \quad F(x) = -\frac{10}{x^2 + 4} + 5x + k$: ومنه

$$k = \frac{15}{2} \quad \text{يعني} \quad k = 5 + \frac{5}{2} - \frac{10}{4} + k = 5 \quad F(0) = 5 \quad (3)$$

$\forall x \in [0; +\infty[\quad F(x) = -\frac{10}{x^2 + 4} + 5x + \frac{15}{2}$: ومنه

$$f(x) = 1 - \frac{(x+1)'}{(x+1)^2} \quad \text{يعني} \quad f(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} \quad (2)$$

$$\forall x \in [0; +\infty[\quad k \in \mathbb{R} \quad F(x) = x + \frac{1}{x+1} + k \quad \text{ومنه}$$

تمرين 8: نعتبر الدالة f المعرفة على $[1; +\infty[$ كالتالي :

1. بين أن $f(x) = \sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{x-1}$:
2. حدد الدالة الأصلية F للدالة f بحيث $F(2) = 1$.

أجوبة:

$$\sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{x-1} = \sqrt{(x-1)^2} \times \sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} = |x-1| \times \sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} \quad (1)$$

نعلم أن $|x-1| = x-1$ إذن : $x \geq 1$ يعني $x \in [1; +\infty[$

ومنه $|x-1| = x-1$:

اذن :

$$\sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{x-1} = (x-1) \times \sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} = x\sqrt{x-1} - 1\sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} = x\sqrt{x-1}$$

يعني $f(x) = \sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{x-1} \quad (2)$

$$f(x) = ((x-1)^3)^{\frac{1}{2}} + (x-1)^{\frac{1}{2}} = (x-1)^{\frac{3}{2}} + (x-1)^{\frac{1}{2}} = (x-1)' (x-1)^{\frac{3}{2}} + (x-1)' (x-1)^{\frac{1}{2}}$$

$$F(x) = \frac{1}{\frac{3}{2}+1} (x-1)^{\frac{3}{2}+1} + \frac{1}{\frac{1}{2}+1} (x-1)^{\frac{1}{2}+1} + k = \frac{2}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} + k$$

ومنه $k \in \mathbb{R}$ حيث $F(x) = \frac{2}{5}(\sqrt{x-1})^5 + \frac{2}{3}(\sqrt{x-1})^3 + k$

تمرين 9: نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} كالتالي :

$$f(x) = \frac{5x^4 + 40x^2 + 20x + 80}{(x^2 + 4)^2}$$

1. حدد الأعداد الحقيقة a و b و c

$$\forall x \in [0; +\infty[\quad f(x) = \frac{ax+b}{(x^2 + 4)^2} + c$$

2. حدد مجموعة الدوال الأصلية للدالة f

3. حدد الدالة الأصلية F للدالة f بحيث $F(0) = c$

أجوبة:

$$f(x) = \frac{ax+b}{(x^2 + 4)^2} + c = \frac{ax+b+c(x^2 + 4)^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{ax+b+cx^4 + 8cx^2 + 16c}{(x^2 + 4)^2}$$

$$f(x) = \frac{cx^4 + 8cx^2 + ax + (b+16c)}{(x^2 + 4)^2}$$

بالمقارنة مع الكتابة : $f(x) = \frac{5x^4 + 40x^2 + 20x + 80}{(x^2 + 4)^2}$

$$\begin{aligned} & \therefore \quad \begin{cases} c = 5 \\ c = 5 \\ a = 20 \\ b = 0 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} c = 5 \\ 8c = 40 \\ a = 20 \\ b + 16c = 80 \end{cases} \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} c = 5 \\ 8c = 40 \\ a = 20 \\ b + 16c = 80 \end{cases} \quad \therefore \quad \text{نجد} \quad \begin{cases} c = 5 \\ a = 20 \\ b = 0 \end{cases} \quad \text{أن} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{20x}{(x^2 + 4)^2} + 5$$

« c'est en forgeant que l'on devient forgeron » dit un proverbe.
c'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien

