

الجاء السلمي - الفلكة

الجاء المتجهي

(ii) ليكن (D) مستقيم موجه بـ $\vec{u}(a,b,c)$ و (P) مستوى بحيث تكون $\vec{n}(\alpha,\beta,\gamma)$ منتظمية عليه.

(*) يكون $(D) \perp (P)$ إذا وفقط إذا كانت $\vec{u} \cdot \vec{n}$ مستقيمتين.


$$\begin{vmatrix} a & \alpha \\ b & \beta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & \alpha \\ c & \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & \beta \\ c & \gamma \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعني}$$

(*) يكون $(D) \parallel (P)$ إذا وفقط إذا كانت $\vec{u} \perp \vec{n}$ يعني $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

(iii) إذا كان المستقيم (D) عمودي على المستوى (P) فإن:

(*) كل متجهة موجهة لـ (D) تكون منتظمية على (P) .

(*) وكل متجهة منتظمية على (P) تكون موجهة لـ (D) .



f) تعاون مستوىين.

(i) ليكن (Q) مستوىين و \vec{n} و \vec{n}' منظيميتين عليهما على التوالي.

(*) يكون $(P) \perp (Q)$ إذا وفقط إذا كان $\vec{n} \perp \vec{n}'$ يعني $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$.


(*) يكون $(P) \parallel (Q)$ إذا وفقط إذا كان \vec{n} و \vec{n}' مستقيمتين.

(ii) نعتبر المستويين (P) : $ax+by+cz+d=0$

(Q) : $a'x+b'y+c'z+d'=0$ و

يكون $(P) \perp (Q)$ إذا وفقط إذا $aa'+bb'+cc'=0$.

(g) مسافة نقطة عن مستوى.



(i) ليكن (P) مستوى و A نقطة من الفضاء

و H المسقط العمودي لـ A على (P) .

المسافة AH تسمى مسافة A عن (P) .

. $d(A, (P)) = AH$

(ii) نعتبر المستوى (P) : $ax+by+cz+d=0$

. $A(x_0, y_0, z_0)$ والنقطة

$$d(A, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad \text{لدينا}$$

الفلكة. (II)

1) الفلكة التي مركزها Ω وشعاعها r هي مجموعة النقط M التي تتحقق $\Omega M = r$.

2) معادلة الفلكة (S) التي مركزها $\Omega(a,b,c)$ وشعاعها r هي:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

شكل: نقوم بالنشر ونجعل المعادلة على $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$.

I- الجاء السلمي.

نفترض في كل ما يلي أن الفضاء منسوب إلى معلم متعدد منظم (o, i, j, k) .

1) تعتبر المتجهتين $\vec{v}(x', y', z')$ و $\vec{u}(x, y, z)$ لدينا

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

2) تعتبر نقطتين $B(x_B, y_B, z_B)$ و $A(x_A, y_A, z_A)$ لدينا

$$\overline{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

3) المستقيمات والمستويات في الفضاء الأورقي.

(a) ليكن (P) مستوى. نسمي متجهة منتظمية على (P) كل متجهة \vec{n} موجهة لمستقيم (D) عمودي على (P) .

(b) نعتبر المستوى (P) : $ax+by+cz+d=0$ المتوجه $\vec{n}(a,b,c)$ منتظمية على (P) .

(c) معادلة مستوى معرف بنقطة ومتوجهة منتظمية عليه.

مثال: حدد معادلة ديكارتية للمستوى (P) المار من $A(1,-1,2)$ والمتجهة $\vec{n}(2,1,-1)$ منتظمية عليه:

الطريقة 1: $M(x, y, z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$

$$\begin{aligned} \uparrow \vec{n} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \\ z-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \\ \overline{A.M} &\Leftrightarrow 2(x-1) + (y+1) - (z-2) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + y - z + 1 = 0 \end{aligned}$$

إذن: $(P): 2x + y - z + 1 = 0$

الطريقة 2: لدينا $\vec{n}(2,1,-1)$ منتظمية على (P) إذن معادلة (P) على

شكل $A(1,-1,2) \in (P)$ ولدينا $2x + y - z + 1 = 0$ إذن $A(1,-1,2)$ في (P) .

$(P): 2x + y - z + 1 = 0$ يعني $d = 1$ إذن $2 - 1 - 2 + d = 0$.

د) تعاون مستقيمين.

ليكن (D) و (D') مستقيمين موجهين بـ $\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ على التوالي:

يكون $(D) \perp (D')$ إذا وفقط إذا كان $\vec{u} \perp \vec{v}$ يعني $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

$$aa' + bb' + cc' = 0$$

(e) تعاون مستقيم ومستوى.

(i) ليكن (D) مستقيم موجه بـ \vec{u} و (P) مستوى موجه بـ \vec{v} و \vec{w} .

يكون $(D) \perp (P)$ إذا وفقط إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ يعني $\vec{u} \perp \vec{v}$.

$$\cdot \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \\ \vec{u} \perp \vec{w} \end{cases} \text{ يعني } \vec{u} \perp \vec{w}$$



(3) تعتبر المجموعة

$$(\Gamma): x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$$

من أجل دراسة طبيعة المجموعة (Γ) هناك طريقتين.

الطريقة 1: نضع $d = \delta$ ونحسب $c = \frac{-\gamma}{2}$, $b = \frac{-\beta}{2}$, $a = \frac{-\alpha}{2}$

$$a^2 + b^2 + c^2 - d$$

$$\Gamma = \emptyset \text{ فإن } a^2 + b^2 + c^2 - d < 0 \quad (*)$$

$$\Gamma = \{\Omega(a, b, c)\} \text{ فإن } a^2 + b^2 + c^2 - d = 0 \quad (*)$$

$$\Omega(a, b, c) \text{ فإن فلكلة مركزها } a^2 + b^2 + c^2 - d > 0 \quad (*)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ وشعاعها}$$

الطريقة 2 نقوم بتحويل المعادلة لترجعها على شكل

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = k$$

$$X^2 + \alpha X = \left(X + \frac{\alpha}{2} \right)^2 - \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2 \text{ باستخدام بداية متطابقة هامة}$$

$$(\Gamma) = \emptyset \text{ إذا كان } k < 0 \quad (*)$$

$$(\Gamma) = \{\Omega(a, b, c)\} \text{ إذا كان } k = 0 \quad (*)$$

$$r = \sqrt{k} \text{ إذا كان } k > 0 \text{ فإن } \Omega(a, b, c) \text{ وشعاعها} \quad (*)$$

معادلة فلكلة معرفة بأحد أقطارها.

لتكن (S) فلكلة أحد أقطارها $[AB]$ للحصول على معادلة (S) هناك

طريقتان:

الطريقة 1

$$M(x, y, z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_B \\ y - y_B \\ z - z_B \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) + (z - z_A)(z - z_B) = 0 \quad \text{الطريقة 2:}$$

نستعمل مباشرة الصيغة

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) + (z - z_A)(z - z_B) = 0 \quad \text{تقاطع فلكلة ومستوى.}$$

(a) لتكن (S) فلكلة مركزها Ω وشعاعها r و(P) مستوى من أجل دراسة

تقاطع (S) و(P) نقوم بحساب $d = d(\Omega, P)$ وهناك ثلاثة حالات:

(i) إذا كانت $d > r$ فإن (P) يوجد خارج (S) لا يقطع (S)).

(ii) إذا كان $d = r$ فإن (P) و(S) ينطقيان في نقطة وحيدة H ونقول

في هذه الحالة إن (P) مماس ل (S) في H ونقطة التماس H هي المسقط العمودي ل Ω على (P).).

(iii) إذا كانت $d < r$ فإن المستوى (P) يقطع (S) وفق الدائرة (ℓ)

الموجودة ضمن المستوى (P) التي مركزها هو H المسقط العمودي ل Ω

$$. r' = \sqrt{r^2 - d^2} \text{ وشعاعها}$$

(b) إذا كانت (Ω, P) فإن $d \in (\Omega, P)$ ونقول في هذه الحالة إن المستوى

(P) مستوى قطري. وفي هذه الحالة المستوى (P) يقطع الفلكلة (S) وفق

الدائرة الكبرى (ℓ) الموجودة ضمن (P) التي مركزها Ω وشعاعها هو

$$. r$$

(c) لتكن (S) فلكلة مركزها Ω وشعاعها x .

(i) يكون (P) مماس ل (S) إذا وفقط إذا كان $r = d(\Omega, P)$

يكون (P) مماس ل (S) في A إذا وفقط إذا كان (ΩA) عمودي على $. A$ في (P)

(iii) المستوى المماس للفلكلة (S) في A هو المستوى المار من A و(ΩA) منظمية عليه.

6 تقاطع فلكلة ومستقيم:

$$(D): \begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases} \text{ تعتبر المستقيم}$$

والفلكلة (S) التي معادلتها:

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

من أجل دراسة تقاطع الفلكلة (S) والمستقيم (D) نقوم بحل النظمية:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \\ x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0 \end{cases} \quad (4)$$

ولهذا نعرض x و y و z في (4) نحصل على معادلة من الدرجة الثانية t مجهولة لها.

ليكن Δ مميز هذه المعادلة:

(i) إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة ليس لها حل إذن (D) لا يقطع (S).

(ii) إذا كان $\Delta = 0$ فإن المعادلة تقبل حلاً واحداً إذن (D) يقطع (S) في نقطة وحيدة H ونقول في هذه الحالة إن (D) مماس ل (S) في H .

(iii) إذا كان $\Delta > 0$ فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين t_1 و t_2 إذن (D) يقطع

(S) في نقطتين A و B وللحصول على أحاديث A و B نعرض

t_1 و t_2 في (1) و (2) و (3).

III) الجداء المتجهي

-1- ليكن ($o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) معلماً متعاماً منظماً مباشراً.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ و } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \text{ ونتعتبر المتجهتين}$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} \quad \text{ لدينا}$$

نكون المتجهتين \vec{u} و \vec{v} مستقيمين إذا وفقط إذا كان $= 0$

(a) إذا كانت \vec{u} و \vec{v} متجهتين موجهتين لمستوى (P) فإن

منظمية على (P).

(b) لتكن C, B, A ثالث نقط غير مستقيمة (يعني $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq 0$) المتجهة

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ منظمية على المستوى (ABC).

$$S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \quad \text{مساحة المثلث } (ABC) \text{ هي} \quad (4)$$

$$S = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}\| \quad \text{مساحة المتوازي أضلاع } (ABCD) \text{ هي} \quad (5)$$

ليكن (D) مستقيم مار من A وموجه بالتجهة \vec{u} ولتكن M نقطة.

$$d(M, (D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} \quad \text{ لدينا}$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u} \quad (*) \quad (7)$$

$$\alpha \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\alpha \vec{v}) = \alpha(\vec{u} \wedge \vec{v}) \quad (*)$$

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w} \quad (*)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{w} \quad (*)$$

من أجل دراسة تقاطع مستقيم (D) وفلكلة (S) يمكن حساب

$$d(\Omega, (D)) \text{ ثم استنتاج التقاطع.} \quad (8)$$