

الاتصال

السلسلة 1 (10 تمارين)

التمرين 1 :

1. لتكن f الدالة المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}; & x \neq 0 \\ f(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

 أدرس اتصال f في 0 .

2. نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x^2-x-2}; & x \neq 2 \\ f(2) = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

 أدرس اتصال الدالة f في النقطة 2 .

3. لتكن f الدالة العددية المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x+1}-1}; & x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

 أدرس اتصال الدالة f في 0 .

4. لتكن f الدالة العددية المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + 2x + 3; & x \geq -2 \\ f(x) = \frac{x^2+x-2}{x+2}; & x < -2 \end{cases}$$

 أدرس اتصال f في -2 .

5. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = 2 \frac{\sin(3x)}{x} + 1; & x > 0 \\ f(x) = x + m - \frac{1}{2}; & x \leq 0 \end{cases}$$

 حدد قيمة m لكي تكون f متصلة في 0 .

6. لتكن g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} g(x) = x - k & ; x < 0 \\ g(0) = 2 & \\ g(x) = 1 + \frac{\tan x}{x} & ; x > 0 \end{cases}$$

 حيث k عدد حقيقي.
 حدد قيمة k التي من أجلها تكون g متصلة في $x_0 = 0$.

التمرين 2 :

1. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad \begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ f(2) = 12 \end{cases}$$
 2. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad f(x) = x^5 - 6x^2 + 3x + 7$$
 3. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad f(x) = 2\sin x + 3\cos x$$
 4. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$
 5. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$$
 6. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي :

$$D_f \quad f(x) = (x^2 - 3x + 4) \times \cos x$$
 7. لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - x + 4}$$
- أدرس اتصال الدالة f على \mathbb{R}

التمرين 3 :

بين أن المعادلة (E) تقبل على الأقل حلًا في المجال I في الحالتين التاليتين:

$$I = [0, 1]; (E): x^5 - x^3 + 5x - 4 = 0 \quad .1$$

$$I = \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right]; (E): 2\sin x = x \quad .2$$

التمرين 4 :

بين أن المعادلة $x^3 + 2x - 4 = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]$

التمرين 5 :

بين أن المعادلة $2x^3 + 7x - 4 = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال \mathbb{R} وأن $\alpha < 1$

التمرين 6 :

لتكن f دالة عددية متصلة على مجال $[a, b]$ بحيث: $f(a) < ab$ و $f(b) > b^2$
 بين أن: $\exists c \in [a, b] : f(c) = bc$

التمرين 7 :

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي: $f(x) = 2x^3 + x - 1$
1. بين أن المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حلًا وحيدًا α في \mathbb{R} ثم تحقق أن $\alpha < 0$.
 2. أدرس إشارة الدالة f .

التمرين 8 :

نعتبر الدالة العددية g المعرفة على \mathbb{R} كما يلي :

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{\pi}{2} \quad g(0) > 0 \quad \text{و}$$

1. تحقق من أن: $g(x)$ تقبل حلا على الأقل في المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

التمرين 9 :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي:

$$f(-1) = f(0) = f\left(\frac{-1}{2}\right) \quad \text{و}$$

2. استنتج أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل ثلاثة حلول في المجال $[-1; 1]$.

التمرين 10 :

لتكن f دالة متصلة و معرفة من مجال $[a;b]$ نحو $[a;b]$.

بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا على الأقل في المجال $[a;b]$.