

مستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا
شعبة العلوم التجريبية
• مسلك علوم الحياة والأرض
• مسلك العلوم الفيزيائية
• مسلك العلوم الزراعية

مذكرة رقم 3 في دراسة الدوال

محتوى البرنامج

- التمثيل المباني لدالة عدديّة (تذكير): المقاربات الأفقية والعمودية و المائلة
 - الفروع الشلجمية
 - تعرّف منحني ونقط الانعطاف
 - محور تماثل ومركز تماثل
 - دراسة وتمثيل دوال لا جذرية ومثلثية
- القدرات المتطلبة**
- حساب مشتقات الدوال الاعتيادية
 - تحديد رتبة دالة انطلاقاً من إشارة مشتقها .
 - تحديد إشارة دالة انطلاقاً من جدول تغيراتها أو من تمثيلها المباني
 - الحل المباني لمعادلة من الشكل : $f(x) \leq g(x)$ و متراجحات من الشكل : $f(x) = g(x)$
 - تحديد مشتقة و رتبة الدالة العكسية لدالة متصلة و رتبية قطعاً على مجال و تمثيلها المباني
 - حل مسائل تطبيقية حول القيم الدنوية و القيم القصوية
 - دراسة وتمثيل دوال حدودية وجذرية و لا جذرية و دوال مثلثية .

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة f

2. أحسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ واعط تأويلاً مبيانياً للنتيجة

أجوبة:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 1 \neq 0\} \quad (1)$$

$$(x-1)(x+1) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

$$x = 1 \Leftrightarrow x = -1$$

ومنه $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\} =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \quad (2)$$

التأويل المباني: المستقيم ذا المعادلة $a = y$ مقارب للمنحنى (C)

بجوار $+\infty$ يوازي محور الأفاسيل.

(3) المقارب المائل:

لتكن f دالة عدديّة لمتغير حقيقي x بحيث f تقبل نهاية لا منتهية بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$).

تعريف:

$$\text{إذا كانت } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (ax + b) = 0 \quad (\text{أو})$$

$$a \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (ax + b) = 0$$

و $b \in \mathbb{R}$ نقول إن المستقيم ذا المعادلة $y = ax + b$ مقارب مائل للمنحنى (C) بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$).

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة f

I. التمثيل المباني لدالة عدديّة (تذكير):

في جميع الفقرات المتبعة، f دالة عدديّة لمتغير حقيقي x و (C)

منحناها في معلم معتمد منظم $(j; i; \bar{i}; o)$

(1) المقارب الموازي لمحور الأرائيب:

تعريف: إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

نقول إن المستقيم ذا المعادلة $a = x$ مقارب للمنحنى (C) يوازي محور الأرائيب.

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة f

2. أحسب : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ واعط تأويلاً مبيانياً للنتيجة

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x - 1 > 0\} \quad (1)$$

$$x > 1 \Leftrightarrow x - 1 > 0$$

$$\text{ومنه: } D_f =]1; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \text{و منه: } \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x = 2 \quad (2)$$

التأويل المباني: المستقيم ذا المعادلة $1 = x$ مقارب للمنحنى (C) يوازي محور الأرائيب

(2) المقارب الموازي لمحور الأفاسيل:

تعريف: إذا كانت $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ أو $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ (نقول إن

المستقيم ذا المعادلة $a = y$ مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$) يوازي محور الأفاسيل.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 1x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 4x - 5} - 1x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 4x - 5} + 1x)(\sqrt{x^2 - 4x - 5} - 1x)}{(\sqrt{x^2 - 4x - 5} + 1x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4x - 5 - x^2}{|x|\sqrt{1 - \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x - 5}{x\sqrt{1 - \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(-4 - \frac{5}{x})}{x\left(\sqrt{1 - \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}} + 1\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4 - \frac{5}{x}}{\sqrt{1 - \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}} + 1} = \frac{-4}{2} = -2 = b \end{aligned}$$

ومنه : أي $y = x - 2$ مقارب مائل لمنحنى الدالة f بجوار ∞

تعريف 1: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f و حدد $f'(x)$

2. أحسب : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

3. بين : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + 2x$ و أحسب : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = -2$

4. أستنتج معادلة المقارب المائل لمنحنى الدالة f بجوار ∞

أجوبة: 1) $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 4x^2 + 2x - 2 \geq 0\}$

$$2x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow 4x^2 + 2x - 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 1 + 8 = 9 = (3)^2 > 0$$

بما أن $0 < \Delta$ فان هذه الحدوية لها جذرين هما:

ومنه جدول الاشارة :

x	$-\infty$	-1	$1/2$	$+\infty$
$4x^2 + 2x - 2$	+	0	-	0

ومنه : $D_f =]-\infty; -1] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$

$\forall x \in]-\infty; -1[\cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$

$$f'(x) = (\sqrt{4x^2 + 2x - 2})' = \frac{(4x^2 + 2x - 2)'}{2\sqrt{4x^2 + 2x - 2}} = \frac{8x + 2}{2\sqrt{4x^2 + 2x - 2}} = \frac{4x + 1}{\sqrt{4x^2 + 2x - 2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{4x^2 + 2x - 2} \quad (2)$$

لدينا : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow \infty} 4x^2 + 2x - 2 = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x^2 = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 2x - 2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 \left(4 + \frac{2x}{x^2} - \frac{2}{x^2}\right)} \quad (3) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}}}{x} \end{aligned}$$

لدينا : $|x| = -x$: ومنه $x \rightarrow -\infty$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}} = -\sqrt{4} = -2 = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + 2x = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{4x^2 + 2x - 2} + 2x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + 2x - 2} + 2x)(\sqrt{4x^2 + 2x - 2} - 2x)}{(\sqrt{4x^2 + 2x - 2} - 2x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 2x - 4x^2}{|x|\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}} - 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 2}{-x\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}} - 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 2}{-x\sqrt{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}} - 2x}$$

2. حدد معادلة المقارب المائل لمنحنى الدالة f بجوار ∞

أجوبة: أجوبة : 1) $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x > 0\}$

$$x = -1 \text{ و } x = 0 \Leftrightarrow x(x+1) = 0 \Leftrightarrow x^2 + x = 0$$

نستعمل جدول الاشارة :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$x^2 + x$	+	0	-	0

ومنه : $D_f =]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$

$$f(x) = x + \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}} \Leftrightarrow f(x) - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}} = 0 \text{ إذن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} = +\infty$$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0$

التأويل المباني: المستقيم ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل لمنحنى (C)

بجوار ∞

خاصية: يكون المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ ($a \neq 0$) مقارباً مائلاً

للمنحنى (C) بجوار ∞ إذا وفقط إذا كان :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$$

لدينا نفس الخاصية إذا عوضنا x بـ " $+\infty$ " بـ " x " يؤول إلى " $-\infty$ "

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة

2. أحسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

3. حدد معادلة المقارب المائل لمنحنى الدالة f بجوار ∞

أجوبة: 1) $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x - 5 \geq 0\}$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 1 \times (-5) = 16 + 20 = 36 = 6^2 > 0$$

بما أن $0 < \Delta$ فان هذه الحدوية لها جذرين هما:

ومنه جدول الاشارة :

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$
$x^2 - 4x - 5$	+	0	-	0

ومنه : $D_f =]-\infty; -1] \cup [5; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 4x - 5} \quad (2)$$

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4x - 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4x - 5}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{4x}{x^2} - \frac{5}{x^2}\right)} \quad (3)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|\sqrt{1 - \frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}}}{x}$$

لدينا : $|x| = x$ ومنه $x \rightarrow +\infty$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{1 - \frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}} = 1\sqrt{1} = 1 = a$$

نقول إن المنحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ بجوار ∞ .

نعرف بالمثل الفروع الشلجمية بجوار ∞ .

مثال 1: لتكن f الدالة العددية المعرفة بما يلي:

$$f(x) = \sqrt{2x-1} - x$$

1. حدد D مجموعة تعريف الدالة f .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

أدرس الفروع الانهائية لمنحنى الدالة f .

أجبوبة 1:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x-1 \geq 0\}$$

$$x \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x-1 \geq 0$$

$$D_f = \left[\frac{1}{2}; +\infty \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x-1} - x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x-1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - x$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - x$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - 1 \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x-1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x-1}}{x} - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}}{x} - 1 = (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-1x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x-1} = +\infty$$

التأويل المباني: منحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه المستقيم ذو المعادلة $y = -x$ بجوار ∞ .

III. تقرع منحنى- نقط انعطاف:

خاصية: لتكن f دالة قابلة للاشتقاق مرتبة على مجال I و (C_f)

منحنها في المعلم $(o; i; j)$.

إذا كانت f'' موجبة على المجال I فإن للمنحنى (C_f) تقرعاً

موجه نحو محور الأراتيب الموجبة.

إذا كانت f'' سالبة على المجال I فإن للمنحنى (C_f) تقرعاً

موجه نحو محور الأراتيب السالبة.

إذا كانت f'' تتعدم في النقطة $I \in x_0$ وتتغير إشارتها

بجوار x_0 فإن النقطة $(A(x_0); f(x_0))$ نقطة انعطاف المنحنى (C_f).

مثال: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R}

كالتالي : $f(x) = \frac{1}{12}x^4 - 2x^2 + x + \frac{2}{3}$

1. أحسب $f''(x)$ لكل x من

2. أدرس تقرع المنحنى (C_f) الممثل للدالة f مع تحديد نقطتي انعطافه

الجواب : (1)

$$f'(x) = \left(\frac{1}{12}x^4 - 2x^2 + x + \frac{2}{3} \right)' = \frac{1}{12}4x^3 - 4x + 1 = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 1$$

$$f''(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x + 1 \right)' = x^2 - 4$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\frac{2-2}{x} \right)}{-x \left(\sqrt{4 + \frac{2}{x^2}} + 2 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2-2}{x}}{-\left(\sqrt{4 + \frac{2}{x^2}} + 2 \right)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = b$$

ومنه: أي $y = ax + b$ مقارب مائل لمنحنى

الدالة f بجوار $-\infty$

II. الفروع الشلجمية:

ل لكن f دالة عددية تقبل نهاية لا منتهية بجوار $+\infty$.

تعريف 1:

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ نقول إن المنحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً

اتجاهه محور الأراتيب بجوار $+\infty$

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ أو $-\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

نقول أن المنحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه محور الأراتيب بجوار

$+\infty$.

مثال 1: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

2. أحسب

3. أدرس الفرع الشلجمي لمنحنى الدالة f بجوار $-\infty$

أجبوبة 1: $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2-x \geq 0\}$

$$x \leq 2 \Leftrightarrow 2-x \geq 0$$

ومنه: $D_f = [-\infty; 2]$

ومنه: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2-x = +\infty$ (2)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{2-x})^2}{x\sqrt{2-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x\sqrt{2-x}} = (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x} \times \frac{1}{\sqrt{2-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} \times \frac{1}{\sqrt{2-x}} = -1 \times 0 = 0$$

التأويل المباني: منحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه محور الأراتيل

بجوار $-\infty$

مثال 2: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة

2. أدرس الفرع الشلجمي لمنحنى الدالة f بجوار $+\infty$

أجبوبة 1: $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \geq 0\}$

$$x \geq 1 \Leftrightarrow x-1 \geq 0$$

ومنه: $D_f = [1; +\infty[$

ومنه: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x-1 = +\infty$ (2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x-1} = +\infty$$

التأويل المباني: منحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه محور الأراتيل

بجوار $+\infty$

تعريف 2:

إذا كانت $a \in \mathbb{R}^*$ حيث $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ و

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax)) = \infty$$

الأراتيل بجوار $+\infty$

ومنه $x = \frac{1}{2}$ محور تماثل منحني الدالة f .

مثال 2: تعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1}$$

$$\forall x \in D_f, f(x) = x - 2 + \frac{2}{x+1}$$

1. بين أن $\Omega(-1; -3)$ مركز تماثل منحني الدالة f .

2. بين أن النقطة $(-3, -1)$ مرکز تماثل منحني الدالة f .

$$x - 2 + \frac{2}{x+1} = \frac{(x-2)(x+1) + 2}{x+1} = \frac{x^2 - x}{x+1} = f(x)$$

$$\Omega(a; b) \quad \Omega(-1; -3)$$

أثبتن أن $\Omega(-1; -3)$ مركز تماثل منحني الدالة f :

$$\Leftrightarrow -2 - x \neq -2 + 1 \Leftrightarrow -x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq -1 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{-1\}$$

$$\Leftrightarrow -2 - x \in \mathbb{R} - \{-1\} \Leftrightarrow -2 - x \neq -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(-2 - x) + f(x) = -6 = 2b : \text{أثبتن أن } f(-2 - x) + f(x) = -6 = 2b$$

$$f(-4 - x) + f(x) = -4 - x - 1 + \frac{1}{-4 - x + 2} + x - 1 + \frac{1}{x + 2}$$

$$= -4 - 2 + \frac{1}{-x - 2} + \frac{1}{x + 2} = -6 + -\frac{1}{x + 2} + \frac{1}{x + 2} = -6$$

ومنه $\Omega(-2; -3)$ مركز تماثل منحني الدالة f .

V. دراسة بعض الدوال:

(1) دراسة دالة حدودية:

مثال: تعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 4x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

1. حدد D_f حيز تعريف الدالة

2. أدرس زوجية الدالة f

3. أحسب نهايات الدالة f عند محدودات D_f

4. أدرس الفروع الالانهائية لمنحني الدالة f

5. أحسب مشتقة الدالة f و أدرس إشارتها

6. حدد جدول تغيرات الدالة f

7. حدد معادلة لمماس المنحني (C_f) الممثل للدالة f في

النقطة A التي أقصولها -1

8. حدد نقط تقاطع المنحني (C_f) الممثل للدالة مع محوري المعلم.

9. حدد مطابق الدالة f اذا وجدت

10. أرسم المنحني (C_f) الممثل للدالة f في معلم متعامد منظم

أجوبة: لأنها دالة حدودية $D_f = \mathbb{R}$ ($f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$)

اذا كانت $x \in \mathbb{R}$ فان $x \in \mathbb{R}$

اذا كانت $x \in \mathbb{R}$ فان $x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = \frac{1}{3}(-x)^3 - 4(-x) = -\frac{1}{3}x^3 - 4(-x) = -\left(\frac{1}{3}x^3 - 4x\right) = -f(x)$$

ومنه f دالة فردية

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad (3)$$

لأن نهاية دالة حدودية عند مالانهائية هي نهاية حدها الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3}x^2 = +\infty \quad (4)$$

يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأرaticip بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3}x^2 = +\infty$$

يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأرaticip بجوار $-\infty$

$$(x-2)(x+2) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow f''(x) = 0 \quad (2)$$

$$x = -2 \Leftrightarrow x = 2$$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$x^2 - 4$	+	0	-	0

• تقر (C_f) نحو محور الأرaticip الموجبة على المجال:

$$[-\infty; -2] \cup [2; +\infty]$$

• تقر (C_f) نحو محور الأرaticip الموجبة على المجال: [-2, 2]

يمكن تلخيص النتائج في جدول التقر

المشتقة الثانية تتعدم وتتغير اشارتها في: $x_0 = -2$; $x_0 = 2$

اذن هناك نقطتي انعطاف هما: $A(-2; f(-2))$ و $A(2; f(2))$

IV. محور تماثل-مركز تماثل:

خصائص:

لتكن f دالة عددية معرفة على D ، و (C) منحناها في معلم متعامد

منظم و a و b عنصرين من \mathbb{R} .

■ يكون المستقيم ذو المعادلة: $x = a$ محور تماثل لمنحني (C) إذا

و فقط إذا كان:

لكل x من D ، لدينا: $f(2a - x) = f(x)$ (2a - x) و

■ تكون النقطة $\Omega(a; b)$ مركز تماثل لمنحني (C) إذا و فقط إذا كان:

لكل x من D ، لدينا: $f(2a - x) = f(x)$ (2a - x) و

. $f(2a - x) = 2b - f(x)$

ملحوظة:

■ إذا كانت f دالة زوجية فإن محور الأرaticip محور تماثل منحناها (في

معلم متعامد)

■ إذا كانت f دالة فردية فإن أصل المعلم مركز تماثل منحناها.

مثال 1: تعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة

كالتالي :

$$f(x) = \sqrt{x - x^2}$$

1. حدد حيز تعريف الدالة f

2. بين أن المستقيم $\frac{1}{2}x = f(x)$ محور تماثل لمنحني (C_f) الممثل للدالة f

الجواب:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x - x^2 \geq 0\} \quad f(x) = \sqrt{x - x^2} \quad (1)$$

$$x = 1 \Leftrightarrow x(1 - x) = 0 \Leftrightarrow x - x^2 = 0$$

و منه جدول الاشارة :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x - x^2$	-	0	+	0

و منه: $D_f = [0, 1]$

$$x = \frac{1}{2} \quad x = a \quad (2)$$

أثبتن أنه : إذا كانت $x \in [0, 1]$ فإن :

$$\Leftrightarrow 1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 + 0 \Leftrightarrow -1 \leq -x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x \in [0, 1]$$

$$1 - x \in [0, 1] \Leftrightarrow 0 \leq 1 - x \leq 1 \Leftrightarrow$$

ب(أثبتن أن : $f(1 - x) = f(x)$)

$$f(1 - x) = \sqrt{(1 - x) - (1 - x)^2} = \sqrt{1 - x - (1 - 2x + x^2)}$$

$$= \sqrt{1 - x - 1 + 2x - x^2} = \sqrt{x - x^2} = f(x)$$

6. حدد الدالة المشتقة و ادرس إشارتها.
 7. أعط جدول تغيرات f على D_f .
 8. حدد احداثيات نقط تقاطع المنحني (C_f) الممثل للدالة مع محوري المعلم.
 9. أعط معادلة المماس في النقطة ذات الأصول 0.
 10. أنشئ المنحني C_f .

أجوبة:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+2 \neq 0\} \quad (1)$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$$

(2) نقوم بالقسمة الاقليدية ل x^2+x-1 على $x+2$ فنجد :
 $x^2+x-1 = (x+2)(x-1)+1$

$$f(x) = \frac{(x+2)(x-1)+1}{x+2} = \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} + \frac{1}{x+2} = x-1 + \frac{1}{x+2}$$

اذن : $c=1$ و $b=-1$ و $a=1$ و منه :

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2+x-1}{x+2} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2+x-1}{x+2} = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

(C_f) مقارب للمنحني $x = -2$ (4)

$$f(x) - (x-1) = \frac{1}{x+2} \quad \text{يعني} \quad f(x) = x-1 + \frac{1}{x+2}$$

$$\text{يعني} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{+\infty} = 0 \quad \text{و منه المستقيم}$$

$$\text{ذا المعادلة } y = x-1 \quad \text{مقارب مائل للمنحني } (C_f) \text{ بجوار } +\infty$$

$$\text{ولدينا :} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{-\infty} = 0 \quad \text{و منه المستقيم}$$

$$\text{ذا المعادلة } y = x-1 \quad \text{مقارب مائل للمنحني } (C_f) \text{ بجوار } -\infty$$

$$\Omega(a;b) \quad \Omega(-2;-3) \quad (5)$$

أثبتن أن له : اذا كانت $\{x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ فان :

$$\Leftrightarrow -4-x \neq -4+2 \Leftrightarrow -x \neq 2 \Leftrightarrow x \neq -2 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{-2\}$$

$$-4-x \in \mathbb{R} - \{-2\} \Leftrightarrow -4-x \neq -2 \Leftrightarrow$$

$$\text{بأثبتن أن :} \quad f(-4-x) + f(x) = -6 = 2b$$

$$f(-4-x) + f(x) = -4-x-1 + \frac{1}{-4-x+2} + x-1 + \frac{1}{x+2}$$

$$= -4-2 + \frac{1}{-x-2} + \frac{1}{x+2} = -6 + -\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+2} = -6$$

و منه $\Omega(-2;-3)$ مركز تماثل منحني الدالة f .

$$f'(x) = \left(x-1 + \frac{1}{x+2} \right)' = 1 - \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} \quad (6)$$

$$f'(x) = \frac{(x+2)^2 - 1^2}{(x+2)^2} = \frac{(x+2-1)(x+2+1)}{(x+2)^2} = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$$

($x+1$) ($x+3$) هي اشارة : $f'(x)$

$$\text{يعني } (x+1)(x+3) = 0 \quad \text{أو } x+1 = 0 \quad \text{أو } x+3 = 0 \quad \text{يعني } -1 \quad \text{أو } -3$$

جدول الإشارة :

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0

(7) جدول تغيرات الدالة :

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	+
$f(x)$	$-\infty$	-5	$-\infty$	-1	$+\infty$

(8) (أ) نقط تقاطع (C_f) المنحني الممثل للدالة f مع محور الأفاصيل

$$f''(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x \right)' = \frac{1}{3}3x^2 - 4 = x^2 - 4 \quad (5)$$

$$(x-2)(x+2) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 0$$

$$x = -2 \quad \text{أو} \quad x = 2 \Leftrightarrow$$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$x^2 - 4$	+	0	-	0

(6)

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	$-\infty$	$16/3$	$-16/3$	$+\infty$

(7) معادلة لمماس ل(C_f) في النقطة A التي أقصولها $x_0 = -1$

$$f'(-1) = -3 \quad \text{و} \quad f(-1) = \frac{11}{3} \quad \text{و} \quad y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y = -3x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow y = \frac{11}{3} - 3(x+1) \Leftrightarrow y = f(-1) + f'(-1)(x+1)$$

(8) (أ) نقط تقاطع (C_f) المنحني الممثل للدالة f مع محور الأفاصيل

نحل فقط المعادلة : $\frac{1}{3}x^3 - 4x = 0$ يعني $f(x) = 0$

يعني $\frac{1}{3}x^2 - 4 = 0$ أو $x \left(\frac{1}{3}x^2 - 4 \right) = 0$

يعني $x = -\sqrt{12}$ أو $x = \sqrt{12}$ يعني $x = 0$ أو $x^2 = 12$

يعني $x = 2\sqrt{3}$ أو $x = -2\sqrt{3}$

و منه نقط التقاطع هم : $A(2\sqrt{3}; 0)$ و $B(-2\sqrt{3}; 0)$ و $O(0,0)$


(ب) نقط تقاطع (C_f) المنحني الممثل للدالة f مع محور الأراتيب

نحسب فقط : $f(0) = 0$ لدينا $f(0) = 0$ ومنه نقطة التقاطع هي : $O(0,0)$

$f(2) = -\frac{16}{3}$ هي قيمة دنيا للدالة f

$f(-2) = \frac{16}{3}$ هي قيمة قصوى للدالة f

(10) التمثيل المباني للدالة f



(2) دراسة دالة جزوية:

مثال: لتكن f دالة عدديّة معرفة بما يلي:

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$$

1. حدد D_f مجموعة تعريف الدالة

2. حدد الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث

$$\forall x \in D_f \quad f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$$

لدينا: D_f أحسب النهايات عند محدات

4. أدرس الفروع اللانهائيّة لمنحني الدالة f

(تحديد معادلة المقارب و المقارب المائلة ل(C_f)).

5. بين أن النقطة $(-3; -2)$ مركز تماثل منحني الدالة f .

وأنشئ (C_f) منحنى الدالة f^{-1} في نفس المعلم

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1-x \geq 0\} \quad (1)$$

$$x \leq 1 \Leftrightarrow 1-x \geq 0$$

$$\text{ومنه: } D_f =]-\infty; 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ومنه: } \lim_{x \rightarrow -\infty} 1-x = +\infty$$

ج) دراسة قابلية استقاق الدالة f على اليسار عند $x_0 = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1-x}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(\sqrt{1-x})^2}{(x-1)\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{(x-1)\sqrt{1-x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{(x-1)\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{\sqrt{1-x}} = -\infty$$

ومنه f غير قابلة للاستقاق على اليسار عند $x_0 = 1$:

ومبانيانا نقول ان منحنى الدالة f يقبل نصف مماس يوازي محور الأراتيب على يسار النقطة : أي $A(1; f(1))$ ووجه نحو الأعلى

$$\forall x \in]-\infty; 1] \quad f'(x)' = (-1 + \sqrt{1-x}) = 0 + \frac{(1-x)'}{2\sqrt{1-x}} = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} < 0 \quad (2)$$

جدول تغيرات الدالة :

x	$-\infty$	1
$f'(x)$	+	-
$f(x)$	$+\infty$	-1

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 + \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} + \frac{\sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} + \frac{(\sqrt{1-x})^2}{x\sqrt{1-x}} \quad (3)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} + \frac{1-x}{x\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} + \frac{1-x}{x} \times \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} + \frac{-x}{x} \times \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 0 - 1 \times 0 = 0$$

التأويل المباني: منحنى (C) يقبل فرعاً شلجمياً اتجاهه محور الأفاصيل بجوار $-\infty$

أ) دالة متصلة على المجال $I =]-\infty; 1]$ و f تناصية قطعاً

ومنه f تقبل دالة عكسية f^{-1} معرفة

على مجال: $J = f(I) = f(]-\infty; 1]) = [-1; +\infty[$

$$(b) \quad \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in f(I) \end{cases}$$

$$-1 + \sqrt{1-y} = x \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} f(y) = x \\ y \in]-\infty; 1] \end{cases}$$

$$\text{يعني} \quad \sqrt{1-y} = x + 1 \quad 2y - 1 = x^2$$

$$\text{يعني} \quad y = 1 - (x+1)^2 \quad \text{يعني} \quad 1-y = (x+1)^2 \quad \text{يعني} \quad \sqrt{1-y} = (x+1)$$

$$\text{يعني} \quad y = -x^2 - 2x$$

ومنه: $\forall x \in [-1; +\infty[\quad f^{-1}(x) = -x^2 - 2x$

x	-8	-3	0	1
$f(x)$	2	1	0	-1

ج) (4)

نحل فقط المعادلة: $f(x) = 0$ يعني $x = 0$

$$x^2 + x - 1 = 0$$

نحل المعادلة باستعمال المميز

$$c = -1 \quad \text{و} \quad a = 1$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5 > 0$$

بما أن $0 > \Delta$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

ومنه نقط تقاطع هما: $B\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}; 0\right)$ أو $A\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; 0\right)$

ب) نقط تقاطع (C_f) المنحنى الممثل للدالة f مع محور الأراتيب

نحسب فقط: $f(0) = \frac{1}{2}$ لدينا $f(0) = \frac{1}{2}$ ومنه نقطة التقاطع هي:


(9) معادلة المماس في النقطة ذات الأقصول 2.

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (2)$$

$$f(0) = -\frac{1}{2} \quad \text{و} \quad f'(0) = \frac{(0+1)(0+3)}{(0+2)^2} = \frac{3}{4}$$

$$y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4}x \Leftrightarrow y = f(0) + f'(0)(x - 0)$$

(10) التمثيل المباني للدالة :



(3) دراسة دالة لاجذرية:

مثال: تعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة كالتالي :

$$f(x) = -1 + \sqrt{1-x}$$

ليكن (C_f) الممثل للدالة f في معلم متعمد منظم (o, i, j)

(1) أ) حدد D_f حيز تعريف الدالة f بـ (ب) (أ) حدد

ج) دراسة قابلية استقاق الدالة f على اليسار عند $x_0 = 1$ وأعط تأويلاً هندسياً للنتيجة المحصل عليها.

(2) دراسة تغيرات الدالة f و حدد جدول تغيرات الدالة f

(3) دراسة الفروع اللانهائية لمنحنى الدالة f


(4) أ) بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f^{-1} معرفة على مجال J يجب تحديده

ب) حدد $f^{-1}(x)$ لكل x من J

ج) املاً الجدول التالي

x	-8	-3	0	1
$f(x)$				

منحنى الدالة f^{-1} هو تماثل منحنى الدالة f بالنسبة للمسقط $x = y$ في معلم متعدد منظم



تمرين: نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة كالتالي :

$$f(x) = \sqrt{x-2x^2} \quad (\text{ليكن } C_f \text{ الممثل للدالة } f)$$

$$\|i\| = 8 \text{ cm} \quad (\text{حيث } i = \vec{o}, \vec{i}, \vec{j})$$

(1) حدد D_f حيز تعریف الدالة

(2) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين عند $x_0 = 0$ وعلى اليسار عند $x_0 = 2$ وأعط تأويلاً هندسياً للنتائج المحصل عليها

(3) بين أن المستقيم $\frac{1}{4}x$ المعادلة (C_f) محور تماثل لمنحنى

(4) أنشئ (C_f) بين أن قصور الدالة f على المجال $I = \left[0; \frac{1}{4}\right]$

تقبل دالة عكسية معرفة على مجال J يجب تحديده وحدد $f^{-1}(x)$

لكل x من J

مثال: لتكن f دالة عددية معرفة بما يلي:

$f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$. حدد D_f مجموعه تعریف الدالة

أدرس زوجية الدالة f

أحسب النهايات عند حدات D_f

أدرس الفروع اللانهائية لمنحنى الدالة f

(تحديد معادلة المقاربات و المقاربات المائلة C_f).

5. بين أن النقطة $(-2; -3)$ مرکز تماثل لمنحنى الدالة f .

6. حدد الدالة المشقة و ادرس إشارتها.

7. أعط جدول تغيرات f على D_f

8. حدد احداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) الممثل للدالة مع محوري المعلم.

9. أعط معادلة المماس في النقطة ذات الأقصوى 0 .

10. أنشئ المنحنى C_f .

أجوبة:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[\quad D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+2 \neq 0\} \quad (1)$$

(2) نقوم بالقسمة الاقلیدية لـ -1 على $x+2$ فنجد : $x^2+x-1 = (x+2)(x-1)+1$

$$f(x) = \frac{(x+2)(x-1)+1}{x+2} = \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} + \frac{1}{x+2} = x-1 + \frac{1}{x+2} \quad \text{اذن :}$$

$$\text{ومنه : } b = -1 \quad \text{و } a = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2+x-1}{x+2} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad \text{و } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2+x-1}{x+2} = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

مقارب للمنحنى (C_f) $x = -2$ (4)

$$f(x) - (x-1) = \frac{1}{x+2} \quad \text{يعني} \quad f(x) = x-1 + \frac{1}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

ذى المعادلة $y = x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

ولدينا: ذى المعادلة $y = x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$

$$\Omega(a; b) \quad \Omega(-2; -3) \quad (5)$$

أ(نبين أنه: اذا كانت $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ فان:)

$$-4 - x \in \mathbb{R} - \{-2\} \Leftrightarrow -4 - x \neq -2 \Leftrightarrow -4 - x \neq -4 + 2 \Leftrightarrow -x \neq 2 \Leftrightarrow x \neq -2 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{-2\}$$

$$\text{ب(نبين أن: } f(-4-x) + f(x) = -6 = 2b$$

$$\begin{aligned} f(-4-x) + f(x) &= -4 - x - 1 + \frac{1}{-4-x+2} + x - 1 + \frac{1}{x+2} \\ &= -4 - 2 + \frac{1}{-x-2} + \frac{1}{x+2} = -6 + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+2} = -6 \\ &\quad . \text{ ومنه مركز تماثل منحنى الدالة } \Omega(-2; -3) \end{aligned}$$

$$\text{يعني } f'(x) = \left(x - 1 + \frac{1}{x+2} \right)' = 1 - \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} \quad (6)$$

$$f'(x) = \frac{(x+2)^2 - 1^2}{(x+2)^2} = \frac{(x+2-1)(x+2+1)}{(x+2)^2} = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$$

اشارة $f'(x)$ هي اشارة: $(x+1)(x+3)$

$$\text{يعني } x = -3 \text{ أو } x = -1 \text{ أو } x = 0 \quad (x+1)(x+3) = 0$$

جدول الاشارة:

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0

(7) جدول تغيرات الدالة:

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow -5$	$\searrow -\infty$	$\nearrow -1$	$\nearrow +\infty$

(8) نقط تقاطع (C_f) المنحنى الممثل للدالة f مع محور الأفاسيل

$$\frac{x^2 + x - 1}{x + 2} = 0 \quad \text{يعني} \quad f(x) = 0$$

$$x^2 + x - 1 = 0$$

نحل المعادلة باستعمال المميز

$$c = -1 \text{ و } b = 1 \text{ و } a = 1$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5 > 0$$

بما أن $0 > \Delta$ فان هذه المعادلة تقبل حلين هما:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

ومنه نقط تقاطع هما: $B\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}; 0\right)$ أو $A\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; 0\right)$

(ب) نقط تقاطع (C_f) المنحنى الممثل للدالة f مع محور الأراتيب

$$\text{نحسب فقط: } f(0) = \frac{1}{2} \quad \text{لدينا} \quad f(0) = \frac{1}{2} \quad \text{ومنه نقطة التقاطع هي: } C\left(0, \frac{1}{2}\right)$$

9) معادلة المماس في النقطة ذات الأقصى 2.

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (2)$$

$$f(0) = -\frac{1}{2} \quad f'(0) = \frac{(0+1)(0+3)}{(0+2)^2} = \frac{3}{4}$$

$$y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4}x \Leftrightarrow y = f(0) + f'(0)(x - 0)$$

: التمثيل المباني للدالة :

