

خاص بالمرشحين
الرسميين والأحرار

مدة الاجاز: ساعة واحدة

المعامل: 1

**الامتحان الجهوي الموحد
لنيل شهادة السلك الإعدادي
دوره يونيو 2018
مادة علوم الحياة والأرض**

عناصر الأجوبة

السلطنة
وزارة التربية والتعليم
والكتاب المدرسي
والعلم المعياري للمدارس
للمراحل التعليمية



السلطنة
وزارة التربية والتعليم
والكتاب المدرسي
والعلم المعياري للمدارس
للمراحل التعليمية

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
الدار البيضاء - سطات



		المكون الأول (8 نقط)
(ن) 2(ن)	4x 0,5	1. حساسية شعورية: (ب) - تحركية إرادية: (أ) و(د) - تحركية لا إرادية: (ج).
(ن) 2(ن)	4x 0,5	2. أ- منطقة ارتباط الليف العضلي بعده ألياف عصبية. ب- تقلص العضلة بفعل التهيج حيث ينخفض طولها وتنتفخ وتصبح صلبة. ج- وحدة بنوية ووظيفية للجهاز العضلي. د- تمدد مفرط للعضلة مصحوب بألام.
(ن) 2(ن)	4x 0,5	3. أ- خطأ ب- صحيح ج- خطأ د- صحيح
(ن) 2(ن)	2x1	4. فصيلة دم مريم: A(Rh-) فصيلة دم سعيد: O (Rh+)
		المكون الثاني (12 نقطة)
		التمرين الأول: (6 ن)
1 ان	2 x 0,5	1. تقبل فرضيتين منطقتين من قبيل: ربما صعوبة تحريك الرجل اليمنى من طرف أحد راجع إما: - إصابة في النخاع الشوكي - إصابة في الباحة الحركية - إصابة في العضلات - إصابة في العصب الوركي للرجل اليمنى.....
1 ان، 5	2 x 0,75	2. يقبل كل جواب من قبيل: - الوثيقة 2: يتوفّر الشخص السليم على غضروف ذو بنية عاديّة. - الوثيقة 3: يتوفّر الشخص المصاب على غضروف ذو بنية مشوّهة (غير سليمة) بسبب حدوث انزلاق غضروفي (انحراف...).
1 ان	1 ان	3. يؤدي الانزلاق الغضروفي عند الشخص المصاب لأنضغاط العصب السيساني.
1 ان	2 x 0,5	4. تمنح (0,5 ن) لكل فرضية تمت بر هنتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
1 ان، 5	1,5	5. طبيعة عمل أحمد (حمل السلع في سوق الجملة) تسبّبت له في حدوث انزلاق غضروفي على مستوى المنطقة القطنية أدى إلى انضغاط على مستوى العصب، والذي أثر سلباً على نقل السائلة العصبية الحركية في العصب الوركي للرجل اليمنى. (تراعي طريقة التعليل).

		التمرين الثاني: (3ن)
1ن	1	1. انجاز مقارنة صحيحة.
0,5ن	0,5	2. استجابة مناعية ذات وسيط خلوي.
1ن,5	1	3. المتوقع هو تكاثر الخلايا السرطانية...
	0,5	- التعليل: لأن الخلايا المقاوية LT المستعملة غير محسنة ضد الخلايا السرطانية.
		التمرين الثالث: (3ن)
1ن	1	1. استجابة أرجية.
0.5ن	0.5	2. مؤرج.
1ن,5	1,5	3. دخول بروتينات لعاب البعوضة (المؤرج) تسبب في إفراز كبير لمضادات الأجسام IgE من طرف المقاويات B نتج عنه تنشيط الخلايا البدنية التي أفرزت كميات كبيرة لمادة الهيستامين محدثة ظهور الاستجابة الأرجية.