

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES 2008
 EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP
 MATHEMATIQUES 2
 CORRIGÉ

I. EXEMPLES

1. (a) Le polynôme caractéristique de $M(\alpha)$ est

$$\begin{aligned} P_{M(\alpha)}(X) &= -X^3 + \text{tr}(M(\alpha))X^2 - \text{tr}(\text{Com}(M(\alpha)))X + \det(M(\alpha)) \\ &= -X^3 + (5 - \alpha)X^2 - (8 - 3\alpha)X + (4 - 2\alpha) \\ &= (1 - X)(2 - X)((2 - \alpha) - X). \end{aligned}$$

Les racines de $P_{M(\alpha)}$ sont bien les éléments diagonaux de $M(\alpha)$.

Pour tout α , la matrice $M(\alpha)$ est une matrice à diagonale propre.

- (b) Si $\alpha \neq 0$ et $\alpha \neq 1$ alors les valeurs propres de $M(\alpha)$ sont deux à deux distinctes, $M(\alpha)$ est diagonalisable.

Si $\alpha = 0$ les valeurs propres sont 1 de multiplicité 1 et 2 de multiplicité 2.

$$\text{rg}(M(0) - 2I_3) = \text{rg} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1, \text{ la dimension de } E_2 \text{ est donc 2 et } M(0) \text{ est}$$

diagonalisable.

Si $\alpha = 1$ les valeurs propres sont 1 de multiplicité 2 et 2 de multiplicité 1.

$$\text{rg}(M(1) - I_3) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \text{ la dimension de } E_1 \text{ est donc 1 et } M(0) \text{ n'est pas}$$

diagonalisable.

$M(\alpha)$ est diagonalisable si et seulement si $\alpha \neq 1$.

2. $P_A(X) = -X^3 + \text{tr}(A)X^2 - \text{tr}(\text{Com}(A))X + \det(A) = -X^3 - X$.

P_A n'est pas scindé sur \mathbb{R} donc la matrice A n'est pas à diagonale propre.

3. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$P_A(X) = X^2 - (a + d)X + (ad - bc).$$

$$\text{Soit } Q(X) = (X - a)(X - d) = X^2 - (a + d)X + ad.$$

la matrice A est à diagonale propre si et seulement si $P_A = Q$, c'est à dire si et seulement si $bc = 0$.

\mathcal{E}_2 est donc l'ensemble des matrices triangulaires.

L'ensemble des matrices triangulaires supérieures est fermé comme sous-espace vectoriel en dimension finie, de même pour l'ensemble des matrices triangulaires inférieures.

\mathcal{E}_2 est donc la réunion de deux fermés.

\mathcal{E}_2 est donc une partie fermée de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

II. TEST DANS LE CAS $n = 3$

4. Pour une matrice à diagonale propre, le déterminant est égal au produit des éléments diagonaux.

Une matrice à diagonale propre est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls

Il suffit de prendre une matrice triangulaire, non diagonale et inversible:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. A est une matrice à diagonale propre si et seulement si son polynôme caractéristique est égal à $(a_{11} - X)(a_{22} - X)(a_{33} - X)$

En développant ces deux polynômes et en identifiant leurs coefficients on trouve que

A est une matrice à diagonale propre si et seulement si
 $\det A = \prod_{i=1}^3 a_{ii}$ et $a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31} + a_{23}a_{32} = 0$

6. (a) Si $(\det A = a_{11}a_{22}a_{33})$ et $(a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31} + a_{23}a_{32} = 0)$
alors la matrice est MDP
sinon la matrice n'est pas MDP.
- (b) Les matrices à diagonale propre sont A_1, A_3, A_4, A_5, A_6 et A_8
- (c) $a_{12}a_{21} = a_{13}a_{31} = a_{23}a_{32} = 0$

III. EXEMPLES DE MATRICES PAR BLOCS

7. Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$. On note r et s les dimensions des matrices A et C .

Alors $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$.

En développant r fois par rapport à la première colonne, on montre que

$$\det \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det C$$

En développant s fois par rapport à la dernière ligne, on montre que

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_s \end{pmatrix} = \det A.$$

On a donc bien $\det M = \det A \det C$.

8. (a) Si $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ est une matrice par blocs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et si les matrices A et C sont des matrices carrées d'ordre r et s à diagonale propre, alors M est une matrice à diagonale propre. En effet, d'après la question précédente,

$$P_M(X) = \det \begin{pmatrix} A - XI_r & B \\ 0 & C - XI_s \end{pmatrix} = \det(A - XI_r) \det(C - XI_s) = P_A(X)P_C(X)$$

Les matrices A et C étant à diagonale propre, les valeurs propres de M sont ses éléments diagonaux.

On prend alors $A = (1)$ (matrice à diagonale propre car triangulaire), $B = (111)$ et $C = A_5$ (définie à la question 6, matrice à diagonale propre dont tous les termes sont non nuls)

On obtient $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

M est à diagonale propre et contient bien treize réels non nuls

- (b) Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ une matrice par blocs de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ où les matrices A, B et C sont des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui ne contiennent aucun terme nul.

De même qu'en a), $P_M(X) = P_A(X)P_C(X)$.

Posons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$.

Si a ou d est valeur propre de A , alors P_A est scindé et $\text{tr } A = a + d$, les valeurs propres de A sont alors a et d , la matrice A est alors à diagonale propre et d'après la question 3. c'est une matrice triangulaire ce qui est impossible car la matrice A ne contient aucun terme nul.

Donc, les valeurs propres de A sont e et h et les valeurs propres de C sont a et d .

On en déduit $P_A(X) = (X - e)(X - h)$ et $P_C(X) = (X - a)(X - d)$.

En développant ces polynômes et en identifiant leurs coefficients, on obtient les relations:

$$\begin{cases} a + d = e + h \\ ad - bc = eh \\ eh - gf = ad \end{cases}$$

Il suffit de trouver des réels a, b, c, d, e, f, g et h tous non nuls vérifiant ces équations et de prendre une matrice B quelconque ne contenant aucun terme nul.

Par exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

On obtient : $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

IV. QUELQUES PROPRIETES

9. On note $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Les valeurs propres de A sont $a_{11}, a_{22} \dots a_{nn}$.

Les valeurs propres de $aA + bI_n$ sont $a.a_{11} + b, a.a_{22} + b \dots a.a_{nn} + b$.

Ce sont les termes diagonaux de $aA + bI_n$,

$aA + bI_n$ est donc une matrice à diagonale propre.

Les termes diagonaux et les valeurs propres d'une matrice et de sa transposée sont les mêmes, et ${}^t(aA + bI_n) = a{}^tA + bI_n$,

$a{}^tA + bI_n$ est donc une matrice à diagonale propre.

10. Soit $A \in \mathcal{E}_n$.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $U_p = A - \frac{1}{p}I_n$.

D'après la question précédente, U_p est une matrice à diagonale propre.

D'autre part, $\det U_p = P_A(\frac{1}{p})$ est nul si et seulement si $\frac{1}{p}$ est valeur propre de A . U_p est donc inversible sauf pour un nombre fini de valeurs de p .

Il existe donc un entier P_0 tel que la suite $(U_p)_{p \geq P_0}$ soit une suite d'éléments de G_n . Cette suite converge vers A .

De la caractérisation séquentielle de la densité, on déduit que G_n est dense dans \mathcal{E}_n .

11. (a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est une matrice réelle symétrique donc elle est diagonalisable et aussi trigonalisable, mais d'après la question 3., elle n'est pas à diagonale propre.

Une matrice trigonalisable n'est pas nécessairement à diagonale propre.

(b) Par définition, le polynôme caractéristique d'une matrice à diagonale propre est scindé, une telle matrice est donc trigonalisable.

Une matrice à diagonale propre est trigonalisable

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Si A est semblable à une matrice B à diagonale propre, alors $P_A = P_B$ et P_B est scindé, donc P_A est scindé.

Si P_A est scindé, alors A est semblable à une matrice triangulaire supérieure, or toute matrice triangulaire est à diagonale propre donc A est semblable à une matrice à diagonale propre.

A est semblable à une matrice à diagonale propre si et seulement si P_A est scindé.

12. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Comme toute matrice triangulaire est à diagonale propre, il suffit d'écrire A comme une somme de deux matrices triangulaires:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Pour tout $n \geq 2$ il existe une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui n'est pas à diagonale propre, par exemple la matrice par blocs $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Cette matrice s'écrit comme somme de deux matrices à diagonale propre, donc

\mathcal{E}_n n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

V. MATRICES SYMETRIQUES ET MATRICES ANTISYMETRIQUES

$$13. \operatorname{tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

14. (a) A est une matrice réelle et symétrique donc il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telles que $A = PD^tP$.

$$\operatorname{tr}({}^tAA) = \operatorname{tr}(PD^tPPD^tP)$$

$$= \operatorname{tr}(PDD^tP) \text{ (car } {}^tPP = I_n.)$$

$$= \operatorname{tr}(D^2) \text{ (car } PD^{2t}P \text{ semblable à } D^2 \text{ et deux matrices semblables ont la même trace.)}$$

$$\text{Or } \operatorname{tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \text{ et } \operatorname{tr}(D^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2, \text{ donc}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2.}$$

- (b) Si de plus A est une matrice à diagonale propre, alors les valeurs propres de A sont $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 \text{ et } \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}^2 = 0, \text{ la matrice } A \text{ est une matrice diagonale.}$$

Réciproquement, toute matrice diagonale est à diagonale propre.

$\boxed{\text{Les matrices symétriques réelles à diagonale propre sont donc les matrices diagonales.}}$

15. (a) A est antisymétrique, donc tous ses éléments diagonaux sont nuls et comme elle est à diagonale propre, son polynôme caractéristique est scindé et toutes ses valeurs propres sont nulles. On a donc $P_A(X) = (-1)^n X^n$ et par le théorème de Cayley-Hamilton $\boxed{A^n = 0}$.

$$({}^tAA)^n = (-AA)^n = (-1)^n A^{2n} = 0. \quad \boxed{({}^tAA)^n = 0.}$$

- (b) tAA est une matrice réelle symétrique donc elle est diagonalisable.

$$({}^tAA)^n = 0 \text{ donc toutes les valeurs propres de } {}^tAA \text{ sont nulles.}$$

$$\text{On en déduit } \boxed{{}^tAA = 0.}$$

- (c) De ce qui précède, on déduit que $\operatorname{tr}({}^tAA) = 0$ donc $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = 0$.

$\boxed{A \text{ est donc la matrice nulle.}}$

VI. DIMENSION MAXIMALE D'UN ESPACE VECTORIEL INCLUS DANS \mathcal{E}_n

$$16. \dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n-1)}{2}.$$

17. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que l'on ait $F \subset \mathcal{E}_n$.

De la question 15., on déduit $F \cap \mathcal{A}_n = \{0\}$.

$$\text{Donc } \dim F + \dim \mathcal{A}_n = \dim(F + \mathcal{A}_n) \leq \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = n^2$$

$$\text{On en déduit } \dim F \leq n^2 - \dim \mathcal{A}_n = n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\boxed{\dim F \leq \frac{n(n+1)}{2}.}$$

Le sous-espace des matrices triangulaires supérieures est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ et il est inclus dans \mathcal{E}_n .

$\boxed{\text{La dimension maximale d'un sous-espace vectoriel } F \text{ de } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ vérifiant } F \subset \mathcal{E}_n \text{ est donc } \frac{n(n+1)}{2}.}$

18. On prend pour F l'ensemble des matrices M de la forme $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ avec

$A \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure.

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & \cdots & m_{1n} \\ 0 & m_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & m_{32} & m_{33} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & m_{n2} & \cdots & \cdots & m_{nn} \end{pmatrix}$$

L'ensemble de ces matrices est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ qui n'est pas constitué uniquement de matrices triangulaires.

Les matrices A et C sont à diagonale propre et d'après ce que l'on a vu dans la question 8., on en déduit que M est à diagonale propre et que donc $F \subset \mathcal{E}_n$.

On a déterminé un sous-espace vectoriel F de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $F \subset \mathcal{E}_n$, de dimension maximale mais tel que F ne soit pas constitué uniquement de matrices triangulaires.