

CONCOURS D'ADMISSION 2010

## DEUXIÈME COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

\*\*\*

Sur les sous-groupes finis de  $GL_2(\mathbf{C})$ 

Le but de ce problème est de caractériser les sous-groupes finis de  $GL_2(\mathbf{C})$  ne contenant pas d'homothétie autre que l'identité.

## Notations et conventions

Soit  $G$  un groupe fini (noté multiplicativement) de cardinal  $|G|$ . On note  $\mathbf{1}_G$  l'unité de  $G$ . On rappelle que tout élément  $g$  de  $G$  vérifie  $g^{|G|} = \mathbf{1}_G$  et on admet que si  $p$  est un nombre premier qui divise  $|G|$ , alors il existe  $g \in G \setminus \{\mathbf{1}_G\}$  tel que  $g^p = \mathbf{1}_G$ .

Si  $E$  est un  $\mathbf{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, on note  $GL(E)$  le groupe des endomorphismes inversibles de  $E$  et  $\text{Id}_E$  l'identité de  $E$ . Si  $\varphi$  un endomorphisme de  $E$ , on note  $\text{Tr}(\varphi)$  la trace de  $\varphi$  et  $\det(\varphi)$  son déterminant.

Si  $G$  est un sous-groupe fini de  $GL(E)$ , et  $V$  un sous-espace vectoriel de  $E$ , on note  $V^G$  l'ensemble des vecteurs fixés par  $G$  :  $V^G = \{v \in V \mid \forall g \in G, g(v) = v\}$ . On dit que  $V$  est **stable** par  $G$  si quels que soient  $g \in G$ ,  $v \in V$ , on a  $g(v) \in V$  et on dit que  $E$  est **irréductible** pour  $G$  si ses seuls sous-espaces stables par  $G$  sont  $E$  et  $\{0\}$ .

On note  $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$  l'espace des matrices carrées de taille  $n$  à coefficients complexes et  $GL_n(\mathbf{C})$  le groupe des matrices inversibles dans  $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ .

On note  $D_n$  le sous-groupe de  $GL_2(\mathbf{C})$  à  $2n$  éléments formé des matrices  $\begin{pmatrix} c^k & 0 \\ 0 & c^{-k} \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 & -c^k \\ -c^{-k} & 0 \end{pmatrix}$ , où  $k$  est un entier compris entre 0 et  $n-1$  et  $c = e^{2i\pi/n}$  (on ne demande pas de vérifier que  $D_n$  est un groupe).

I – Sous-groupes finis de  $GL(E)$ 

1. Soit  $E$  un  $\mathbf{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit  $G$  un sous-groupe fini de  $GL(E)$ . Démontrer que, pour tout  $g \in G$ ,  $g$  est diagonalisable et que, si  $G$  est commutatif, tous les éléments de  $G$  sont diagonalisables dans une même base.

## II – Isométries du triangle

2. On se place dans le plan euclidien, muni d'un repère orthonormé centré en  $O$ . On s'intéresse au sous-groupe  $\widetilde{D}_3$  des isométries du plan qui préservent un triangle équilatéral  $ABC$  de centre  $O$ .

2a. Faire l'inventaire des éléments de  $\widetilde{D}_3$  et démontrer que  $\widetilde{D}_3$  est de cardinal 6.

2b. En se plaçant dans la base (non orthonormée)  $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ , démontrer que le groupe  $\widetilde{D}_3$  est isomorphe à un sous-groupe de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  formé de matrices  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  où  $a, b, c, d$  sont dans  $\{-1, 0, 1\}$ .

2c. Diagonaliser dans  $\mathbf{C}$  la matrice  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . En déduire que le groupe  $\widetilde{D}_3$  est isomorphe au groupe  $D_3$ .

## III – Lemme de Schur

Notons  $\mathcal{A} = \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$  et  $E = \mathbf{C}^n$ . Notons  $I_n$  la matrice identité de  $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ . On appelle homothétie une matrice de la forme  $\lambda I_n$ ,  $\lambda \in \mathbf{C}$ . Soit  $G$  un sous-groupe fini de  $\text{GL}_n(\mathbf{C})$ . Pour tout  $B \in G$ , on note  $i(B)$  l'application :

$$i(B) : \begin{cases} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \\ M \longmapsto BMB^{-1} \end{cases} .$$

3. Montrer que  $i : B \mapsto i(B)$  est un morphisme de groupes de  $G$  dans  $\text{GL}(\mathcal{A})$ , et que  $i$  est injectif si et seulement si  $G$  ne contient pas d'homothéties autres que l'identité.

On note  $\widetilde{G}$  l'image par  $i$  de  $G$  et  $\mathcal{A}^{\widetilde{G}}$  l'ensemble des matrices  $M \in \mathcal{A}$  telles que  $i(B)(M) = M$  pour tout  $B$  dans  $\widetilde{G}$ .

4. Soit  $M \in \mathcal{A}^{\widetilde{G}}$ . Démontrer que  $\text{Ker}(M)$  et  $\text{Im}(M)$  sont des sous-espaces stables par  $G$ .

5. On suppose que  $E$  est irréductible pour  $G$ . Soit  $M \in \mathcal{A}^{\widetilde{G}}$ , démontrer que  $M$  est soit nulle, soit inversible. En déduire que  $\mathcal{A}^{\widetilde{G}}$  est de dimension 1.

6. Soient  $M, N \in \mathcal{A}$ . On considère l'endomorphisme de  $\mathcal{A}$  suivant,  $\Phi : X \mapsto MXN$ .

Démontrer que  $\text{Tr}(\Phi) = \text{Tr}(M) \text{Tr}(N)$ .

7. Soit  $P = \frac{1}{|G|} \sum_{B \in G} B$ .

7a. Démontrer que  $P^2 = P$ . En déduire que  $P$  est diagonalisable.

7b. Démontrer que  $\text{Im}(P) = E^G$  et en déduire que  $\dim(E^G) = \frac{1}{|G|} \sum_{B \in G} \text{Tr}(B)$ .

8. Démontrer que  $\dim(\mathcal{A}^{\widetilde{G}}) = \frac{1}{|G|} \sum_{B \in G} \text{Tr}(B^{-1}) \text{Tr}(B)$ .

(On pourra considérer d'abord le cas où  $i$  est injectif.)

On suppose, jusqu'à la fin de cette partie, que  $E$  est irréductible pour  $G$ .

**9a.** Soit  $X$  dans  $\mathcal{A}$  une matrice qui commute avec toutes les matrices de  $G$ . Démontrer que  $X = \frac{1}{n} \text{Tr}(X)I_n$ .

**9b.** Soit  $Y = \sum_{B \in G} \text{Tr}(B^{-1})B$ . Démontrer que  $Y = \frac{|G|}{n} I_n$ .

**10.** On garde la notation  $Y$  jusqu'à la fin de cette partie. Soit  $\zeta = e^{2i\pi/|G|}$ . On note

$$\mathbf{Z}_G = \{a_0\zeta^0 + a_1\zeta^1 + \cdots + a_{|G|-1}\zeta^{|G|-1}, a_i \in \mathbf{Z}\}$$

et  $\mathbf{Z}_G[G]$  les combinaisons linéaires, à coefficients dans  $\mathbf{Z}_G$ , de matrices de  $G$ .

**10a.** Démontrer que pour tout  $B \in G$ ,  $\text{Tr}(B)$  est dans  $\mathbf{Z}_G$ , puis que  $Y$  est dans  $\mathbf{Z}_G[G]$ .

**10b.** On note  $(C_k)_{1 \leq k \leq |G|^2}$  les  $|G|^2$  matrices  $\zeta^i B$  (où  $1 \leq i \leq |G|$  et  $B \in G$ ) de  $\mathbf{Z}_G[G]$ . Démontrer que pour tous  $1 \leq k \leq |G|^2$ , on peut trouver des coefficients  $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq |G|^2}$  dans  $\mathbf{Z}$  tels que  $YC_k = \sum_{1 \leq \ell \leq |G|^2} a_{\ell k} C_\ell$ .

**10c.** On pose  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq |G|^2}$  et  $R = \frac{|G|}{n} I_{|G|^2} - A$ . Démontrer que  $\det(R) = 0$ .

**10d.** Démontrer que  $\frac{|G|}{n}$  est racine d'un polynôme à coefficients dans  $\mathbf{Z}$  de degré  $|G|^2$  et de terme dominant égal à 1. En déduire que  $n$  divise  $|G|$ .

#### IV - Une caractérisation de $D_n$ , $n$ impair

Soit  $G$  un sous-groupe fini de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$ . Notons  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  le produit scalaire hermitien usuel sur  $\mathbf{C}^2$ , et posons pour tout  $v, w \in \mathbf{C}^2$

$$\langle v, w \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{B \in G} \langle B(v), B(w) \rangle.$$

**11a.** Montrer que  $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$  est un produit scalaire hermitien sur  $\mathbf{C}^2$ , vérifiant quels que soient  $v, w \in \mathbf{C}^2$  et  $B \in G$ ,  $\langle B(v), B(w) \rangle_0 = \langle v, w \rangle_0$ .

**11b.** Démontrer que si  $\mathbf{C}^2$  n'est pas irréductible pour  $G$ , il existe une base orthogonale de  $\mathbf{C}^2$  pour le produit scalaire hermitien  $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$  qui diagonalise les matrices de  $G$ . En déduire que  $G$  est commutatif.

**12a.** On note  $\text{SL}_2(\mathbf{C})$  le sous-groupe de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  des matrices de déterminant 1. Quels sont les matrices  $B \in \text{SL}_2(\mathbf{C})$  telles que  $B^2 = I_2$  ?

**12b.** Démontrer que si  $G \subset \text{SL}_2(\mathbf{C})$  est non commutatif, alors  $|G|$  est pair. En déduire que  $-I_2 \in G$ . (Utiliser les rappels du préambule.)

On suppose par la suite que  $G$  est un sous groupe fini de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  ne contenant aucune homothétie autre que l'identité. On note  $G_0 = G \cap \text{SL}_2(\mathbf{C})$

**13a.** Démontrer que  $G_0$  est commutatif. En déduire qu'il existe  $P$  dans  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  et un sous-

groupe  $\Gamma_0$  de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  formé de matrices diagonales de la forme  $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$  tels que  $B \mapsto PBP^{-1}$  soit un isomorphisme de  $G_0$  sur  $\Gamma_0$ .

**13b.** Démontrer qu'il existe un entier  $m$  tel que  $\Gamma_0$  soit le groupe  $\mathcal{Z}_m$  des matrices  $\begin{pmatrix} c^k & 0 \\ 0 & c^{-k} \end{pmatrix}$  où  $c = e^{2i\pi/m}$  et  $k$  prend les valeurs de 0 à  $m - 1$ .

**13c.** Si  $G_0 = \{I_2\}$  démontrer qu'alors  $G$  est commutatif (considérer le morphisme de groupe  $\det : G \rightarrow \mathbf{C}^*$ ).

**On suppose dans les questions 14 et 15 que  $G$  n'est pas commutatif et que  $G_0$  est exactement le groupe  $\mathcal{Z}_m$ .**

**14.** Soit  $B_0$  une matrice dans  $G$  qui n'est pas diagonale.

**14a.** Démontrer que pour tout  $C \in \mathcal{Z}_m$  on a  $B_0CB_0^{-1} \in \mathcal{Z}_m$ . En déduire que  $B_0$  est de la forme  $B_0 = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b' & 0 \end{pmatrix}$  avec  $b, b' \in \mathbf{C}$ .

**14b.** Calculer  $B_0^2$  et en déduire que  $b' = b^{-1}$ .

**14c.** Montrer qu'il existe  $Q \in \text{GL}_2(\mathbf{C})$  diagonale telle que  $QB_0Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

**15a.** Soit  $B$  une matrice diagonale dans  $G$ . Montrer que  $B \in \mathcal{Z}_m$ .

**15b.** Montrer que  $B \mapsto QBQ^{-1}$  est un isomorphisme de  $G$  sur le groupe  $D_m$ .

**16.** Soit  $G$  un sous-groupe fini commutatif de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  qui ne contient pas d'homothétie autre que l'identité.

**16a.** Montrer qu'il existe une matrice  $P \in \text{GL}_2(\mathbf{C})$  et deux morphismes de groupes  $\chi_1, \chi_2 : G \rightarrow \mathbf{C}^*$  tels que toute matrice de  $G$  s'écrive  $B = P \begin{pmatrix} \chi_1(B) & 0 \\ 0 & \chi_2(B) \end{pmatrix} P^{-1}$ .

**16b.** Montrer que  $B \mapsto \chi_1(B)\chi_2(B)^{-1}$  est un isomorphisme de  $G$  dans le groupe des racines  $|G|$ -ièmes de l'unité.

**16c.** Montrer que  $G$  est le groupe des matrices de la forme  $P \begin{pmatrix} c^k & 0 \\ 0 & d^k \end{pmatrix} P^{-1}$ ,  $k$  variant de 0 à  $|G| - 1$ , où l'on a posé  $c = e^{2i\pi p/|G|}$  et  $d = e^{2i\pi q/|G|}$ ,  $p$  et  $q$  étant deux entiers tels que  $p - q$  est premier avec  $|G|$ .

**17.** Décrire à partir des questions précédentes tous les sous-groupes finis de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$  ne contenant pas d'homothétie autre que l'identité.

**18.** Montrer que le groupe fini commutatif  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$  ne peut pas être isomorphe à un sous-groupe de  $\text{GL}_2(\mathbf{C})$ .

\* \*  
\*