I - Préliminaires

Fonctions convexes

I.1. (a) $\Rightarrow$ **:** On suppose que f est convexe. Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. Montrons $\varphi_{x,y}$ est convexe.
Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Soit $\lambda \in [0,1]$. On a :

$$\varphi_{x,y}(\lambda a + (1-\lambda)b) = f\left(x + (\lambda a + (1-\lambda)b)(y-x)\right) = f\left[\lambda(x + a(y-x)) + (1-\lambda)(x + b(y-x))\right]$$

donc on obtient le résultat attendu

$$\varphi_{x,y}(\lambda a + (1-\lambda)b) \leqslant \lambda f\left(x + a(y-x)\right) + (1-\lambda) f\left(x + b(y-x)\right) \leqslant \lambda \varphi_{x,y}(a) + (1-\lambda)\varphi_{x,y}(b)$$

$\Leftarrow$ **:** On suppose que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\varphi_{x,y}$ est convexe. Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in [0,1]$. On a

$$f\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) = \varphi_{x,y}(\lambda) = \varphi_{x,y}\left(\lambda \times 1 + (1-\lambda) \times 0\right) \leqslant \lambda \varphi_{x,y}\left(1\right) + (1-\lambda)\varphi_{x,y}\left(0\right) = \lambda f(y) + (1-\lambda) f(x)$$

On a montré que $\boxed{f \text{ est convexe si et seulement si pour tous } x, y \in \mathbb{R}^n,\ \varphi_{x,y} \text{ est convexe}}$

(b) La fonction $\gamma : t \longmapsto x + t(y-x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $\gamma' : t \longmapsto y - x$
or $\varphi_{x,y} = f \circ \gamma$ et f est différentiable. Ainsi d'après le cours, $\varphi_{x,y}$ est dérivable et pour $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\varphi'_{x,y}(t) = \mathrm{d}f\left(\gamma(t)\right) \cdot \gamma'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

donc $\boxed{\text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}^n,\ \varphi_{x,y} \text{ est dérivable et } \forall t \in \mathbb{R},\ \varphi'_{x,y}(t) = \langle \nabla f(x + t(y-x)), y - x \rangle}$

(c) On suppose que f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$.

$\Rightarrow$ **:** On suppose que f est convexe. Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. La fonction $\varphi_{x,y}$ est convexe d'après (a) et dérivable d'après (b) : $\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi'_{x,y}(t) = \langle \nabla f(x + t(y-x)), y - x \rangle$
La courbe d'une fonction convexe étant au-dessus de ses tangentes, on a :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi'_{x,y}(0)t + \varphi_{x,y}(0) \leqslant \varphi_{x,y}(t)$$

or $\varphi_{x,y}(0) = f(x)$, $\varphi_{x,y}(1) = f(y)$ et $\varphi'_{x,y}(0) = \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ et
Pour conclure il suffit d'appliquer l'inégalité à $t = 1$.

$\Leftarrow$ **:** On suppose que pour tous $a, b \in \mathbb{R}^n$, $f(b) \geqslant f(a) + \langle \nabla f(a), b - a \rangle$.
Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. Montrons que $\varphi_{x,y}$ est convexe. Il suffit d'établir que $\varphi'_{x,y}$ est croissante.
Soit $u < v$ dans $\mathbb{R}$. On a en appliquant l'hypothèse à $a = x + v(y-x)$ et $b = x + u(y-x)$

$$\varphi_{x,y}(u) \geqslant \varphi_{x,y}(v) + \langle \nabla f(x + u(y-x)), (u-v)(y-x) \rangle$$

ainsi en utilisant (b), on a

$$\frac{\varphi_{x,y}(v) - \varphi_{x,y}(u)}{v-u} \leqslant \langle \nabla f(x + u(y-x)), y - x \rangle = \varphi'_{x,y}(u)$$

puis avec $a = x + u(y-x)$ et $b = x + v(y-x)$, on trouve

$$\varphi_{x,y}(v) \geqslant \varphi_{x,y}(u) + \langle \nabla f(x + v(y-x)), (v-u)(y-x) \rangle$$

Finalement, on obtient

$$\varphi'_{x,y}(v) \geqslant \frac{\varphi_{x,y}(v) - \varphi_{x,y}(u)}{v-u} \geqslant \varphi'_{x,y}(u)$$

Ce qui permet de conclure.

On a montré que $\boxed{f \text{ est convexe si et seulement si pour tous } x, y \in \mathbb{R}^n,\ f(y) \geqslant f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle}$

(d) Si f est convexe, alors pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, $f(y) \geqslant f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle$ et $f(x) \geqslant f(y) + \langle \nabla f(y), x - y\rangle$
En sommant et par linéarité on obtient $\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle \geqslant 0$
Réciproquement on suppose que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^n$, $\langle \nabla f(b) - \nabla f(a), b - a\rangle \geqslant 0$.
Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. Soit $u < v$ dans $\mathbb{R}$. On a d'après (b) :

$$\varphi'_{x,y}(v) - \varphi'_{x,y}(u) = \langle \nabla f(x + v(y - x)) - \nabla f(x + u(y - x)), y - x\rangle$$

ainsi

$$\varphi'_{x,y}(v) - \varphi'_{x,y}(u) = \frac{\langle \nabla f(x + v(y - x)) - \nabla f(x + u(y - x)), (v - u)(y - x)\rangle}{v - u} \geqslant 0$$

On peut conclure à la convexité de $\varphi_{x,y}$ comme à la question précédente.
d'où $\boxed{f \text{ est convexe si et seulement si pour tous } x, y \in \mathbb{R}^n, \text{ on a } \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle \geqslant 0}$

I.2. On suppose que $\nabla f(x^*) = 0$.
Comme f est convexe et différentiable, alors (b) donne : $\forall y \in \mathbb{R}^n,\ f(y) \geqslant f(x^*) + \langle 0, y - x\rangle = f(x^*)$
$\boxed{\text{si } \nabla f(x^*) = 0 \text{ alors } f \text{ admet un minimum global en } x^*}$

I.3. (a) On remarque que l'application $\mathrm{Q} : x = (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \|x\| = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ donc différentiable et que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $\dfrac{\partial \mathrm{Q}}{\partial x_i} : x \mapsto 2x_i$.
Ainsi $\nabla \mathrm{Q} = 2\mathrm{Id}$.
On aurait pu aussi remarque que $\langle \cdot, \cdot\rangle$ est bilinéaire en dimension finie,
on aurait trouvé que $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \forall h \in \mathbb{R}^n,\ \mathrm{dQ}(x) \cdot h = 2\langle x, h\rangle$.
Ainsi g_α est différentiable et $\boxed{\nabla g_\alpha(x) = \nabla f(x) - \alpha x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^n}$
Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. On a

$$g_\alpha(y) - g_\alpha(x) - \langle \nabla g_\alpha(x), y - x\rangle = f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x\rangle - \frac{\alpha}{2}\left(\|y\|^2 - \|x\|^2 - 2\langle x, y - x\rangle\right)$$

or $\|y\|^2 - \|x\|^2 - 2\langle x, y - x\rangle = \|y\|^2 + \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle = \|y - x\|^2$. Ainsi

$$g_\alpha(y) \geqslant g_\alpha(x) + \langle \nabla g_\alpha(x), y - x\rangle \iff f(y) \geqslant f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\alpha}{2}\|y - x\|^2$$

On conclut à l'aide de 1(c) appliqué à g_α que $\boxed{f \text{ est } \alpha\text{-convexe si et seulement si } g_\alpha \text{ est convexe}}$

(b) Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. On a :

$$\langle \nabla g_\alpha(y) - \nabla g_\alpha(x), y - x\rangle = \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle - \alpha\langle y - x, y - x\rangle = \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle - \alpha\|y - x\|^2$$

Ainsi $\langle \nabla g_\alpha(y) - \nabla g_\alpha(x), y - x\rangle \geqslant 0 \iff \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle \geqslant \alpha\|y - x\|^2$
À l'aide de 1(d) appliqué à g_α et de la question précédente,
on déduit que $\boxed{f \text{ est } \alpha\text{-convexe si et seulement si } \forall x, y \in \mathbb{R}^n,\ \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x\rangle \geqslant \alpha\|y - x\|^2}$

Fonctions coercives

I.4. On suppose K est un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$. Prenons $a \in \mathrm{K}$ et notons $\mathrm{M} = |f(a)|$.
Comme f est coercive, cela nous fournit $\mathrm{R} > 0$, tel que $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\| > \mathrm{R} \Rightarrow f(x) > \mathrm{M}$.
Je note $\mathrm{C} = \mathrm{K} \cap \mathcal{B}(0, \mathrm{R})$ (boule fermée de centre 0 et de rayon R).
Ainsi $\forall x \in \mathrm{K} \setminus \mathrm{C}$, $f(x) > f(a)$ et donc $a \in \mathrm{C}$.

C est fermé par intersection de fermés et C est bornée car $\mathrm{C} \subset \mathcal{B}(0, \mathrm{R})$ ainsi C est compact car $\dim(\mathbb{R}^n) < \infty$.
Le théorème des bornes atteinte avec la fonction continue sur le compact C, nous fournit $x^* \in \mathrm{C}$ tel que $f(x^*) = \min_{x \in \mathrm{C}} f(x)$.
En particulier $f(x^*) \leqslant f(a)$ et donc $\forall x \in \mathrm{K} \setminus \mathrm{C},\ f(x) > f(x^*)$
On a établi $\boxed{\text{l'existence de } x^* \in \mathrm{K} \text{ tel que } f(x^*) = \inf_{x \in \mathrm{K}} f(x)}$

I.5. On suppose K est un convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^n$. Prenons $a \in \mathrm{K}$. Comme f est α-convexe, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) \geqslant f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle + \frac{\alpha}{2}\|x - a\|^2 = \frac{\alpha}{2}\|x\|^2 + \langle x, \alpha a + \nabla f(a) \rangle + f(a) + \frac{\alpha}{2}\|a\|^2 - \langle a, \nabla f(a) \rangle$$

En posant $b = -\|\alpha a + \nabla f(a)\|$ et $c = f(a) + \frac{\alpha}{2}\|a\|^2 - \langle a, \nabla f(a) \rangle$, on obtient avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$f(x) \geqslant \frac{\alpha}{2}\|x\|^2 - b\|x\| + c$$

Comme $\lim_{t \to +\infty} \frac{\alpha}{2}t^2 - bt + c = +\infty$, on en déduit que f est coercive et continue car différentiable, d'après la question précédente, f admet un minimum sur K.

On considère $x, y \in \mathrm{K}$ points en lesquels f admet un minimum sur K.
Comme $\forall t \in [0, 1],\ x + t(y - x) \in \mathrm{K}$ car K convexe.
La fonction $\varphi_{x,y}$ (introduite en 1) admet sur $[0, 1]$ un minimum en 0 et 1.
Ainsi $\forall t \in]0, 1],\ \dfrac{\varphi_{x,y}(t) - \varphi_{x,y}(0)}{t - 0} \geqslant 0$ d'où $\varphi'_{x,y}(0) \geqslant 0$ et de même $\varphi'_{x,y}(1) \leqslant 0$
On rappelle que $\varphi'_{x,y} : t \mapsto \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle$ donc $\langle \nabla f(x), y - x \rangle \geqslant 0$ et $\langle \nabla f(y), y - x \rangle \leqslant 0$
ainsi $\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \leqslant 0$
d'où d'après (b), on a $\alpha\|y - x\|^2 \leqslant 0$ donc $x = y$
d'où $\boxed{f \text{ admet un unique minimum sur K}}$

Projection sur un convexe fermé

I.6. (a) On considère l'application $f : z \longmapsto \|z - x\|^2$.
f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ et $\forall z \in \mathbb{R}^n,\ \nabla f(z) = 2(z - x)$ (calcul analogues aux précédents)
Soit $u, v \in \mathbb{R}^n$. On a

$$f(v) - f(u) - \langle \nabla f(u), v - u \rangle = \|v - x\|^2 - \|u - x\|^2 - \langle 2(u - x), v - u \rangle = \|v\|^2 - \|u\|^2 - 2\langle u, v - u \rangle$$

donc $f(v) - f(u) - \langle \nabla f(u), v - u \rangle = \|v - u\|^2$. Ainsi

$$f(v) = f(u) + \langle \nabla f(u), v - u \rangle + \|v - u\|^2 \geqslant f(u) + \langle \nabla f(u), v - u \rangle + \frac{2}{2}\|v - u\|^2$$

donc f est 2-convexe. On peut donc appliquer 5.
Ainsi f admet un unique minimum sur C.
Ceci nous fournit $a \in \mathrm{C}$, tel que $\forall z \in \mathrm{C} \setminus \{a\},\ \|z - x\|^2 > \|a - x\|^2$
donc $\forall z \in \mathrm{C} \setminus \{a\},\ \|z - x\| > \|a - x\|$
Ainsi $\boxed{\mathrm{P}_c(x) = a \text{ est l'unique point de C tel que } \|\mathrm{P}_\mathrm{C}(x) - x\| = \inf_{y \in \mathrm{C}} \|y - x\|}$

(b) Soit $y \in \mathrm{C}$. On considère la fonction $\psi_y : t \in \mathbb{R} \mapsto \|x - (\overline{x} + t(y - \overline{x}))\|^2$. Soit $t \in \mathbb{R}$. On a :

$$\psi_y(t) = t^2\|y - \overline{x}\|^2 - 2t\langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle + \|x - \overline{x}\|^2$$

Comme C est convexe, alors $\forall t \in [0,1]$, $\overline{x} + t(y - \overline{x}) \in \mathrm{C}$.
Si $\overline{x} = \mathrm{P_C}(x)$, alors $\forall t \in [0,1]$, $\psi_y(t) \geqslant \psi_y(0)$
donc $\psi_y'(0) \geqslant 0$ comme en 5 puis $-2\langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle \geqslant 0$
et donc $\langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle \leqslant 0$.

Réciproquement on suppose que $\forall y \in \mathrm{C},\ \langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle \leqslant 0$.
Prenons $y = \mathrm{P_C}(x)$, alors la fonction ψ_y admet un minimum en 1.
donc $\psi_y'(1) = 0$ d'où $\|y - \overline{x}\|^2 = \langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle \leqslant 0$
donc $y - \overline{x} = 0$ et ainsi $\overline{x} = y = \mathrm{P_C}(x)$.

On a montré que $\boxed{\overline{x} = \mathrm{P_C}(x) \text{ si et seulement si } \forall y \in \mathrm{C},\ \langle x - \overline{x}, y - \overline{x}\rangle \leqslant 0}$

(c) Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$. On a $\mathrm{P_C}(x)$ et $\mathrm{P_C}(y) \in \mathrm{C}$ donc d'après (b), on a

$$\langle x - \mathrm{P_C}(x), \mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\rangle \leqslant 0 \ \text{ et } \langle y - \mathrm{P_C}(y), \mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y)\rangle \leqslant 0$$

ainsi $\langle (x - y) - (\mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y)), \mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y)\rangle \geqslant 0$ d'où en utilisant Cauchy-Schwarz, on a

$$\|\mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\|^2 = \langle \mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y), \mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y)\rangle \leqslant \langle (x-y), \mathrm{P_C}(x) - \mathrm{P_C}(y)\rangle \leqslant \|y - x\| \cdot \|\mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\|$$

Comme $\|\mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\| = 0$ ou $\|\mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\| > 0$, on a bien $\boxed{\|\mathrm{P_C}(y) - \mathrm{P_C}(x)\| \leqslant \|y - x\|}$

Une première condition nécessaire d'optimalité

I.7. On suppose que x est dans l'intérieur de K, ceci nous fournit $r > 0$ tel que $\mathcal{B}(x, r) \subset \mathrm{K}$.
Soit $h \in \mathbb{R}^n$. Pour $k \in \mathbb{N}$, je pose $h_k = h$ et $t_k = \dfrac{r}{(k+1)\|h\|}$ si $h \neq 0$ et $t_k = \dfrac{1}{(k+1)}$ sinon.
On a bien $\lim\limits_{k \longrightarrow +\infty} t_k = 0$ et $\lim\limits_{k \longrightarrow +\infty} h_k = h$ et les $t_k > 0$.
De plus $\forall k \in \mathbb{N},\ x + t_k h_k \in \mathrm{K}$ car $\mathcal{B}(x, r) \subset \mathrm{K}$
$\boxed{\text{D'où } \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x) = \mathbb{R}^n \text{ dans le cas où } x \text{ est dans l'intérieur de K}}$

I.8. On suppose que $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $x^* \in \mathrm{K}$ et admet un minimum local sur K en x^*.
Ceci nous fournit un voisinage de x^* tel que $\forall x \in \mathrm{V} \cap \mathrm{K},\ f(x) \geqslant f(x^*)$.
Soit $h \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*)$. On considère alors (t_k) et (h_k) de la K-admissibilité de h.
Par théorème d'opération sur les limites, on a $\lim\limits_{k \longrightarrow +\infty} x^* + t_k h_k = x^* + 0h = x^*$
Ce qui nous fournit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall k \geqslant p,\ x^* + t_k h_k \in \mathrm{V}$.
Soit $k \geqslant p$. On a alors $f(x^* + t_k h_k) \geqslant f(x^*)$
Or quand $k \longrightarrow +\infty$, on a $t_k h_k \longrightarrow 0$ et donc

$$f(x^* + t_k h_k) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), t_k h_k\rangle + \mathrm{o}(t_k h_k\|)$$

donc

$$f(x^* + t_k h_k) - f(x^*) = t_k(\langle \nabla f(x^*), h_k\rangle + \|h_k\|\varepsilon_k) \ \text{ avec } \varepsilon_k \to 0$$

On remarque que $\langle \nabla f(x^*), h_k\rangle \longrightarrow \langle \nabla f(x^*), h\rangle$ par continuité du produit scalaire
Si $\langle \nabla f(x^*), h\rangle = 0$, on a bien $\langle \nabla f(x^*), h\rangle \geqslant 0$.

Sinon on a $f(x^* + t_k h_k) - f(x^*) \underset{k\to+\infty}{\sim} t_k \langle \nabla f(x^*), h\rangle$ donc $\lim\limits_{k\to+\infty} \dfrac{f(x^* + t_k h_k) - f(x^*)}{t_k} = \langle \nabla f(x^*), h\rangle$

Par prolongement des inégalités, on a $\boxed{\forall h \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*),\ \langle \nabla f(x^*), h\rangle \geqslant 0}$

Dans le cas où x^* est dans l'intérieur de K alors $\forall h \in \mathbb{R}^n,\ \langle \nabla f(x^*), h\rangle \geqslant 0$ selon 7.

En particulier pour $h = -\nabla f(x^*)$, cela donne $\boxed{\nabla f(x^*) = 0 \text{ pour } x^* \text{ est dans l'intérieur de K}}$

On reconnaît la condition nécessaire d'extremum pour une fonction différentiable sur un ouvert.

II - Pénalisation

II.1. La fonction f est différentiable et α-convexe sur $\mathbb{R}^n$. K est non vide.

Pour conclure en utilisant **I.5.**, il suffit de montrer que K est fermé et convexe. On a

$$\mathrm{K} = \bigcap_{i=1}^{p} g_i^{-1}\left(]-\infty, 0]\right)$$

Pour chaque i, g_i est continue sur $\mathbb{R}^n$ (car différentiable), donc $g_i^{-1}\left(]-\infty, 0]\right)$ est fermé en tant que image réciproque d'un fermé par une application continue.

Ainsi K est une partie fermée de $\mathbb{R}^n$ en tant qu'intersection de fermés.

Soit $x, y \in \mathrm{K}$. Soit $\lambda \in [0,1]$. On a

$$\forall i \in [\![1, p]\!],\ g_i(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda g_i(x) + (1-\lambda) g_i(y) \leqslant 0$$

donc $\lambda x + (1-\lambda)y \in \mathrm{K}$. Ainsi K est bien convexe.

Ainsi $\boxed{\text{il existe un unique élément } x^* \in \mathrm{K} \text{ tel que } f(x^*) = \inf\limits_{x\in\mathrm{K}} f(x)}$

II.2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a $\psi(x) \geqslant 0$ et l'équivalence $x \in \mathbb{K} \Longleftrightarrow \psi(x) = 0$.

On en déduit que $\boxed{\lim\limits_{k\to+\infty} f_k(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathrm{K} \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}}$

II.3. Soit $k \in \mathbb{N}$. Comme $\mathbb{R}^n$ est non vide, fermé et convexe, pour conclure en utilisant **I.5.**, il suffit de montrer que f_k est différentiable et α-convexe sur $\mathbb{R}^n$.

étape 1 : *On va montrer que f_k est différentiable.*

On note la fonction $\varphi : t \longmapsto \max(0,t)^2$. de sorte que$\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi(t) = \left(\dfrac{t+|t|}{2}\right)^2 = \dfrac{t^2 + t|t|}{2}$

φ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$: $\forall t > 0,\ \varphi'(t) = 2t$ et $\forall t < 0,\ \varphi'(t) = 0$ de plus $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{t+|t|}{2} = 0$

donc φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc y est différentiable.

Ainsi par composition, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $x \mapsto \max(0, g_i(x))^2$ est différentiable sur $\mathbb{R}^n$.

Par combinaison linéaire, f_k est alors différentiable sur $\mathbb{R}^n$.

étape 2 : *On va montrer le résultat de l'indication.*

On considère $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction convexe croissante.

Soit $\lambda \in [0,1]$ et $x, y \in \mathbb{R}^n$. On a : $g\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leqslant (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$.

Comme h est croissante puis convexe :

$$h \circ g\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leqslant h\left((1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)\right) \leqslant (1-\lambda)h\left(g(x)\right) + \lambda h\left(g(y)\right) \leqslant (1-\lambda)h\circ g(x) + \lambda h \circ g(y)$$

ainsi $h \circ g$ est bien convexe.

étape 3 : Soit $i \in [\![1, n]\!]$. *On va montrer que* $\varphi \circ g_i : x \mapsto \max(0, g_i(x))^2$ *est convexe.*

Il suffit d'établir que φ est convexe et croissante pour utiliser l'étape 2.

Ceci est vrai car d'après l'étape 1 il est clair que φ' est positive et croissante sur $\mathbb{R}$.

étape 4 : *On va montrer que* f_k *est convexe.*

En utilisant I.3.(a), il suffit de montrer que $x \mapsto f_k(x) - \dfrac{\alpha}{2}\|x\|^2$ est convexe.

Toujours d'après I.3.(a), on a $x \mapsto f(x) - \dfrac{\alpha}{2}\|x\|^2$ est convexe.

Par définition des fonctions convexes, on voit qu'une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions convexes est convexe.

On peut conclure que $\boxed{\text{il existe un unique } x_k \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } f_k(x_k) = \inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f_k(x)}$

II.4. Soit $k \in \mathbb{N}$. Comme $x^* \in \mathrm{K}$ et $f \leqslant f_k$ et par définition de x_k, on a $\boxed{f(x_k) \leqslant f_k(x_k) \leqslant f_k(x^*) = f(x^*)}$

II.5. (a) Par l'absurde si $\overline{x} \notin \mathrm{K}$ alors $\psi(\overline{x}) > 0$.

Alors $\lim\limits_{k \to +\infty} \psi\left(x_{\varphi(k)}\right) = \psi(\overline{x})$ car ψ est continue car différentiable sur $\mathbb{R}^n$.

or d'après la question précédente, on a

$$\forall k \in \mathbb{N},\ f\left(x_{\varphi(k)}\right) + k\psi\left(x_{\varphi(k)}\right) = f_{\varphi(k)}\left(x_{\varphi(k)}\right) \leqslant f_k(x^*) = f(x^*)$$

Donc la suite $\left(f_{\varphi(k)}\left(x_{\varphi(k)}\right)\right)_{k \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$ et est majorée

Ceci est absurde. On a montré que $\boxed{\overline{x} \in \mathrm{K}}$

(b) f est continue donc en passant à la limite de l'inégalité de 5, on a $f(\overline{x}) \leqslant f(x^*)$.

Or $\overline{x} \in \mathrm{K}$ selon (a), donc d'après l'unicité de 1, on a bien $\boxed{\overline{x} = x^*}$

II.6. On suppose par l'absurde que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée.

On construit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $\varphi(0) = 0$ et la relation de récurrence :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \varphi(k+1) = \min\{p > \varphi(k) \mid \|x_p\| \geqslant k+1\}$$

φ est bien définie car toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un minimum.

φ est une extractrice car strictement croissante.

De plus $\forall k \in \mathbb{N},\ \|x_{\varphi(k)}\| \geqslant k$ d'où $\lim\limits_{k \to +\infty} \|x_{\varphi(k)}\| = +\infty$.

or f est coercive car f est différentiable et α-convexe en utilisant I.5

donc $\lim\limits_{k \to +\infty} f\left(x_{\varphi(k)}\right) = +\infty$ ce qui est absurde d'après 4.

Ainsi la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée dans l'espace $\mathbb{R}^n$ qui est de dimension finie.

De plus, cette suite admet x^* comme unique valeur d'adhérence.

On en déduit que $\boxed{\text{la suite } (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } x^*}$

II.7. Soit $k \in \mathbb{N}$. On a $f(x_k) + k\psi(x_k) = f_k(x_k) \leqslant f(x^*)$ (majoration vue en II.4) donc

$$0 \leqslant k\psi(x_k) \leqslant f(x^*) - f(x_k)$$

Or par continuité de f et selon la question précédente $f(x^*) - f(x_k) \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0$

Par théorème des gendarmes, on a alors $k\psi(x_k) \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0$

Ainsi $\boxed{\text{la suite } (f_k(x_k))_{k \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } f(x^*)}$

III - Théorème de Karush-Kuhn-Tucker

III.1. (a) Soit $x, y \in \mathrm{C}$ et $\lambda \in [0,1]$.

On peut écrire $x = \sum_{i=1}^{m} \mu_i u_i$ et $y = \sum_{i=1}^{m} \mu'_i u_i$ où les $\mu_i \geqslant 0$ et les $\mu'_i \geqslant 0$.

Alors $\lambda x + (1-\lambda) y \in \mathrm{C}$ car les $\lambda \mu_i + (1-\lambda)\mu'_i \geqslant 0$.

On a montré que $\boxed{\text{C est convexe}}$

(b) On suppose que $(u_1, \ldots, u_m)$ est une famille libre.

Je note $\mathrm{F} = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_m)$ de sorte que $(u_1, \ldots, u_m)$ est une base de F.

Pour $i \in [\![1, m]\!]$, je note γ_i l'application qui à chaque vecteur de F associe sa i-ème coordonnée dans cette base. Comme γ_i est linéaire et que $\dim(\mathrm{F}) < +\infty$, alors γ_i est continue.

De plus $\mathrm{C} \subset \mathrm{F}$ et $\mathrm{C} = \bigcap_{i=1}^{m} \gamma_i^{-1}\left(\mathbb{R}^+\right)$.

or les $\gamma_i^{-1}\left(\mathbb{R}^+\right)$ sont des fermés de F en tant qu'images réciproques de fermés par des applications continues

De plus F est un fermé de E en tant que sous-espace vectoriel de dimension finie

ainsi les $\gamma_i^{-1}\left(\mathbb{R}^+\right)$ sont des fermés de E

ainsi par intersection $\boxed{\text{C est fermé}}$

(c) On considère qu'une famille indexée par l'ensemble vide est libre.

On est obligé d'envisager ce cas, lorsque $\forall i \in \mathrm{I},\ u_i = 0$.

Je note $\Lambda = \{\mathrm{I} \in \mathcal{P}\left([\![1, m]\!]\right) \mid (u_i)_{i \in \mathrm{I}} \text{ est une famille libre}\}$.

On remarque que $\forall \mathrm{I} \in \mathcal{P}\left([\![1, m]\!]\right)$, $\mathrm{C_I} \subset \mathrm{C}$ (quitte à rajouter des 0).

Ainsi $\bigcup_{\mathrm{I} \in \Lambda} \mathrm{C_I} \subset \mathrm{C}$.

Pour montrer l'inclusion réciproque, on va montrer par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, la propriété :

$$\mathcal{H}_k : \forall (\mu_1, \ldots, \mu_m) \in \left(\mathbb{R}^+\right)^m,\ |\{i \in [\![1, m]\!] \mid \mu_i > 0\}| = k \Longrightarrow \sum_{i=1}^{m} \mu_i u_i \in \bigcup_{\mathrm{I} \in \Lambda} \mathrm{C_I}$$

Initialisation : La propriété $\mathcal{H}_0$ est vraie car $\sum_{i=1}^{m} 0 u_i = 0 \in \mathrm{C}_\emptyset = \{0\}$

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p \in [\![0, k]\!]$, $\mathcal{H}_p$ est vraie. Montrons $\mathcal{H}_{k+1}$.

Soit $(\mu_1, \ldots, \mu_m) \in (\mathbb{R}^+)^m$ tel que $|\{i \in [\![1, m]\!] \mid \mu_i > 0\}| = k+1$.

On note $x = \sum_{i=1}^{m} \mu_i u_i$ et $\mathrm{J} = \{i \in [\![1, m]\!] \mid \mu_i > 0\}$ de sorte que : $x = \sum_{i \in \mathrm{J}} \mu_i u_i$.

Il s'agit d'établir que : $x \in \bigcup_{\mathrm{I} \in \Lambda} \mathrm{C_I}$.

<u>Premier cas :</u> Si la famille $(u_i)_{i \in \mathrm{J}}$ est libre, alors $x = \sum_{i=1}^{m} \mu_i u_i \in \mathrm{C_J} \subset \bigcup_{\mathrm{I} \in \Lambda} \mathrm{C_I}$.

<u>Deuxième cas :</u> Si la famille $(u_i)_{i \in \mathrm{J}}$ est liée, il existe alors une famille de réels non tous nuls $(\lambda_i)_{i \in \mathrm{J}}$ tel que $\sum_{i \in \mathrm{J}} \lambda_i u_i = 0$.

Je note $\mathrm{S}^+ = \{i \in \mathrm{J} \mid \lambda_i > 0\}$ et $\mathrm{S}^+ = \{i \in \mathrm{J} \mid \lambda_i < 0\}$

de sorte que $\sum_{i \in \mathrm{S}^+} \lambda_i u_i = \sum_{i \in \mathrm{S}^-} (-\lambda_i)\, u_i$ et $\mathrm{S}^+ \cup \mathrm{S}^- \neq \emptyset$.

Si $\mathrm{S}^+ \neq \emptyset$, je prends $j_0 \in \mathrm{S}^+$ tel que $\dfrac{\mu_{j_0}}{\lambda_{j_0}} = \min\left\{\dfrac{\mu_j}{\lambda_j} \mid j \in \mathrm{S}^+\right\}$.

Je pose $\mathrm{S}' = \mathrm{S}^+ \setminus \{j_0\}$. Alors

$$x = \sum_{i\in \mathrm{S}'} \underbrace{\left(\mu_i - \frac{\mu_{j_0}}{\lambda_{j_0}}\lambda_i\right)}_{\geqslant 0} u_i + \sum_{i\in \mathrm{S}^-} \underbrace{\left(\mu_i - \frac{\mu_{j_0}}{\lambda_{j_0}}\lambda_i\right)}_{\geqslant 0} u_i$$

On peut alors utiliser l'hypothèse de récurrence pour conclure que $x \in \bigcup_{\mathrm{I}\in\Lambda} \mathrm{C_I}$.

Si $\mathrm{S}^+ = \emptyset$, alors on se ramène au cas précédent en remarquant $\sum_{i\in \mathrm{J}} (-\lambda_i)\, u_i = 0$.

Conclusion : On a montré que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{H}_k$ est vraie.

En particulier pour tout $k \in [\![0, m]\!]$, la propriété $\mathcal{H}_k$ est vraie et ainsi $\bigcup_{\mathrm{I}\in\Lambda} \mathrm{C_I} \supset \mathrm{C}$.

On a bien $\boxed{\mathrm{C} = \bigcup_{\mathrm{I}\in\Lambda} \mathrm{C_I}}$ or d'après (b), pour tout $\mathrm{I} \in \Lambda$, $\mathrm{C_I}$ est fermé.

On en déduit que $\boxed{\mathrm{C} \text{ est fermé}}$ en tant que réunion finie de fermés en effet $|\Lambda| \leqslant 2^m < +\infty$.

III.2. (a) Comme C est convexe, fermé et non vide car $0 \in \mathrm{C}$, on peut appliquer I.6.(b) :

$$\forall y \in \mathrm{C},\ \langle v - \mathrm{P_C}(v), y - \mathrm{P_C}(v)\rangle \leqslant 0$$

On remarque $\forall \lambda \geqslant 0,\ \forall x \in \mathrm{C},\ \lambda x \in \mathrm{C}$

d'où $0 \in \mathrm{C}$ et $2\mathrm{P_C}(v) \in \mathrm{C}$ ce qui permet de conclure $\boxed{\langle \mathrm{P_C}(v), \mathrm{P_C}(v) - v\rangle = 0}$

(b) À l'aide de I.6(b), et de l'égalité précédente, on a :

$$\forall y \in \mathrm{C},\ \langle w, y\rangle \geqslant 0$$

Or pour tout $i \in [\![1, m]\!]$, on a $u_i \in \mathrm{C}$ et donc $\boxed{\langle u_i, w\rangle \geqslant 0}$

De plus, à l'aide de (a) :

$$\langle v, w\rangle = \langle v, \mathrm{P}_c(v)\rangle - \langle v, v\rangle = \langle \mathrm{P}_c(v), \mathrm{P}_c(v)\rangle - \langle v, v\rangle = \|\mathrm{P_C}(v)\|^2 - \|v\|^2$$

Comme $0 \in \mathrm{C}$, on a $\mathrm{P_C}(0) = 0$ et ainsi d'après I.6.(c), $\|\mathrm{P_C}(v)\| \leqslant \|v\|$.

Par l'absurde si on avait $\|\mathrm{P_C}(v)\| = \|v\|$ alors d'après (a) :

$$\langle \mathrm{P_C}(v), v\rangle = \langle \mathrm{P_C}(v), \mathrm{P_C}(v)\rangle = \langle v, v\rangle$$

donc $\langle \mathrm{P_C}(v), v\rangle = \|\mathrm{P_C}(v)\| \cdot \|v\|$ ainsi selon le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a l'existence de $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\mathrm{P_C}(v) = \lambda v$ car $v \neq 0$.

On trouve ensuite $\lambda = 1$ donc $v = \mathrm{P_C}(v) \in \mathrm{C}$ ce qui est absurde.

Ainsi $\|\mathrm{P_C}(v)\| < \|v\|$ et $\boxed{\langle v, w\rangle < 0}$

III.3. On vient de montrer que le (i) ou le (ii) du lemme 1 est toujours vrai.

Par l'absurde si il existait $v \in \mathrm{C}$ et $w \in \mathbb{R}^n$ tels que $\langle v, w\rangle < 0$ et $\forall i \in [\![1, m]\!],\ \langle u_i, w\rangle \geqslant 0$.

On pourrait écrire $v = \sum_{i=1}^{m} \mu_i u_i$ où $\forall i \in [\![1, m]\!]\ \mu_i \geqslant 0$. Ainsi

$$0 > \langle v, w\rangle = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \langle v, u_i\rangle \geqslant 0$$

Ce qui est absurde. $\boxed{\text{Ceci prouve le lemme 1}}$

Condition nécessaire d'optimalité

III.4. Soit $x \in \mathrm{K}$, $h \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x)$ et $i \in \mathrm{I}_x$. On a

$$\forall y \in \mathrm{K},\ -g_i(x) = 0 \leqslant -g_i(y)$$

Donc $-g_i$ différentiable sur $\mathbb{R}^n$ présente un minimum local sur K en x.
Ainsi $\langle \nabla(-g_i)(x), h\rangle \geqslant 0$ en utilisant I.8.
Ainsi on a montré $\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x) \subset \{h \in \mathbb{R}^n,\ \forall i \in \mathrm{I}_x,\ \langle \nabla g_i(x), h\rangle \leqslant 0\}}$

III.5. Soit $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $\forall i \in \mathrm{I}_{x^*},\ \langle \nabla g_i(x^*), h\rangle \leqslant 0$. Selon la question précédente, il suffit d'établir que $h \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*)$.
L'hypothèse (H) nous fournit $v \in \mathbb{R}^n$ tel que $\forall i \in \mathrm{I}_{x^*},\ \langle \nabla g_i(x^*), v\rangle < 0$.
Soit $\alpha > 0$. On a $\forall i \in \mathrm{I}_{x^*},\ \langle \nabla g_i(x^*), \alpha v\rangle < 0$
Soit $i \in [\![1, p]\!]$. On a pose

$$\mathrm{G}_{i,\alpha} : t \mapsto g_i(x^* + t\alpha v + th)$$

Si $i \notin \mathrm{I}_{x^*}$, la continuité de $\mathrm{G}_{i,\alpha}$ et $\mathrm{G}_{i,\alpha}(0) = g_i(0) < 0$, nous fournit
$\rho_i(\alpha) > 0$ tel que $\forall t \in [0, \rho_i(\alpha)],\ g_i(x^* + t\alpha v + th) < 0$

Si $i \in \mathrm{I}_{x^*}$ alors $\mathrm{G}_{i,\alpha}$ s'annule en 0 et a comme dérivée $\mathrm{G}'_{i,\alpha} : t \mapsto \langle \nabla g_i(x^* + t\alpha v + th), \alpha v + h\rangle$.
donc $\mathrm{G}'_{i,\alpha}(0) = \alpha\langle \nabla g_i(x^*), v\rangle + \langle \nabla g_i(x^*), h\rangle < 0$ et $\mathrm{G}_{i,\alpha}(0) = g_i(0) = 0$
ce qui nous fournit $\rho_i > 0$ tel que $\forall t \in]0, \rho_i(\alpha)],\ g_i(x^* + t(v + h)) < 0$

On pose $r(\alpha) = \min\{\rho_i(\alpha) \mid i \in [\![1, p]\!]\}$ de sorte que

$$r(\alpha) > 0 \ \text{ et } \ \forall i \in [\![1, p]\!],\ \forall t \in]0, r(\alpha)],\ g_i(x^* + t\alpha v + th) < 0$$

Pour $k \in \mathbb{N}$, je pose $\alpha_k = \dfrac{1}{k+1}$ et $t_k = \min\left(\dfrac{1}{k+1}, r(\alpha_k)\right)$ et $h_k = h + \alpha_k v$.
Ainsi $\forall k \in \mathbb{N}$, $0 < t_k \leqslant r(\alpha_k)$ et $\lim\limits_{k\to+\infty} t_k = 0$ et $\lim\limits_{k\to+\infty} h_k = h$
De plus, $\forall k \in \mathbb{N},\ x^* + t_k h_k \in \mathrm{K}$ car $\forall i \in [\![1, p]\!],\ g_i(x^* + t_k h_k) = g_i(x^* + t_k h + \alpha_k t_k v) < 0$
Ainsi $h \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*)$
On a bien montré que $\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*) = \{h \in \mathbb{R}^n,\ \forall i \in \mathrm{I}_{x^*},\ \langle \nabla g_i(x^*), h\rangle \leqslant 0\}}$

III.6. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On considère une famille libre $(u_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$.
La méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt appliquée à la famille libre $(u_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ nous fournit une famille orthonormale $(\varepsilon_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$ tel que

$$\begin{cases} \langle u_i, \varepsilon_i\rangle > 0 \\ \forall k \in [\![1, p]\!],\ \mathrm{Vect}\left((\varepsilon_i)_{1\leqslant i\leqslant k}\right) = \mathrm{Vect}\left((u_i)_{1\leqslant i\leqslant k}\right) \end{cases}$$

On va montrer par récurrence sur $k \in [\![1, p]\!]$ l'existence de $v \in \mathrm{Vect}\left((u_i)_{1\leqslant i\leqslant k}\right)$ tel que $\forall i \in [\![1, k]\!],\ \langle u_i, v\rangle < 0$.
Pour l'initialisation, je prend $v_1 = -u_1$.
Pour l'hérédité : soit $k \in [\![1, p-1]\!]$ tel qu'il existe $v \in \mathrm{Vect}\left((u_i)_{1\leqslant i\leqslant k}\right)$ tel que $\forall i \in [\![1, k]\!],\ \langle u_i, v\rangle < 0$.
Je pose $w(t) = v + t\varepsilon_{k+1}$.
On a $\forall i \in [\![1, k]\!],\ \langle u_i, w(t)\rangle = \langle u_i, v\rangle < 0$ et $\langle u_{k+1}, w(t)\rangle = \langle u_{k+1}, v\rangle + t\langle u_{k+1}, \varepsilon_{k+1}\rangle$
En prenant $t = -\dfrac{1 + \langle u_{k+1}, v\rangle}{\langle u_{k+1}, \varepsilon_{k+1}\rangle}$, on a bien $\forall i \in [\![1, k+1]\!],\ \langle u_i, w(t)\rangle < 0$
On donc montré que la propriété était vraie pour tout $k \in [\![1, p]\!]$.
L'hypothèse (H) est vérifiée si $x^* \in \mathrm{K}$ est tel que $(\nabla g_i(x^*))_{i\in \mathrm{I}_{x^*}}$ forme une famille libre et $\mathrm{I}_{x^*} \neq \emptyset$.
Dans le cas où $\mathrm{I}_{x^*} = \emptyset$, n'importe quel vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ convient.
ainsi $\boxed{\text{si } x^* \in \mathrm{K} \text{ est tel que } (\nabla g_i(x^*))_{i\in \mathrm{I}_{x^*}} \text{ forme une famille libre, alors l'hypothèse (H) est vérifiée}}$

III.7. Soit $w \in \mathbb{R}^n$ tel que $\forall i \in \mathrm{I}_{x^*}, \langle \nabla g_i(x^*), w\rangle \leqslant 0$.
On a $w \in \mathcal{A}_{\mathrm{K}}(x^*)$ d'après 5.
Ainsi d'après I.8, on a $\langle \nabla f(x^*), w\rangle \geqslant 0$
On vient de montrer

$$\forall w \in \mathbb{R}^n,\ (\forall i \in \mathrm{I}_{x^*}, \langle \nabla g_i(x^*), w\rangle \leqslant 0) \Longrightarrow \langle \nabla f(x^*), w\rangle \geqslant 0$$

Ce qui est la <u>négation</u> de : $\exists w \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla f(x^*), w\rangle < 0$ et $\forall i \in \mathrm{I}_{x^*}, \langle -\nabla g_i(x^*), w\rangle \geqslant 0$
Le lemme 1, nous fournit une famille de réelle positifs $(\mu_i^*)_{i\in \mathrm{I}_{x^*}}$, telle que $\nabla f(x^*) = \sum\limits_{i\in \mathrm{I}_{x^*}} \mu_i^* \left(-\nabla g_i(x^*)\right)$
En complétant la famille par des zéros,
on trouve des réels positifs $\mu_1^*, \ldots, \mu_p^*$ tels que : $\boxed{(1)\ \begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* \nabla g_i(x^*) = 0, \\ \forall i \in [\![1,p]\!],\ \mu_i^* g_i(x^*) = 0 \end{cases}}$

III.8. On remarque que $\nabla\left(f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i\right)(x^*) = 0$ et que $f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i$ est convexe.
Alors selon I.2, $f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i$ admet en x^* un minimum global sur $\mathbb{R}^n$.
Soit $x \in \mathrm{K}$. On a : $f(x^*) = f(x^*) + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i(x^*) \leqslant f(x) + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i(x) \leqslant f(x)$
Ainsi $\boxed{f \text{ admet en } x^* \text{ un minimum global sur K}}$

IV - Étude du problème dual

IV.1. Pour une partie non vide est non majorée (respectivement non minorée), la borne supérieure (respectivement inférieure) est $+\infty$ (respectivement $-\infty$).
Soit $x \in \mathbb{R}^n \setminus \mathrm{K}$. Il existe $i_0 \in [\![1,p]\!]$ tel que $g_{i_0}(x) > 0$.
Dans ce cas $\sup\limits_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu) = +\infty$.
Par conséquent

$$\inf_{x\in\mathbb{R}^n} \sup_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu) = \inf_{x\in\mathrm{K}} \sup_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu)$$

Soit $x \in \mathrm{K}$ et $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_p) \in\ \mathbb{R}_+^p$.
On a : $\mathcal{L}(x,\mu) = f(x) + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i g_i(x) \leqslant f(x) = f(x) + \sum\limits_{i=1}^{p} 0 g_i(x)$ donc

$$\forall x \in \mathrm{K},\ \sup_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu) = f(x)$$

Ainsi $\boxed{\inf\limits_{x\in\mathbb{R}^n} \sup\limits_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu) = \inf\limits_{x\in\mathrm{K}} \sup\limits_{\mu\in\ \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x,\mu) = \inf\limits_{x\in\mathrm{K}} f(x)}$

IV.2. Soit $\mu \in \mathbb{R}_+^p$. En faisant comme en **II.3.**, on montre que la fonction $x \mapsto \mathcal{L}(x,\mu)$ est α-convexe.
Ainsi en appliquant **II.1.** à cette fonction différentiable et α-convexe sur $\mathbb{R}^n$ (défini avec 0 contrainte),

$$\boxed{\text{il existe un unique } x_\mu \in \mathbb{R}^n \text{ vérifiant } \mathcal{L}(x_\mu,\mu) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x,\mu)}$$

IV.3. (a) Il s'agit d'établir que : (i) $\overline{x} \in \mathrm{K}$ et (ii) $f(\overline{x}) = \inf\limits_{x \in \mathrm{K}} f(x)$.

Pour (i) : on procède par l'absurde en supposant que $\overline{x} \notin \mathrm{K}$.
Alors $\sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(\overline{x}, \mu) = +\infty$ comme en **IV.1.**) donc

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \overline{\mu}) = \mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\mu}) = \sup_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(\overline{x}, \mu) = +\infty$$

Absurde car une borne inférieure généralisée est dans $[-\infty, +\infty[$.

Soit $y \in \mathrm{K}$ pour établir (ii), il suffit de montrer que $f(\overline{x}) \leqslant f(y)$.
Comme les $g_i(\overline{x}) \leqslant 0$ car $\overline{x} \in \mathrm{K}$, on a

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \overline{\mu}) = \mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\mu}) = \sup_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(\overline{x}, \mu) = \sup_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \left(f(\overline{x}) + \sum_{i=1}^{p} \mu_i g_i(\overline{x}) \right) = f(\overline{x})$$

Ainsi $f(\overline{x}) \leqslant \mathcal{L}(y, \overline{\mu}) = f(y) + \sum\limits_{i=1}^{p} \overline{\mu_i} g_i(y) \leqslant f(y)$ car $y \in \mathrm{K} \subset \mathbb{R}^n$

donc $\boxed{\overline{x} \text{ est bien solution de (P)}}$

(b) Soit $\mu \in \mathbb{R}_+^p$. Il suffit de montrer que $\mathrm{G}(\mu) \leqslant \mathrm{G}(\overline{\mu})$. On a

$$\mathrm{G}(\overline{\mu}) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \overline{\mu}) = \mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\mu}) = \sup_{\mu' \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(\overline{x}, \mu')$$

donc

$$\mathrm{G}(\mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \mu) \leqslant \mathcal{L}(\overline{x}, \mu) \leqslant \mathrm{G}(\overline{\mu})$$

donc $\boxed{\overline{\mu} \text{ est bien solution de (Q)}}$

(c) D'après (a) puis **IV.1.**, on a $\overline{x} \in \mathrm{K}$ et

$$\mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\mu}) = f(\overline{x}) = \inf_{x \in \mathrm{K}} f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x, \mu)$$

et d'après (b), on a : $\mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\mu}) = \mathrm{G}(\overline{\mu}) = \sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \mu)$

donc on a bien $\boxed{\inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} \sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x, \mu) = \sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \mu)}$

IV.4. On remarque que $\nabla \left(f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i \right)(x^*) = 0$ et que $f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i$ est $\alpha-$convexe (analogue à l'étape 4 de II.3).
Par définition des fonctions $\alpha-$convexes, on a donc

$$\forall y \in \mathbb{R}^n, \ \left(f + \sum_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i \right)(y) \geqslant \left(f + \sum_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i \right)(x^*) + \langle 0, y - x^* \rangle + \frac{\alpha}{2} \|y - x^*\|^2 \geqslant \left(f + \sum_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i \right)(x^*)$$

avec égalité si et seulement si $y = x^*$.

Donc $f + \sum\limits_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i$ admet un unique minimum global en x^* d'où $\mathcal{L}(x^*, \mu^*) = \inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \mu^*)$ (1)

Soit $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_p) \in \mathbb{R}_+^p$. On a selon la deuxième condition de III.8 :

$$\mathcal{L}(x^*, \mu^*) - \mathcal{L}(x^*, \mu) = \sum_{i=1}^{p} \mu_i^* g_i(x^*) - \sum_{i=1}^{p} \mu_i g_i(x^*) = -\sum_{i=1}^{p} \mu_i g_i(x^*) \geqslant 0$$

car les $g_i(x^*) \leqslant 0$ car $x^* \in \mathrm{K}$.
D'où $\mathcal{L}(x^*, \mu^*) = \sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(x^*, \mu)$ (2)

Avec (1) et (2), on déduit que (x^*, μ^*) est un point selle de $\mathcal{L}$ d'où $\boxed{\mu^* \text{ est solution de (Q)}}$ d'après IV.3.(b)

IV.5. Pour soulager l'écriture je note l'application $\mathrm{X} : \mu \mapsto x_\mu = \mathrm{X}(\mu)$ qui est bien définie sur $\mathbb{R}_+^p$ et continue par hypothèse.

(a) Soit $t \in [0, 1]$.
Pour $i \in [\![1, p]\!]$, les formes linéaires de $\mathbb{R}^p$: $(u_1, \dots, u_p) \mapsto -u_i$ sont convexes.
Ainsi comme en II.1, $\mathbb{R}_+^p$ est une partie convexe de $\mathbb{R}^p$.
De plus $\mu + t\xi = t(\mu + \xi) + (1 - t)\mu$ or $\mu + \xi \in \mathbb{R}_+^p$ et $\mu \in \mathbb{R}_+^p$ donc $\boxed{\mu + t\xi \in \mathbb{R}_+^p}$
On suppose désormais que $t \in]0, 1]$. On a alors l'existence des membres et l'égalité

$$\frac{\mathrm{G}(\mu + t\xi) - \mathrm{G}(\mu)}{t} = \frac{\mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu + t\xi\right) - \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu\right) + \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu\right) - \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu), \mu\right)}{t}$$

or par continuités de g, X et du produit scalaire :

$$\frac{\mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu + t\xi\right) - \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu\right)}{t} = \langle g\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi)\right), \xi\rangle \xrightarrow[t \to 0]{} \langle g\left(\mathrm{X}(\mu)\right), \xi\rangle = \langle g(x_\mu), \xi\rangle$$

et $\dfrac{\mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu\right) - \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu), \mu\right)}{t} \geqslant 0$ par définition de $\mathrm{X}(\mu)$
D'un autre côté :

$$\frac{\mathrm{G}(\mu + t\xi) - \mathrm{G}(\mu)}{t} = \frac{\mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi), \mu + t\xi\right) - \mathcal{L}\left(\mathrm{X}(\mu), \mu + t\xi\right)}{t} + \langle g(x_\mu), \xi\rangle$$

d'où par définition de $\mathrm{X}(\mu + t\xi)$, on a

$$\langle g(x_\mu), \xi\rangle \leqslant \frac{\mathrm{G}(\mu + t\xi) - \mathrm{G}(\mu)}{t} \leqslant \langle g\left(\mathrm{X}(\mu + t\xi)\right), \xi\rangle$$

par théorème des gendarmes, on obtient bien : $\boxed{\lim\limits_{t \to 0^+} \dfrac{\mathrm{G}(\mu + t\xi) - \mathrm{G}(\mu)}{t} = \langle g(x_\mu), \xi\rangle}$

Soit $\mu \in \mathbb{R}_+^p$. Je pose maintenant $\xi = \mu - \overline{\mu}$ de sorte que $\overline{\mu} \in \mathbb{R}_+^p$ et $\overline{\mu} + \xi = \mu \in \mathbb{R}_+^p$.
D'après ce que l'on vient de voir la fonction $\mathrm{H} : t \mapsto \mathrm{G}(\overline{\mu} + t\xi)$ est dérivable en 0
et $\mathrm{H}'(0) = \langle g(x_{\overline{\mu}}), \xi\rangle = \langle g(x_{\overline{\mu}}), \mu - \overline{\mu}\rangle$
or cette fonction admet un maximum en 0 car $\overline{\mu} \in \mathbb{R}_+^p$ est solution de (Q)
d'où $\mathrm{H}'(0) \leqslant 0$ c'est à dire $\boxed{\langle g(x_{\overline{\mu}}), \mu - \overline{\mu}\rangle \leqslant 0}$

(b) Par définition de $x_{\overline{\mu}}$, on a $\mathcal{L}\left(x_{\overline{\mu}}, \overline{\mu}\right) = \inf\limits_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \overline{\mu})$ (i)
Soit $\mu \in \mathbb{R}_+^p$. D'après (a), on a

$$\mathcal{L}\left(x_{\overline{\mu}}, \overline{\mu}\right) - \mathcal{L}\left(x_{\overline{\mu}}, \mu\right) = \langle g(x_{\overline{\mu}}), \overline{\mu} - \mu\rangle \geqslant 0$$

Ainsi $\mathcal{L}\left(x_{\overline{\mu}}, \overline{\mu}\right) = \sup\limits_{\mu \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}\left(x_{\overline{\mu}}, \mu\right)$ (ii)
Avec (i) et (ii), $(x_{\overline{\mu}}, \overline{\mu})$ est un point selle pour $\mathcal{L}$.
Alors selon IV.3.(a) $\boxed{x_{\overline{\mu}} \text{ est solution de (P)}}$

IV.6. (a) On remarque au préalable que comme $g : x \mapsto \mathrm{A}x + b$ alors pour $i \in [\![1, p]\!]$, on a

$$g_i : x \longmapsto \langle \mathrm{L}_i^\top, x\rangle + b_i$$

où L_i est la i-ème ligne de A et b_i est le i-ème coefficient de b.
Ainsi les g_i sont bien convexes et différentiables sur $\mathbb{R}^n$ et $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \nabla g_i(x) = \mathrm{L}_i^\top$.
De plus, comme A est de rang p, il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $g(x) = 0$ et donc K est non vide
on peut donc utiliser les résultats de la partie IV.

Soit $\mu \in \mathbb{R}_+^p$. On pose alors $\mathrm{H} : x \in \mathbb{R}^n \mapsto \mathcal{L}(x, \mu)$. Ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \mathrm{H}(x) = f(x) + \langle g(x), \mu\rangle = f(x) + \langle \mathrm{A}x, \mu\rangle + \langle b, \mu\rangle = f(x) + \langle x, \mathrm{A}^\top \mu\rangle + \langle b, \mu\rangle$$

Ainsi H est différentiable et $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \nabla \mathrm{H}(x) = \nabla f(x) + \mathrm{A}^\top \mu$
Or la fonction H admet un minimum sur l'ouvert $\mathbb{R}^n$ en x_μ donc $\nabla \mathrm{H}(x_\mu) = 0$
ainsi $\boxed{\text{pour tout } \mu \in \mathbb{R}_+^p,\ \nabla f(x_\mu) = -\mathrm{A}^\top \mu}$
Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^p$. On a alors selon I.3.(b) :

$$\langle \mathrm{A}^\top \lambda - \mathrm{A}^\top \mu, x_\lambda - x_\mu\rangle = \langle \nabla f(x_\lambda) - \nabla f(x_\mu), x_\lambda - x_\mu\rangle \geqslant \alpha \|x_\lambda - x_\mu\|^2$$

À l'aide de Cauchy-Schwarz et comme c'est valable si $x_\lambda = x_\mu$, on a alors

$$\|x_\lambda - x_\mu\| \leqslant \frac{\|\mathrm{A}^\top (\lambda - \mu)\|}{\alpha}$$

Comme l'application $x \mapsto \mathrm{A}x$ est continue, on en conclut que $\lim\limits_{\lambda \to \mu} x_\lambda = x_\mu$

Ainsi $\boxed{\text{la fonction } \mu \mapsto x_\mu \text{ est continue sur } \mathbb{R}_+^p}$

(b) Les hypothèses de II.1 étant vérifiées : $\boxed{\text{(P) admet une unique solution } x^* \in \mathrm{K}}$ De plus

$$\mathrm{rg}\left((\nabla g_i(x^*))_{1 \leqslant i \leqslant p}\right) = \mathrm{rg}\left(\left(\mathrm{L}_i^\top\right)_{1 \leqslant i \leqslant p}\right) = \mathrm{rg}(\mathrm{A}) = p$$

donc la famille $(\nabla g_i(x^*))_{1 \leqslant i \leqslant p}$ est libre et il en est donc de même pour $(\nabla g_i(x^*))_{i \in \mathrm{I}_{x^*}}$
Ainsi l'hypothèse (H) est vérifiée selon III.6
On peut donc choisir $\mu^* \in \mathbb{R}_+^p$ vérifiant les conditions de III.7 selon III.7
Selon IV.4, μ^* est alors solution de (Q) et on a aussi $x_{\mu^*} = x^*$.
Alors selon (a), on a : $-\nabla f(x^*) = \mathrm{A}^\top \mu^*$
L'application de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ $\tau : \mu \mapsto \mathrm{A}^\top \mu$ est de rang $\mathrm{rg}\left(\mathrm{A}^\top\right) = \mathrm{rg}(\mathrm{A}) = p$
Selon le théorème du rang, on a donc $\dim(\mathrm{Ker}\,\tau) = p - p = 0$
τ est donc injective ainsi μ^* est l'unique antécédent de $-\nabla f(x^*)$ par τ (l'unicité de x^* a été établie)
d'où $\boxed{\text{(Q) admet une unique solution } \mu^* \in \mathbb{R}_+^p}$

(c) En utilisant I.6.(b), il suffit d'établir que

$$\forall y \in \mathbb{R}_+^p,\ \langle \mu^* + \rho g(x_{\mu^*}) - \mu^*, y - \mu^*\rangle \leqslant 0$$

comme $\rho > 0$ ceci équivaut à

$$\forall \mu \in \mathbb{R}_+^p,\ \langle g(x_{\mu^*}), \mu - \mu^*\rangle \leqslant 0$$

or cette propriété est vraie selon IV.5.(a) ainsi $\boxed{\mu^* = \mathrm{P}_{\mathbb{R}_+^p}(\mu^* + \rho g(x_{\mu^*}))}$

Remarques : La norme de $\mathrm{A}x$ *est à prendre dans* $\mathbb{R}^p$ *pour* $x \in \mathbb{R}^n$.
Par ailleurs comme en dimension finie une application linéaire est continue, il existe $\mathrm{K} > 0$ *tel que*

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \|\mathrm{A}x\| \leqslant \mathrm{K}\|x\|$$

En prenant $\rho = \dfrac{\alpha}{\mathrm{K}^2}$, *on a bien* $\|\mathrm{A}x\| \leqslant \sqrt{\frac{\alpha}{\rho}}\|x\|$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}^n$.

(d) On a (avec la question précédente)

$$\|\mu^{k+1} - \mu^*\| = \|\mathrm{P}_{\mathbb{R}_+^p}(\mu^k + \rho g(x_{\mu^k})) - \mathrm{P}_{\mathbb{R}_+^p}(\mu^* + \rho g(x_{\mu^*}))\|$$

Comme $\mathrm{P}_{\mathbb{R}_+^p}$ est 1 lipschitzienne,

$$\|\mu^{k+1} - \mu^*\| \leqslant \|\mu^k + \rho g(x_{\mu^k}) - \mu^* - \rho g(x_{\mu^*})\| = \|\mu^k - \mu^* + \rho \mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\|$$

On élève au carré et on développe la carré scalaire du membre de droite

$$\|\mu^{k+1} - \mu^*\|^2 \leqslant \|\mu^k - \mu^*\|^2 + \rho^2\|\mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\|^2 + 2\rho\langle \mu^k - \mu^*, \mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\rangle$$

L'hypothèse sur A donne enfin

$$\|\mu^{k+1} - \mu^*\|^2 \leqslant \|\mu^k - \mu^*\|^2 + \alpha\rho\|x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\|^2 + 2\rho\langle \mu^k - \mu^*, \mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\rangle$$

Comme $\langle \mathrm{A}x, y\rangle = \langle x, \mathrm{A}^\top y\rangle$, on a aussi, en utilisant (b) :

$$2\rho\langle \mu^k - \mu^*, \mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\rangle = 2\rho\langle \mathrm{A}^\top(\mu^k - \mu^*), x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\rangle = -2\rho\langle \nabla f(x_{\mu^k}) - \nabla f(x_{\mu^*}), x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\rangle$$

et comme f est α-convexe en utilisant I.3.(b),

$$2\rho\langle \mu^k - \mu^*, \mathrm{A}(x_{\mu^k} - x_{\mu^*})\rangle \leqslant -2\rho\alpha\|x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\|^2$$

On peut ainsi conclure que

$$\|\mu^{k+1} - \mu^*\|^2 \leqslant \|\mu^k - \mu^*\|^2 - \alpha\rho\|x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\|^2$$

La suite $(\|\mu^k - \mu^*\|^2)_{k\geqslant 0}$ est décroissante et minorée par 0 et converge donc vers une limite $\ell \geqslant 0$. De plus,

$$\|x_{\mu^k} - x_{\mu^*}\|^2 \leqslant \frac{1}{\alpha\rho}(\|\mu^k - \mu^*\|^2 - \|\mu^{k+1} - \mu^*\|^2)$$

et $\boxed{(x_{\mu^k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } x_{\mu^*} = x^*}$ d'après le théorème des gendarmes.

(e) D'après (d), on remarque que la suite $\left(\mu^k\right)_k$ est bornée.
Comme $\mathbb{R}^p$ est de dimension finie, on considère $\overline{\mu}$ une valeur d'adhérence et il suffit d'établir que $\overline{\mu} = \mu^*$.
On considère alors une extractrice φ telle que $\left(\mu^{\varphi(k)}\right)_k$ converge vers $\overline{\mu}$.
Comme $\mu \mapsto x_\mu$ est continue, la suite $\left(x_{\mu^{\varphi(k)}}\right)_k$ converge vers $x_{\overline{\mu}}$.
Or d'après (d) la suite extraite $\left(x_{\mu^{\varphi(k)}}\right)_k$ converge vers x^*.
Donc par unicité de la limite $x_{\mu^*} = x^* = x_{\overline{\mu}}$
Ainsi à l'aide de (a),

$$\tau(\mu^*) = \mathrm{A}^\top\mu^* = -\nabla f(x^*) = \mathrm{A}^\top\overline{\mu} = \tau(\overline{\mu})$$

τ a été introduit en (b) et est injective d'où $\overline{\mu} = \mu^*$ donc

$$\boxed{\mu^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} \mu^*}$$