


Partie A

1. (a) Le coefficient de  $y'$  ne s'annule que pour  $x = 0$ , les intervalles de résolution sont  $I_1 = \mathbb{R}_-^*$  et  $I_2 = \mathbb{R}_+^*$ . L'équation s'écrit encore  $((e^x - 1)y)' = 1$  d'où  $(e^x - 1)y = x + C_1$  sur  $I_1$ ,  $x + C_2$  sur  $I_2$ .
  - (b) Pour pouvoir prolonger la solution sur  $I_1$  en 0 il faut  $0 \times y(0) = 0 + C_1$  donc  $C_1 = 0$ ; de même il faut  $C_2 = 0$ . On obtient alors pour  $x \neq 0$ :  $y = \frac{x}{e^x - 1} = f(x)$ . Un développement limité à l'ordre 1 donne:  $f(x) = \frac{x}{x + x^2/2 + o(x^2)} = \frac{1}{1 + x/2 + o(x)} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$  qui entraîne que  $f$  est continue en 0 ( $f(0) = 1$ ) et que  $f$  est dérivable en 0 ( $f'(0) = -1/2$ ). (E) admet donc  $f$  comme unique solution sur  $\mathbb{R}$ .
2. (a) La simplification par  $x$  impose de prendre un développement limité à l'ordre 3 pour  $e^x$ :  $f(x) = \frac{x}{x + x^2/2 + x^3/6 + o(x^3)} = \frac{1}{1 + x/2 + x^2/6 + o(x^2)} = 1 - (\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}) + (\frac{x}{2})^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^2)$ .
  - (b) On en déduit  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = -1/2$  mais l'existence d'un développement limité à l'ordre 2 n'entraîne pas que  $f$  est dérivable 2 fois en 0.
  - (c) Il faut montrer que  $f'$  est continue en 0 (pas de problème pour  $x \neq 0$ ). En utilisant (E) :  $f'(x) = \frac{1 - e^x f(x)}{e^x - 1} = \frac{1 - (1+x)(1-x/2) + o(x)}{x + o(x)} = -\frac{1}{2} + o(1)$ .  $f'$  est continue en 0 donc  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - (d) La tangente T a pour équation  $y = -\frac{x}{2} + 1$ . Le développement limité à l'ordre 2 entraîne:  $f(x) - (1 - \frac{x}{2}) = \frac{x^2}{12} + o(x^2)$  qui est positif pour  $x$  proche de 0; la courbe (C) est au dessus de T pour  $x$  proche de 0.
3. (a)  $g'(x) = xe^x$  est négatif pour  $x < 0$  et positif pour  $x > 0$ ;  $g$  a donc un minimum en 0 d'où  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x$ .
  - (b)  $f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2}$  a le signe de  $-g(x) \leq 0$  donc  $f$  est décroissante sur  $\mathbb{R}$ .
  - (c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ :  $f$  a donc pour asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .  
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{e^x - 1} = 0$ :  $f$  a donc pour asymptote  $y = -x$  en  $-\infty$ . On a de plus  $f(x) \geq 0$  et  $f(x) + x \geq 0$  pour tout  $x$ ; (C) est donc au-dessus de ses deux asymptotes.




4. (a)  $f(x) = \frac{x}{2} \frac{2e^{-x/2}}{(e^{x/2} - e^{-x/2})} = \frac{x}{2} \left( \frac{e^{x/2} + e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} - 1 \right) = \frac{x}{2} \left( \frac{1}{\tanh x/2} - 1 \right)$ .
  - (b) i.  $f_1(x) = \frac{x}{2} \frac{1}{\tanh x/2} - 1 = \frac{x}{2} t\left(\frac{x}{2}\right)$ .

- ii.  $t$  est impaire puisque  $\tanh$  est impaire;  $f_1$  est donc paire.
- iii.  $f_1(x)$  est la différence des ordonnées des points de (C) et T ayant la même abscisse  $x$ ; la parité de  $f_1$  entraîne que cette différence est la même pour  $x$  et  $-x$ . Il y a donc égalité entre les aires limitées par (C), T et les droites d'abscisses  $-x$  et 0 d'une part, (C), T et les droites d'abscisses 0 et  $x$  d'autre part.
5. (a)  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$ ; le seul problème vient de la borne  $+\infty$ . En  $+\infty$  on a  $f(x) \sim \frac{x}{e^x} = o(1/x^2)$  donc  $f$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$  et  $I$  existe.
- (b)  $\varphi(u) = -\ln(u)$  définit une bijection de classe  $C^1$  de  $]0, 1[$  sur  $]0, +\infty[$ . on peut donc poser  $x = -\ln u$  dans  $I$  pour obtenir:  $I = \int_1^0 \frac{(-\ln u)(-du)}{1/u - 1} = J$ . Cela prouve l'existence de  $J$  et l'égalité  $I = J$ .
- (c)  $I_0$  existe puisque  $\ln$  est intégrable sur  $]0, 1[$ . Il n'y a pas de problème d'existence pour  $I_k$  quand  $k \geq 1$ . On intègre par parties sur  $[x, 1]$  ( $x > 0$ ):  $I_k = -\left[\frac{u^{k+1}}{k+1} \ln u\right]_x^1 + \int_x^1 \frac{u^k}{k+1} du = \frac{x^{k+1}}{k+1} \ln x + \frac{1}{(k+1)^2}$  qui donne en faisant tendre  $x$  vers 0:  $I_k = \frac{1}{(k+1)^2}$ .
- (d) Soit  $(g_n)$  une suite de fonctions continues et intégrables sur  $I$  telle que la série  $(\sum g_n)$  converge simplement sur  $I$  vers une fonction continue  $g$ ; si de plus la série  $(\sum \int_I |g_n|)$  converge alors  $g$  est intégrable sur  $I$  et  $\int_I g = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I g_n$ .
- (e) Pour  $u \in ]0, 1]$   $\frac{\ln u}{u-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} -u^k \ln u$  donc la série de fonctions de terme général  $g_k(u) = -u^k \ln u$  converge simplement sur  $]0, 1]$  vers la fonction  $g : u \mapsto \frac{\ln u}{u-1}$  qui est continue sur  $]0, 1]$ . La série de terme général  $\int_0^1 |g_k(u)| du = I_k$  converge (série de Riemann d'exposant 2) donc on obtient  $J = \sum_{k=0}^{\infty} I_k$ . En changeant  $k$  en  $k-1$  on a bien  $I = J = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \zeta(2)$ .

## Partie B

1. (a)  $g_a$  est continue sur  $\mathbb{R}$  car  $\lim_{t \rightarrow -\pi} g_a(t) = \cosh(a\pi) = g_a(\pi)$ .



- (b)  $\int_0^\pi \cosh(at) \cos(nt) dt = \left[ \frac{\sinh(at)}{a} \cos(nt) \right]_0^\pi + \int_0^\pi \frac{\sinh(at)}{a} n \sin(nt) dt$   
 $= \frac{\sinh(a\pi)}{a} (-1)^n + \left[ \frac{\cosh(at)}{a^2} n \sin(nt) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\cosh(at)}{a^2} n^2 \cos(nt) dt$   
d'où  $(1 + \frac{n^2}{a^2}) \int_0^\pi \cosh(at) \cos(nt) dt = \frac{\sinh(a\pi)}{a} (-1)^n$  qui est bien le résultat attendu.
- (c)  $g_a$  est paire donc  $b_n = 0$  et  $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi g_a(t) \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} (-1)^n \frac{a \sinh(a\pi)}{a^2 + n^2}$ .

- (d) Puisque  $g_a$  est  $2\pi$ -périodique, continue et de classe  $C^1$  par morceaux sa série de Fourier converge normalement sur  $\mathbb{R}$  vers  $g_a$ .
- (e) On a donc  $g_a(\pi) = \cosh(a\pi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi) = \frac{\sinh(a\pi)}{a\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a \sinh(a\pi)}{a^2 + n^2}$ . En posant  $x = a\pi$  on obtient  $2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + (n\pi)^2} = \frac{1}{\tanh x} - \frac{1}{x} = t(x)$ .
2. (a)  $N_{\infty}(t \mapsto \frac{1}{t^2 + n^2\pi^2}) = \frac{1}{n^2\pi^2}$  est le terme général d'une série de Riemann convergente donc il y a bien convergence normale.
- (b) L'application  $t \mapsto \frac{1}{t^p}$  est décroissante sur  $[1, +\infty[$  donc  $\frac{1}{(k+1)^p} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t^p} dt \leq \frac{1}{k^p}$  pour  $k \geq 1$ ; en ajoutant ces inégalités pour  $1 \leq k \leq n-1$ :  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} - 1 \leq \int_1^n \frac{1}{t^p} dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^p}$ .  
Pour  $p \geq 2$ , l'application  $t \mapsto \frac{1}{t^p}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$  donc  $\zeta(p)$  existe. En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  on obtient  $\zeta(p) - 1 \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{t^p} dt = \left[ \frac{t^{1-p}}{1-p} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{p-1}$ . Comme  $\zeta(p) \geq 1$  on déduit  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \zeta(p) = 1$ .
- (c) Quand  $k$  tend vers  $+\infty$ ,  $|\alpha_{2k} t^{2k}| = \frac{\zeta(2k+2)t^{2k}}{\pi^{2k+2}} \sim \left(\frac{t}{\pi}\right)^{2k} \frac{1}{\pi^2}$  qui tend vers 0 si et seulement si  $|t| < \pi$ . Le rayon de convergence de la série entière est donc égal à  $\pi$  et la série converge pour  $|t| < \pi$ .
- (d)  $S_N(t) = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k t^{2k}}{\pi^{2k+2}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k+2}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k t^{2k}}{(n\pi)^{2k+2}}$  puisque les  $N+1$  séries convergent.  
Puisque  $|t| < n\pi$  on calcule  $S_N(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n\pi)^2} \frac{1 - (-\frac{t^2}{(n\pi)^2})^{N+1}}{1 + \frac{t^2}{(n\pi)^2}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^N (\frac{t}{n\pi})^{2N+2}}{t^2 + (n\pi)^2}$ .  
D'où  $|S_N(t) - m(t)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\frac{t}{n\pi})^{2N+2}}{t^2 + (n\pi)^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\frac{t^2}{\pi^2})^{N+1}}{t^2 + (n\pi)^2} = \left(\frac{t^2}{\pi^2}\right)^{N+1} m(t)$ .
- (e) En faisant tendre  $N$  vers  $+\infty$  on obtient pour  $t \in ]-\pi, \pi[$ :  $h(t) = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(t) = m(t)$ .
3. (a) C'est une fonction somme d'une série entière de rayon de convergence non nul.
- (b) D'après B)1)e)  $t(x) = 2xm(x)$ ; d'après B)2)e)  $m(x) = h(x)$ . On a donc  $t(x) = 2 \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{2k} x^{2k+1}$  pour  $|x| < \pi$ .
- (c) D'après A)4)b)i)  $f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x}{2} t\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{x}{2} + 2 \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{2k} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+2}$  pour  $|\frac{x}{2}| < \pi$ . On a donc pour  $x \in ]-2\pi, 2\pi[$ :  $f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \beta_k x^{2k}$  en posant  $\beta_k = \frac{\alpha_{2k-2}}{2^{2k-1}} = \frac{(-1)^{k-1} \zeta(2k)}{2^{2k-1} \pi^{2k}}$ .
- (d)  $f$  est donc de classe  $C^{\infty}$  sur  $] -2\pi, 2\pi[$ ; comme elle l'est aussi sur  $\mathbb{R}^*$  par sa définition elle l'est sur  $\mathbb{R}$ .  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = -\frac{1}{2}$ , et pour  $k \geq 1$ :  $f^{(2k+1)}(0) = 0$  et  $f^{(2k)}(0) = (2k)! \beta_k$ .
- (e) En utilisant le développement limité de  $f$  calculé au A)2)a) on obtient:  $I = \zeta(2) = 2\pi^2 \beta_1 = 2\pi^2 \times \frac{1}{12} = \frac{\pi^2}{6}$ .