

CCP2015 - PSI

Un corrigé

1 Quelques exemples d'étude d'un système différentiel

I.1. Le théorème indique que l'ensemble des solutions de (E) sur I est un \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension n .

I.2. Posons $X : t \mapsto \alpha(t)V$ et raisonnons par conditions nécessaires puis suffisantes.

- Si X est solution de (E) alors, en considérant une coordonnée non nulle de V (qui existe car $V \neq 0$ comme vecteur propre), disons V_i , on a $\alpha(t) = \frac{X_i(t)}{V_i}$ et α est donc dérivable. De plus, $X'(t) = \alpha'(t)V$ et $A(t)X(t) = \lambda(t)\alpha(t)X(t)$ et donc

$$\forall t \in I, \alpha'(t) = \lambda(t)\alpha(t) \quad (1)$$

- Réciproquement, si α est solution de (1) alors X est dérivable et le même calcul montre que c'est une solution de (E) .

D'après le théorème fondamental si $t_0 \in I$, la fonction $t \mapsto \int_{t_0}^t \lambda(u) du$ est une primitive sur l'intervalle I de la fonction continue λ . Et d'après le cours, l'ensemble des solutions de (1) sur I est

$$\text{Vect} \left(t \mapsto e^{\int_{t_0}^t \lambda(u) du} \right)$$

I.3. On remarque que $A(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ce qui donne un premier vecteur propre pour A .

Comme la trace de $A(t)$ vaut $a + 1 - b$, SI il y a une seconde valeur propre, c'est $a - b$. En cherchant un élément du noyau de $A - (a - b)I_2$, on est amenés à trouver que $(a - 1, b)$ est vecteur propre associé à la valeur propre $a - b$. Comme $\begin{vmatrix} 1 & a - 1 \\ 1 & b \end{vmatrix} = b - a + 1 \neq 0$ par hypothèse, nos deux vecteurs propres sont indépendants. La question précédente indique (on choisit $t_0 = 0$ et l'intégrale se calcule immédiatement puisque $\lambda(t)$ est une constante) que

$$X : t \mapsto e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y : t \mapsto e^{(a-b)t} \begin{pmatrix} a - 1 \\ b \end{pmatrix}$$

sont deux solutions de (E) . L'indépendance des vecteurs propres donne l'indépendance des fonctions et, par dimension (X, Y) est une base de l'espace des solutions de (E) sur \mathbb{R} .

I.4.1 Dans le cas $\mu = 1$, $(1, 1)$ et $(1, -1)$ sont vecteurs propres de $A(t)$ associés aux valeurs propres $a(t) + b(t)$ et $a(t) - b(t)$. Ces deux vecteurs propres sont indépendants. En choisissant $t_0 \in I$ et en utilisant **I.2** on obtient deux solutions de (E) qui sont indépendantes car les vecteurs propres le sont. Par dimension, l'ensemble des solutions de (E) sur I est

$$\text{Vect} \left(t \mapsto e^{\int_{t_0}^t (a(u)+b(u)) du} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \mapsto e^{\int_{t_0}^t (a(u)-b(u)) du} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

I.4.2 Le polynôme caractéristique de $A(t)$ est

$$\chi_t(\lambda) = \lambda^2 - (2a(t) + (\mu - 1)b(t))\lambda - (a(t)^2 + (\mu - 1)a(t)b(t) - \mu b(t)^2)$$

Le discriminant de χ_t vaut (après calcul simple)

$$\Delta_t = (\mu + 1)^2 b(t)^2$$

- Si $\mu \neq -1$ alors χ_t admet deux racines distinctes. $A(t)$ admet donc deux valeurs propres distinctes

$$\lambda_1(t) = \frac{2a(t) + (\mu - 1)b(t) - (\mu + 1)b(t)}{2} = a(t) - b(t)$$

$$\lambda_2(t) = \frac{2a(t) + (\mu - 1)b(t) + (\mu + 1)b(t)}{2} = a(t) + \mu b(t)$$

Connaissant les valeurs propres, il est facile de deviner des vecteurs propres. $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

est vecteur propre associé à $a(t) + \mu$ et $V_1 = \begin{pmatrix} \mu \\ -1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre associé à $a(t) - b(t)$.

V_1 et V_2 sont constants et λ_1, λ_2 sont des fonctions continues.

- Si $\mu = -1$ alors $\chi_t = (\lambda - a + b)^2$. $A(t)$ possède une unique valeur propre. On vérifie que V_2 est toujours vecteur propre associé à la valeur propre $a(t) - b(t)$. On ne peut trouver un second vecteur propre indépendant. On pourrait bien sûr conclure en $V_1 = 2V_2$ et $\lambda_1 = \lambda_2$ mais ceci ne semble pas trop dans l'esprit du problème. On peut penser qu'il y a un bug ou un autre (mais lequel?) dans l'énoncé.

I.4.3 Si $\forall t \in I, \lambda_1(t) \neq \lambda_2(t)$ alors, en prenant un t particulier (qui existe car I n'est pas vide) et comme $b(t) \neq 0$, on a $\mu \neq -1$. Réciproquement, comme b ne s'annule pas, $\lambda_1(t)$ est toujours différent de $\lambda_2(t)$ quand $\lambda \neq -1$. La condition nécessaire et suffisante cherchée est donc

$$\mu \neq -1$$

I.4.4 Dans le cas $\mu \neq -1$, le calcul fait en **I.4.2** et **I.2** donnent deux solutions indépendantes de (E) . Par dimension ((V_1, V_2) est libre) on obtient une base formée de

$$t \mapsto e^{\int_{t_0}^t (a(u) - b(u)) du} \begin{pmatrix} \mu \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad t \mapsto e^{\int_{t_0}^t (a(u) + \mu b(u)) du} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2 Développement en série entière des solutions pour A constante

II.1.1 On a cinq propriétés à vérifier.

- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $X \neq 0$. On a

$$\frac{\|AX\|}{\|X\|} = \left\| A \frac{X}{\|X\|} \right\|$$

$Y \mapsto AY$ est linéaire en dimension et donc continue. Elle est donc bornée sur la sphère unité par une constante M . On a alors $\frac{\|AX\|}{\|X\|} \leq M$ et la borne supérieure $N(A)$ existe.

- De façon immédiate, $\forall A, N(A) \geq 0$ (borne supérieure de quantités positives). On a ainsi la positivité de N .
- Si $N(A) = 0$ alors $\forall X \neq 0, \|AX\| = 0$ (une borne supérieure de quantité positives n'est nulle que si toutes les quantités sont nulles). Ceci reste vrai si $X = 0$ et $A = 0$ (l'endomorphisme canoniquement associé à A l'est). On a ainsi N qui vérifie l'axiome de séparation.
- Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\forall X \neq 0, \frac{\|(A+B)X\|}{\|X\|} \leq \frac{\|AX\| + \|BX\|}{\|X\|} = \frac{\|AX\|}{\|X\|} + \frac{\|BX\|}{\|X\|} \leq N(A) + N(B)$$

En passant à la borne supérieure, il vient $N(A+B) \leq N(A) + N(B)$, c'est à dire l'inégalité triangulaire.

- Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. On a

$$\forall X \neq 0, \frac{\|(\lambda A)X\|}{\|X\|} = |\lambda| \frac{\|AX\|}{\|X\|} \leq |\lambda| N(A)$$

En passant à la borne supérieure, on trouve que $N(\lambda A) \leq |\lambda| N(A)$.

Si $\lambda = 0$, l'égalité est immédiate. Sinon, on a aussi $N(A) = N(\frac{1}{\lambda} \lambda A) \leq \frac{1}{|\lambda|} N(\lambda A)$ ce qui permet d'obtenir l'inégalité réciproque. On a donc l'homogénéité.

II.1.2 Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\forall X \notin \ker(B), \frac{\|ABX\|}{\|X\|} = \frac{\|ABX\|}{\|BX\|} \frac{\|BX\|}{\|X\|} \leq N(A)N(B)$$

et ceci reste trivialement vrai si $X \in \ker(B) \setminus \{0\}$. Par passage à la borne supérieure, on a donc

$$N(AB) \leq N(A)N(B)$$

II.2.1 On prouve le résultat annoncé par récurrence sur k .

- Initialisation : le résultat est vrai pour $k = 0$ avec les conventions choisies.
- Hérédité : supposons le résultat vrai à un rang $k \geq 0$. $X' = AX$ et multiplier par A (qui est constante) ne change pas la régularité (théorèmes d'opérations). Donc $X' \in C^k$ ou encore $X \in C^{k+1}$. Et en dérivant (linéarité de la dérivation, rappelons encore que A est constante)

$$X^{k+1} = AX^{(k)}(t) = A(A^k X(t)) = A^{k+1}X(t)$$

ce qui prouve le résultat au rang $k + 1$.

II.2.2 D'après la formule de Taylor-intégrale appliquée à X (de classe C^∞) à l'ordre p entre 0 et t :

$$X(t) = \sum_{k=0}^p \frac{t^k}{k!} X^{(k)}(0) + \int_0^t \frac{(t-u)^p}{p!} X^{(p+1)}(u) du$$

Remarque : cette formule vectorielle est la conséquence directe de la formule scalaire si on se reporte aux coordonnées.

La question précédente donnant $X^{(k)}(0) = A^k X(0) = A^k X_0$ et $X^{(p+1)}(u) = A^{p+1} X(u)$, on a ainsi

$$X(t) = \left(\sum_{k=0}^p \frac{t^k}{k!} A^k \right) X_0 + \int_0^t \frac{(t-u)^p}{p!} A^{p+1} X(u) du$$

II.2.3 Il s'agit de montrer qu'à t fixé, la norme du terme intégral de la formule précédente est de limite nulle. Or, (il faut prendre garde au sens des bornes et donc au signe de t)

$$\left\| \int_0^t \frac{(t-u)^p}{p!} A^{p+1} X(u) du \right\| \leq \int_{[0,t]} \left\| \frac{(t-u)^p}{p!} A^{p+1} X(u) \right\| du = \int_{[0,t]} \frac{|t-u|^p}{p!} \|A^{p+1} X(u)\| du$$

Par définition de N , on a $\|MX\| \leq N(M)\|X\|$ pour tout $X \neq 0$ (et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$). Ainsi

$$\|A^{p+1} X(u)\| \leq N(A^{p+1})\|X(u)\| \leq N(A^{p+1})M_t \text{ avec } M_t = \sup_{u \in [0,t]} \|X(u)\|$$

M_t existant puisqu'une fonction continue est bornée sur un segment.

Mais **II.1.2** et une récurrence simple donne $N(A^{p+1}) \leq N(A)^{p+1}$ en sorte que

$$\left\| \int_0^t \frac{(t-u)^p}{p!} A^{p+1} X(u) du \right\| \leq \frac{N(A)^{p+1} M_t}{p!} \int_{[0,t]} |t-u|^p du$$

Le calcul de l'intégrale est simple (distinguer les cas $t \geq 0$ et $t \leq 0$ permet de se débarrasser des module) et donne

$$\int_{[0,t]} |t-u|^p du = \frac{|t|^{p+1}}{p+1}$$

On a finalement

$$\left\| \int_0^t \frac{(t-u)^p}{p!} A^{p+1} X(u) du \right\| \leq \frac{(tN(A))^{p+1} M_t}{(p+1)!}$$

Le majorant est de limite nulle par croissances comparées (exponentielle et factorielle). On a donc

$$X(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^p \frac{t^k}{k!} A^k \right) X_0$$

Chaque coordonnée de $\left(\sum_{k=0}^p \frac{t^k}{k!} A^k \right) X_0$ pouvant s'écrire sous la forme $\sum_{k=0}^p \alpha_k t^k$ (α_k ne dépendant que de k et de rien d'autre, en particulier pas de p ou de t), chaque X_i est donc somme sur \mathbb{R} d'une série entière.

II.3.1 On peut utiliser un calcul par bloc (déterminant bloc-diagonal) pour obtenir

$$P_A(X) = (X - 1)^2(X^2 - X) = X(X - 1)^3$$

II.3.2 $(1, X, X(X - 1), X(X - 1)^2)$ est libre puisqu'échelonnée en degré. Elle est composée de 4 éléments de $\mathbb{C}_3[X]$ qui est de dimension 4 et c'est donc une base de $\mathbb{C}_3[X]$. Le reste dans la division euclidienne de X^k par P_A étant de degré ≤ 3 , il existe un polynôme Q_k et des complexes a_k, b_k, c_k, d_k tels que

$$X^k = P_A(X)Q_k(X) + a_k + b_k X + c_k X(X - 1) + d_k X(X - 1)^2 \quad (2)$$

En prenant la valeur en $X = 0$ (et comme $k > 0$) on trouve $a_k = 0$. La valeur en $X = 1$ donne $b_k = 1$. En dérivant et en faisant $X = 1$, on en déduit alors que $c_k = k - 1$. En dérivant deux fois et en faisant $X = 1$, on en déduit enfin que $2d_k = k(k - 1) - 2(k - 1) = (k - 1)(k - 2)$. Le reste cherché est donc

$$X + (k - 1)X(X - 1) + \frac{1}{2}(k - 1)(k - 2)X(X - 1)^2$$

II.3.3 Comme $P \mapsto P(A)$ est compatible avec les loi (morphisme d'anneau) et comme P_A annule A (Cayley-Hamilton), la relation (2) "appliquée en A " donne

$$A^k = A + (k - 1)A(A - I_4) + \frac{1}{2}(k - 1)(k - 2)A(A - I_4)^2$$

II.3.4 Un calcul immédiat donne

$$A(A - I_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{2,3} \quad \text{et} \quad A(A - I_4)^2 = 0$$

II.3.5 On a, pour tout t réel,

$$\sum_{n=1}^p \frac{t^n}{n!} (n - 1) = \sum_{n=1}^p \frac{t^n}{(n - 1)!} - \sum_{n=1}^p \frac{t^n}{n!} = t \sum_{n=0}^{p-1} \frac{t^n}{n!} - \sum_{n=1}^p \frac{t^n}{n!}$$

Chaque terme admet une limite et on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (n - 1) = te^t - e^t + 1$$

qui est somme de série entière de rayon infini.

II.3.6 Pour $k \geq 1$, on a $A^k = A + (k - 1)E_{2,3}$. On en déduit que (chaque terme existe bien)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k(k - 1)}{k!} E_{2,3}$$

En ajoutant le terme pour $k = 0$, on obtient

$$M(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = I_4 + (e^t - 1)A + (te^t - e^t + 1)E_{2,3} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & -e^t + 1 & e^t - 1 \\ 0 & e^t & te^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t - 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il suffit alors d'appliquer la question **II.2.3** pour en déduire que la solution cherchée est

$$X : t \mapsto M(t)X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ te^t \\ e^t \\ e^t - 1 \end{pmatrix}$$

3 Etude de deux fonctions

III.1.1 f est continue sur \mathbb{R}^+ et le seul problème d'intégrabilité est au voisinage de $+\infty$ où $f(t) = o(1/t^2)$ par croissances comparées et donc intégrable (comparaison aux fonctions de Riemann). Ainsi, f est intégrable sur \mathbb{R}^+ .

III.1.2 f étant continue sur \mathbb{R}^+ , le théorème fondamental indique que $x \mapsto \int_0^x f$ est une primitive de f . C'est donc une fonction de classe C^1 dont f est la dérivée. Par théorèmes d'opérations, $F \in C^1(\mathbb{R}^+)$ et

$$\forall x \geq 0, F'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x xe^{-t^2} dt$$

Pour étudier G , on utilise le théorème de régularité des intégrales à paramètres.

- $\forall x \geq 0, t \mapsto \frac{e^{-x^2(t^2+1)}}{t^2+1}$ est continue sur $[0, 1]$; elle est donc intégrable sur $[0, 1]$ (qui est un segment).
- $\forall t \in [0, 1], x \mapsto \frac{e^{-x^2(t^2+1)}}{t^2+1}$ est de classe C^1 sur \mathbb{R}^+ de dérivée $x \mapsto -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.
- $\forall x \geq 0, t \mapsto -2xe^{-x^2(1+t^2)}$ est continue sur $[0, 1]$.
- $\forall a > 0, \forall x \in [0, a], \forall t \in [0, 1], \left| -2xe^{-x^2(1+t^2)} \right| \leq 2a$. Le majorant est une fonction constante sur le segment $[0, 1]$ et est donc intégrable sur ce segment.

Le théorème donne $G \in C^1([0, 1])$ et

$$\forall x \geq 0, G'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-(xt)^2} dt$$

III.1.3 Pour $x > 0$, on peut poser $u = xt$ pour obtenir

$$G'(x) = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -F'(x)$$

et cette formule reste vraie pour $x = 0$ (elle se lit $0 = 0$). Ainsi, $(F + G)$ est constante sur l'intervalle \mathbb{R}^+ . On a donc

$$\forall x \geq 0, F(x) + G(x) = F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

III.1.4 Une majoration grossière donne $\forall x \geq 0, \forall t \in [0, 1], 0 \leq \frac{e^{-x^2(t^2+1)}}{t^2+1} \leq e^{-x^2}$ et donc $0 \leq G(x) \leq e^{-x^2}$. Ainsi (théorème d'encadrement)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 0$$

Avec la question précédente, on en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{4}$$

III.1.5 Mais comme $t \mapsto e^{-t^2}$ est intégrable, on a aussi $F(x) \rightarrow (\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt)^2$ et, l'intégrale étant positive, ceci donne (en passant à la racine carrée)

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

III.2.1 On utilise encore le théorème de régularité des intégrales à paramètres.

- $\forall t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{e^{-x+itx}}{\sqrt{x}}$ est continue sur \mathbb{R}^{+*} , équivalente à $1/\sqrt{x}$ en 0 et donc intégrable au voisinage de 0 et $o(e^{-x}) = o(1/x^2)$ en $+\infty$ et donc intégrable au voisinage de $+\infty$.

- $\forall x > 0$, $t \mapsto \frac{e^{-x+itx}}{\sqrt{x}}$ est de classe C^1 sur \mathbb{R}^+ de dérivée $t \mapsto i\sqrt{x}e^{-x+itx}$.

- $\forall t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto i\sqrt{x}e^{-x+itx}$ est continue sur \mathbb{R}^+ .

- $\forall t \in \mathbb{R}$, $\forall x > 0$, $|i\sqrt{x}e^{-x+itx}| = \sqrt{x}e^{-x}$. Le majorant est continu sur \mathbb{R}^+ et négligeable devant $1/x^2$ au voisinage de $+\infty$ (croissances comparées) et donc intégrable sur \mathbb{R}^+ .

Le théorème indique que $t \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x+itx}}{\sqrt{x}} dx$ est de classe C^1 sur \mathbb{R} de dérivée $t \mapsto \int_0^{+\infty} i\sqrt{x}e^{-x+itx} dx$.

Ses parties réelle et imaginaire sont donc de classe C^1 , c'est à dire que

$$u, v \in C^1(\mathbb{R})$$

III.2.2 On vient de voir que

$$\forall t \in \mathbb{R}, w'(t) = i \int_0^{+\infty} \sqrt{x}e^{-x+itx} dx$$

On veut effectuer une intégration par parties en dérivant $x \mapsto \sqrt{x}$ en $x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ et en primitivant $x \mapsto e^{-x+itx}$ en $x \mapsto -\frac{e^{-x+itx}}{1-it}$ (fonction de classe C^1 sur \mathbb{R}^{+*}). Comme $\sqrt{x}\frac{e^{-x+itx}}{1-it}$ admet des limites finies en 0 et $+\infty$, l'intégration par parties est licite. Les limites évoquées étant nulles, elle donne

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{x}e^{-x+itx} dx = \frac{1}{2(1-it)} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1-it)}}{\sqrt{x}} dx$$

et on a donc

$$\forall t \in \mathbb{R}, w'(t) = \frac{i}{2(1-it)} w(t) = \frac{1}{2(1+t^2)} (-t+i) w(t)$$

En passant aux parties réelle et imaginaire, on obtient des relations vérifiées par u et v qui s'écrivent, après calcul simple,

$$\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = A(t)X(t) \text{ avec } A(t) = \frac{1}{2(1+t^2)} \begin{pmatrix} -t & -1 \\ 1 & -t \end{pmatrix}$$

III.2.3 Le polynôme caractéristique de $\begin{pmatrix} -t & -1 \\ 1 & -t \end{pmatrix}$ est $\lambda^2 + 2t\lambda + (t^2 + 1)$. Les valeurs propres de cette matrices sont donc $-t+i$ et $-t-i$ et une résolution de système donne $(i, 1)$ et $(-i, 1)$ comme vecteurs propres. Ainsi,

$$A(t) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-t+i}{2(1+t^2)} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } A(t) \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-t-i}{2(1+t^2)} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

On a deux valeurs propres distinctes pour $A(t)$ et, comme on est en dimension 2 et que les sous-espaces propres sont en somme directe, on peut conclure qu'il y a deux valeurs propres et des sous-espaces propres de dimension 1 :

$$\text{Sp}(A(t)) = \left\{ \frac{-t+i}{2(1+t^2)}, \frac{-t-i}{2(1+t^2)} \right\} = \{\lambda_1(t), \lambda_2(t)\}$$

$$E_{\lambda_1(t)}(A(t)) = \text{Vect}((i, 1)), E_{\lambda_2(t)}(A(t)) = \text{Vect}((-i, 1))$$

III.2.4 On a

$$\int_0^t \lambda_1(u) du = -\frac{1}{4} \ln(1+t^2) + \frac{i}{2} \arctan(t)$$

$$\int_0^t \lambda_2(u) du = -\frac{1}{4} \ln(1+t^2) - \frac{i}{2} \arctan(t)$$

La question **I.2** montre que les deux fonctions

$$X_1 : t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)^{1/4}} e^{\frac{i \arctan(t)}{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X_2 : t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)^{1/4}} e^{-\frac{i \arctan(t)}{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

sont solutions de (E_1) . Elles sont indépendantes (les vecteurs propres le sont) et forment une base de l'ensemble des solutions de (E_1) sur \mathbb{R} . La solution générale de (E_1) est du type $\alpha X_1 + \beta X_2$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

III.2.5 Remarquons que (changement de variable $y = \sqrt{x}$ qui est de classe C^1 sur \mathbb{R}^{+*} à dérivée ne s'annulant pas)

$$u(0) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$$

$$v(0) = 0$$

On a ainsi $X(0) = (\sqrt{\pi}, 0)$. Mais on sait aussi qu'il existe des constantes α, β telles que $X = \alpha X_1 + \beta X_2$. La valeur en 0 donne $\sqrt{\pi} = i\alpha - i\beta$ et $0 = \alpha + \beta$. On en déduit que $\alpha = \beta = -i\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Il suffit alors de former $\alpha X_1 + \beta X_2$ pour obtenir

$$u(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{(1+t^2)^{1/4}} \cos\left(\frac{\arctan(t)}{2}\right) \quad \text{et} \quad v(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{(1+t^2)^{1/4}} \sin\left(\frac{\arctan(t)}{2}\right)$$