

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement  
Supérieur, de la Formation des Cadres  
et de la Recherche Scientifique

Présidence du Concours National Commun 2005  
École Hassania des Travaux Publics  
EHTP

Concours National Commun  
d'Admission aux  
Grandes Écoles d'Ingénieurs ou Assimilées  
Session 2005

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES II

Durée 4 heures

Filière **PSI**

Cette épreuve comporte 3 pages au format A4, en plus de cette page de garde  
L'usage de la calculatrice est *interdit*

**L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI,  
comporte 3 pages.  
L'usage de la calculatrice est interdit .**

*Les candidats sont informés que la précision des raisonnements ainsi que le soin apporté à la rédaction et à la présentation des copies seront des éléments pris en compte dans la notation. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.*

**Exemples d'étude d'équations du type  $X^2 = A$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$**

**Notations et rappels**

Dans tout le problème,  $n$  désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2 et  $E$  est un espace vectoriel réel de dimension finie  $n$ .  $\mathcal{L}(E)$  désigne l'algèbre des endomorphismes de  $E$  ; si  $u$  et  $v$  sont des éléments de  $\mathcal{L}(E)$ , l'endomorphisme composé  $u \circ v$  sera noté simplement  $uv$  et l'identité se notera  $I_E$ .

Si  $u \in \mathcal{L}(E)$ , on pose  $u^0 = I_E$  et pour  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $u^k = uu^{k-1}$  ; on rappelle que  $u$  est dit nilpotent s'il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $u^k = 0$  ; on note enfin  $\text{Sp}(u)$  l'ensemble des valeurs propres de  $u$ .

Si  $p \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à  $n$  lignes et  $p$  colonnes ; si  $p = n$ ,  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  est noté simplement  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , c'est l'algèbre des matrices réelles carrées d'ordre  $n$  ; la matrice identité de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  sera notée  $I_n$ .

Pour toute matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ ,  ${}^tA$  désigne la matrice transposée de  $A$  et, si  $p = n$ ,  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$  représente l'ensemble des valeurs propres réelles de  $A$  et  $\text{Tr}(A)$  sa trace.

Si  $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ , et  $\alpha_n$  sont des réels, on note  $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  la matrice diagonale de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  qui admet pour coefficients diagonaux les réels  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  dans cet ordre.

*Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

**I. Un premier exemple**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  ; on note  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associé à la matrice  $A$ .

1. Calculer les valeurs propres de  $u$  et justifier que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .
2. On note  $\lambda_1, \lambda_2$  et  $\lambda_3$  les valeurs propres de  $u$  avec  $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ . Déterminer, pour chaque  $i \in \{1, 2, 3\}$ , le vecteur  $e_i$  de  $\mathbb{R}^3$  dont la deuxième composante vaut 1 et vérifiant  $u(e_i) = \lambda_i e_i$ .
3. Justifier que  $(e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$  et écrire la matrice  $D$  de  $u$  relativement à cette base, puis trouver une relation entre  $A$  et  $D$ .
4. Si  $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  est une matrice vérifiant  $B^2 = A$ , on note  $v$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  qui lui est canoniquement associé.
  - 4-1. Vérifier que  $v^2 = u$  et que  $uv = vu$ .
  - 4-2. Pour chaque  $i \in \{1, 2, 3\}$ , calculer  $uv(e_i)$  et en déduire que  $v(e_i)$  est colinéaire à  $e_i$ .
  - 4-3. Conclure que la matrice  $V$  de  $v$  relativement à la base  $(e_1, e_2, e_3)$  est diagonale de la forme  $V = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  et en déduire les valeurs possibles de  $\alpha_1, \alpha_2$  et  $\alpha_3$ .
5. Trouver alors toutes les solutions, dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , de l'équation  $X^2 = A$ . Combien y'en a-t-il ?

## II. Cas d'un endomorphisme du type $I_E + u$ avec $u$ nilpotent

### A- Un résultat préliminaire

Soient  $\alpha$  un réel et  $f_\alpha$  la fonction définie sur  $] -1, +\infty[$  par  $f_\alpha(x) = (1+x)^\alpha$ .

1. Montrer que la fonction  $f_\alpha$  vérifie l'équation différentielle  $(1+x)y' - \alpha y = 0$  (1).
2. On cherche des solutions de (1) qui soient développables en série entière au voisinage de l'origine. Soit donc  $\sum_{k \geq 0} a_k z^k$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$  dont la somme  $S_a$  vérifie l'équation différentielle (1) sur l'intervalle  $] -r, r[$  où  $r = \min(1, R)$ .
  - 2-1. Montrer que, pour tout entier  $k \geq 0$ ,  $(k+1)a_{k+1} = (\alpha - k)a_k$ .
  - 2-2. Pour tout entier  $k \geq 1$ , exprimer le coefficient  $a_k$  en fonction de  $a_0$ ,  $\alpha$  et  $k$ .
  - 2-3. Calculer le rayon de convergence  $\rho$  de la série entière ainsi obtenue lorsque  $a_0 = 1$  et justifier que sa somme coïncide avec  $f_\alpha$  sur l'intervalle  $] -\rho, \rho[$ .
3. On note  $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$  la suite des coefficients du développement en série entière au voisinage de 0 de la fonction  $f_{\frac{1}{2}}$ ; montrer que  $b_0 = 1$ ,  $2b_0b_1 = 1$  et  $\forall q \geq 2$ ,  $\sum_{k=0}^q b_k b_{q-k} = 0$ .

### B- Étude dans le cas de l'endomorphisme $I_E + u$ où $u$ est nilpotent

Dans cette section,  $u$  désigne un endomorphisme nilpotent de  $E$  et  $p = \min\{k \in \mathbb{N}^* ; u^k = 0\}$ .

1. 1-1. Justifier qu'il existe  $x_0 \in E$  tel que  $u^{p-1}(x_0) = 0$ .
  - 1-2. Montrer que la famille  $(x_0, u(x_0), \dots, u^{p-1}(x_0))$  est libre.
  - 1-3. En déduire que  $p \leq n$  et que  $u^n = 0$ .
2. On suppose qu'il existe  $v \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $v^2 = u$ .
  - 2-1. Calculer  $v^{2p}$  et  $v^{2(p-1)}$ , puis en déduire que  $p \leq \frac{n+1}{2}$ .
  - 2-2. Donner alors un exemple de matrice  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  telle que l'équation  $X^2 = M$  n'ait pas de solution dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .
3. On pose  $w = \sum_{k=0}^{n-1} b_k u^k$  où les  $b_k$  sont les termes de la suite de la question A-3. Justifier que  $w^2 = \sum_{0 \leq i, j \leq n-1} b_i b_j u^{i+j}$  et en déduire que  $(\pm w)^2 = I_E + u$ .
4. Dans cette question, on suppose que  $p = n$ ; on a donc  $u^{n-1} \neq 0$  et  $u^n = 0$ . On considère un endomorphisme  $g$  de  $E$  tel que  $g^2 = I_E + u$ .
  - 4-1. Soit  $x_1 \in E$  tel que  $u^{n-1}(x_1) = 0$ . Justifier que  $(x_1, u(x_1), \dots, u^{n-1}(x_1))$  est une base de  $E$  et qu'il existe  $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$  tel que  $g(x_1) = \alpha_0 x_1 + \alpha_1 u(x_1) + \dots + \alpha_{n-1} u^{n-1}(x_1)$ .
  - 4-2. Vérifier que  $gu = ug$  et montrer que  $g = \alpha_0 I_E + \alpha_1 u + \dots + \alpha_{n-1} u^{n-1}$ .
  - 4-3. Justifier que la famille  $(I_E, u, \dots, u^{n-1})$  est libre puis, en calculant  $g^2$  de deux façons, montrer que  $\alpha_0^2 = 1$ ,  $2\alpha_0\alpha_1 = 1$  et  $\sum_{k=0}^q \alpha_k \alpha_{q-k} = 0$  pour  $2 \leq q \leq n-1$  (si  $n \geq 3$ ).
  - 4-4. Montrer alors qu'il existe  $\varepsilon \in \{-1, 1\}$  tel que, pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ ,  $\alpha_k = \varepsilon b_k$ , et en déduire que  $g = \pm w$ .

5. **Application :** Déterminer toutes les matrices  $X \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  telles que  $X^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

### III. Autres résultats généraux

#### A- Cas d'un endomorphisme trigonalisable

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme trigonalisable ; on admet qu'il existe deux endomorphismes  $d$  et  $\nu$  de  $E$  avec  $d$  diagonalisable,  $\nu$  nilpotent et vérifiant

$$u = d + \nu, \quad \nu d = d\nu.$$

Pour tout  $\lambda \in \text{Sp}(d)$ , on note  $E_\lambda$  le sous-espace propre de  $d$  associé à  $\lambda$  :  $E_\lambda = \text{Ker}(d - \lambda I_E)$ .

**On suppose de plus que les valeurs propres de  $u$  sont strictement positives :**  $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$ .

1. Montrer que  $E_\lambda$  est stable par  $\nu$  et que l'endomorphisme  $\nu_\lambda$  induit par  $\nu$  sur  $E_\lambda$  est nilpotent.
2. Montrer que  $\text{Sp}(d) \subset \text{Sp}(u)$  et en déduire que  $d$  est inversible.
3. On note  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ ,  $r \geq 1$ , les valeurs propres deux à deux distinctes de  $d$ . Justifier que  $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}$  et donner, pour tout  $x = x_1 + \dots + x_r \in E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}$ , l'expression de  $d(x)$ .
4. Construire un endomorphisme  $\delta$  de  $E$  tel que  $\delta^2 = d$  et vérifiant  $\nu\delta = \delta\nu$ .
5. Vérifier que  $\delta$  est inversible et que l'endomorphisme  $\nu\delta^{-2}$  est nilpotent.
6. En déduire qu'il existe  $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  tel que l'endomorphisme  $w = P(\nu\delta^{-2})$  vérifie  $w^2 = I_E + \nu\delta^{-2}$  puis construire  $v \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $v^2 = u$ .

#### B- Cas des matrices symétriques positives

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est symétrique, elle est dite positive si pour tout  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ,  ${}^tXAX \geq 0$ . Dans la suite, on notera  $S_n^+$  l'ensemble des matrices réelles positives d'ordre  $n$ .

1. Montrer que si  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , la matrice  ${}^tMM$  est symétrique et positive.
2. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice symétrique.
  - 2-1. Montrer que  $A$  est positive si et seulement si ses valeurs propres sont positives.
  - 2-2. Si  $A$  est positive, que peut-on dire de sa trace ? Si en plus  $A$  est inversible, que peut-on dire de ses valeurs propres ?
3. Soit  $A \in S_n^+$ . En diagonalisant convenablement la matrice  $A$ , construire une matrice  $B \in S_n^+$  telle que  $B^2 = A$ . Que peut-on dire de  $B$  si  $A$  est inversible ?
4. **Applications :** Soient  $A$  et  $C$  deux matrices symétriques éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
  - 4-1. Montrer que si  $R$  et  $Q$  sont deux éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  alors  $\text{Tr}(RQ) = \text{Tr}(QR)$ .
  - 4-2. Si  $A$  et  $C$  sont positives, soit  $B \in S_n^+$  tel que  $B^2 = A$  ; Montrer que  $BCB \in S_n^+$  et en déduire que  $\text{Tr}(AC) \geq 0$ .
  - 4-3. On suppose que  $A$  est positive et inversible ; montrer que la matrice  $AC$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Justifier par un contre-exemple que ce résultat peut être faux si l'on suppose seulement  $A$  positive.

FIN DE L'ÉPREUVE