

e3a 2017 - PSI2

Dans tout le problème, on se donne $n \geq 2$ un entier et on note

- $\mathcal{E} = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients réels
- O_n la matrice nulle de \mathcal{E} et I_n la matrice identité
- tA la transposée d'un élément de \mathcal{E}
- $E_{i,j} \in \mathcal{E}$ la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la ligne i et de la colonne j
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de \mathcal{E}
- \mathcal{N} l'ensemble des matrices **nilpotentes** de \mathcal{E} , c'est à dire des $A \in \mathcal{E}$ telles qu'il existe un entier p avec $A^p = O_n$.

Questions de cours

1. Quelle est la dimension de \mathcal{E} ? En donner sans justification une base.
2. Soient $i, j, k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$. calculer le produit des matrices $E_{i,j}$ et $E_{k,\ell}$. On montrera en particulier que ce produit est nul lorsque $j \neq k$.
3. Enoncer le théorème de Cayley-Hamilton.
4. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}) soit trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1 Propriétés élémentaires

Soit A un élément de \mathcal{N}

1. La matrice A peut-elle être inversible? Justifier votre réponse.
2. On note $\text{Sp}(A)$ le spectre de A , c'est à dire l'ensemble des valeurs propres complexes de la matrice A . Déterminer $\text{Sp}(A)$ et donner le polynôme caractéristique de A .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.
4. Montrer que le sous-espace vectoriel de \mathcal{E} engendré par A , noté $\text{Vect}(A)$, est inclus dans \mathcal{N} .
5. Vérifier que ${}^tA \in \mathcal{N}$.
6. Montrer que si M est semblable à A , alors $M \in \mathcal{A}$.
7. Montrer que $A^n = O_n$.
8. En déduire qu'une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{E}$ soit nilpotente est que $M^n = O_n$.
On pourra admettre ce résultat et l'utiliser dans la suite du problème.
9. Montrer que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Quel est le rang maximal de A ?
10. Soient $B, C \in \mathcal{E}$.
 - (a) On suppose que $BC \in \mathcal{N}$. Prouver alors que $CB \in \mathcal{N}$.
 - (b) Ici, on suppose de plus que $B \in \mathcal{N}$ et $AB = BA$. Montrer que $AB \in \mathcal{N}$ et que $A + B \in \mathcal{N}$.
11. Déterminer l'ensemble de toutes les matrices symétriques réelles appartenant à \mathcal{N} .
12. **Dans cette question** on suppose que la matrice nilpotente A est antisymétrique.
 - (a) Prouver que $A^2 = O_n$.
 - (b) En déduire l'ensemble de toutes les matrices antisymétriques appartenant à \mathcal{N} (on pourra utiliser la trace).

2 Exemples

Dans cette partie, M est une matrice de \mathcal{E} .

1. **Dans cette question**, on prend $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{E}$ définie par : $\forall (i,j) \in [[1,n]]^2$, $m_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \geq j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$, c'est à dire

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Déterminer les éléments propres (valeurs propres et sous-espaces propres) de la matrice M .
 - (b) On pose $S = M + {}^tM$. A-t-on $S \in \mathcal{N}$?
Montrer que $S^2 \in \text{Vect}(I_n, S)$. Déterminer alors les éléments propres de la matrice S .
 - (c) \mathcal{N} est-il un sous-espace vectoriel de \mathcal{N} ?
2. **Dans cette question on prend $n = 2$.**
 - (a) On suppose que M est de rang 1.
Montrer que $M^2 = \text{tr}(M)M$. En déduire que M est diagonalisable ou nilpotente.
 - (b) Déterminer une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont la diagonale n'est pas identiquement nulle.
 - (c) En déduire l'ensemble de toutes les matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

3 Sous-espace engendré par \mathcal{N}

Soient

- T_0 le sous-espace vectoriel de \mathcal{E} constitué des matrices de trace nulle
- V le sous-espace de \mathcal{E} engendré par \mathcal{N} : $V = \text{Vect}(\mathcal{N})$, c'est à dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires (finies) d'éléments de \mathcal{N} .

1. Déterminer la dimension de T_0 .
2. Prouver que \mathcal{N} et V sont inclus dans T_0 .
3. Pour tout $j \in [[2,n]]$, on note

$$F_j = E_{1,1} + E_{1,j} - E_{j,1} - E_{j,j} \quad \text{et} \quad G_j = F_j - E_{1,j} + E_{j,1}$$

- (a) Calculer F_j^2 .
- (b) Montrer que $G_j \in V$
- (c) Soit \mathcal{F} la famille de \mathcal{E} constituée des $E_{i,j}$ avec $i \neq j$ et $i, j \in [[1,n]]$ et de toutes les matrices G_k pour $k \in [[2,n]]$.
Montrer que la famille \mathcal{F} est libre dans V .
- (d) En déduire que $V = T_0$.

4 Sous-espaces de dimension maximale contenus dans \mathcal{N}

On note \mathcal{T}_1 le sous-espace vectoriel de \mathcal{E} constitué des matrices triangulaires supérieures dont la diagonale est composée uniquement de 0.

1. Déterminer la dimension de \mathcal{T}_1 .

2. Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de \mathcal{T}_1 . On pourra utiliser les résultats de la partie 1.
3. Démontrer que $\mathcal{E} = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}_1$.
4. Soit F un sous-espace vectoriel de \mathcal{E} contenu dans \mathcal{N} dont la dimension est notée d .
 - (a) On suppose que $d > \frac{n(n-1)}{2}$. Démontrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$. Conclure.
 - (b) Quelle est la dimension maximale d'un sous-espace de \mathcal{E} contenu dans \mathcal{N} ? Donner un exemple de tel sous-espace.

5 Un peu de topologie

\mathcal{E} est muni de sa structure d'espace vectoriel normé de dimension finie.

1. Montrer que \mathcal{N} est une partie fermée de \mathcal{E} .
2. Soient $A \in \mathcal{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $M = I_n + \alpha A$.
Montrer que $\det(M) = 1$. En déduire que toute boule ouverte de centre A contient au moins une matrice de rang n puis que l'intérieur de \mathcal{N} est vide.
3. Soit F un sous-espace de \mathcal{E} . Montrer que si l'intérieur de F est non vide, alors $F = \mathcal{E}$.
Retrouver alors le résultat de la question précédente.

6 Deux autres résultats

Soient $A \in \mathcal{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $M = I_n + \alpha A$.

1. On sait que M est inversible. Calculer son inverse à l'aide des puissances de la matrice A . On pourra utiliser une suite géométrique.
2. Donner sans démonstration le développement en série entière de la fonction $x \mapsto (1+x)^{1/2}$.
3. Montrer qu'il existe une matrice $B \in \mathcal{E}$ telle que $B^2 = M$. On exprimera B comme un polynôme de la matrice A .