



1. إحداثيات نقطة بالنسبة لمعلم - إحداثيات متجهة بالنسبة لأساس:

01. الأساس و المعلم فى الفضاء:

1. نشاط:

أنشئ في الفضاء ثلاث متجهات \vec{i} و \vec{j} و \vec{k} غير مستوائية انطلاق من نقطة O معلومة ثم أنشئ المستقيمت $D_1(O, \vec{i})$; $D_2(O, \vec{j})$ و $D_3(O, \vec{k})$.

2. مفردات:

المثلوث $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ يسمى أساس في الفضاء.

المربع $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ يسمى معلم في الفضاء.

نقول إن الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ أو أيضا : الفضاء (\mathcal{E}) مزود بالمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.


02. إحداثيات نقطة بالنسبة لمعلم - إحداثيات متجهة بالنسبة لأساس:

1. نشاط:

نعتبر الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

لنعتبر المستقيم $D_3(O, \vec{k})$ و المستوى $P(O, \vec{i}, \vec{j})$ (المر من O و الموجه ب \vec{i} و \vec{j}).

نريد أن نبين عن ما يلي : لكل نقطة M من الفضاء يوجد مثلوث وحيد (x, y, z) من \mathbb{R}^3 حيث : $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.



لتكن M نقطة من (\mathcal{E}) .

لنعتبر النقطتين M_3 و M' التي تحقق ما يلي :

(أنظر الشكل)

• M_3 المسقط ل M على المستقيم $D_3(O, \vec{k})$ بتوازي مع المستوى $P(O, \vec{i}, \vec{j})$.

• M' المسقط ل M على $P(O, \vec{i}, \vec{j})$ بتوازي مع $D_3(O, \vec{k})$.

1. ماذا يمكن أن نقول عن استقامية \vec{k} و \vec{OM}_3 ثم أعط تعبير متجهي لذلك.

2. ماذا يمكن أن نقول عن استوائية المتجهات \vec{i} و \vec{j} و \vec{OM}' ثم استنتج كتابة ل \vec{OM}' .

3. من خلال العلاقة : $\vec{OM} = \vec{OM}' + \vec{M'M}$ استنتج كتابة ل \vec{OM} بدلالة \vec{i} و \vec{j} و \vec{k} .

4. نبين أن هذه الكتابة وحيدة : (نفترض هناك كتبتين ل \vec{OM} نضع $\vec{OM} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$)

نبين أن : $x = x'$ و $y = y'$ و $z = z'$.

5. أعط الخاصية :

**2. مفردات:**

- العدد x يسمى أفصول النقطة M بالنسبة للمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
- العدد y يسمى أرتوب النقطة M بالنسبة للمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
- العدد z يسمى أنسوب النقطة M بالنسبة للمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

3. تعريف و خاصة :


- لكل نقطة M من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ يوجد مثلوث وحيد (x, y, z) من \mathbb{R}^3 حيث: $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- المثلوث (x, y, z) يسمى إحداثيات النقطة M بالنسبة للمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نكتب $M(x, y, z)$ أو أيضا: $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.
- المثلوث (x, y, z) يمثل كذلك إحداثيات المتجهة $\vec{u} = \vec{OM}$ بالنسبة للإساس $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ و نكتب $\vec{u}(x, y, z)$ أو أيضا $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

4. كتابة :

- $M(x, y, z) \Leftrightarrow \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- $\vec{OM}(x, y, z) \Leftrightarrow \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

5. مثال:

- $A(1, 2, 3)$ يعني أن $\vec{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$. أنشئ A .

**03. إحداثيات $\vec{u} + \vec{v}$ و $\alpha \cdot \vec{u}$ و \vec{AB} - إحداثيات منتصف قطعة****1. خاصة :**

نعتبر الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. α من \mathbb{R} . $\vec{u}(x, y, z)$, $\vec{v}(x', y', z')$ متجهتان من الفضاء (\mathcal{E}) .

$A(a, b, c)$, $B(a', b', c')$ نقطتين من الفضاء (\mathcal{E}) . $I(a_1, b_1, c_1)$ منتصف $[AB]$ لدينا:

$$(1) \quad \alpha \cdot \vec{u}(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot z) \quad \text{و} \quad (\vec{u} + \vec{v})(x + x', y + y', z + z')$$

$$(2) \quad \vec{AB}(a' - a, b' - b, c' - c)$$

$$(3) \quad I \left(\frac{a' + a}{2}, \frac{b' + b}{2}, \frac{c' + c}{2} \right)$$

جواب :

(1) نبين أن :
لدينا :



$$\vec{u} + \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) + (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k})$$

$$= (x+x')\vec{i} + (y+y')\vec{j} + (z+z')\vec{k} \quad (\text{الجمع في مجموعة المتجهات تبادلي})$$

$$= (x+x')\vec{i} + (y+y')\vec{j} + (z+z')\vec{k} \quad (\text{حسب موضوعات الفضاء (درس متجهات الفضاء)})$$

خلاصة : إحداثيات المتجهة $\vec{u} + \vec{v}$ هو المثلث $(x+x', y+y', z+z')$. نكتب : $(\vec{u} + \vec{v})(x+x', y+y', z+z')$.

نبين أن : $\alpha \cdot \vec{u}(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot z)$

$$\alpha \cdot \vec{u} = \alpha \cdot (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$$

$$= \alpha(x\vec{i}) + \alpha(y\vec{j}) + \alpha(z\vec{k}) \quad (\text{حسب موضوعات الفضاء (درس متجهات الفضاء)})$$

$$= (\alpha x)\vec{i} + (\alpha y)\vec{j} + (\alpha z)\vec{k} \quad (\text{حسب موضوعات الفضاء (درس متجهات الفضاء)})$$

خلاصة : إحداثيات المتجهة $\alpha \vec{u}$ هو المثلث $(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot z)$ نكتب : $\alpha \cdot \vec{u}(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot z)$

(2) إحداثيات \vec{AB}

نضع : $A(x_A, y_A, z_A)$ و $B(x_B, y_B, z_B)$

لدينا :

$$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (x_B\vec{i} + y_B\vec{j} + z_B\vec{k}) - (x_A\vec{i} + y_A\vec{j} + z_A\vec{k}) = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$$

خلاصة : $\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

2. مثال :

مثال 1 : $A(1, 2, 3)$ و $B(-2, 4, 5)$.

• إحداثيات $\vec{AB}(-2-1, 4-2, 5-3) = \vec{AB}(-3, 2, 2)$

• منتصف القطعة $[AB]$ $I\left(\frac{-2+1}{2}, \frac{4+2}{2}, \frac{5+3}{2}\right) = I\left(\frac{-1}{2}, 3, 4\right)$

• $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ و $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$ و $\vec{w}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \vec{w}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = (\vec{u} + \vec{w})\begin{pmatrix} 2+1 \\ 3-2 \\ -5+7 \end{pmatrix} = (\vec{u} + \vec{w})\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad \vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = 2\vec{u}$$

مثال 2 :

الفضاء منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نعتبر المتوازي المستطيلات

القائم ABCDEFGH التالي (أنظر الشكل).

حدد إحداثيات رؤوس المتوازي المستطيلات القائم ABCDEFGH.


لدينا :

$A(2, 0, 0)$ و $B(2, 2, 0)$ و $C(0, 2, 0)$ و $D(0, 0, 0)$

و $F(2, 2, 3)$ و $G(0, 2, 3)$ و $H(0, 0, 3)$

II. محددة ثلاث متجهات :

01. شرط استقامة متجهتين :



**1. خاصية 1 :**

$\vec{u}(x,y,z)$, $\vec{v}(x',y',z')$ متجهتان من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$.
 \vec{v} و \vec{u} مستقيمتان يكافئ وجود α من \mathbb{R} حيث: $\vec{u} = \alpha\vec{v}$ أو $\vec{v} = \alpha\vec{u}$

2. تعريف و خاصية:

- $\vec{u}(x,y,z)$, $\vec{v}(x',y',z')$ متجهتان من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$. **المحددات التالية :**
- $\Delta_z = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$, $\Delta_y = \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} = xz' - zx'$, $\Delta_x = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} = yz' - zy'$ تسمى **المحددات المستخرجة ل \vec{u} و \vec{v}** .
- \vec{v} و \vec{u} مستقيمتان يكافئ $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$

3. مثال :

هل المتجهتان $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ مستقيمتان ؟ لدينا : $\Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ إذن $\Delta_x \neq 0$ ومنه \vec{u} و \vec{v} غير مستقيمتين .

02. محددة ثلاث متجهات:**1. تعريف :**

$\vec{u}(x,y,z)$, $\vec{v}(x',y',z')$ و $\vec{w}(x'',y'',z'')$ ثلاث متجهات من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix}$$

العدد :

$$= (xy'z'' - xz'y'') + (-yx'z'' + yz'x'') + (zx'y'' - zy'x'')$$

يسمى محددة المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} في هذا الترتيب .

2. مثال:

احسب $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ مع $\vec{u}(1,2,3)$, $\vec{v}(-2,0,1)$ و $\vec{w}(1,0,3)$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 2 \times (-7) + 3 \times 0 = 14$$

لدينا : $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 14$

خلاصة : $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 14$

03. متجهات مستوائية:**1. خاصية:**

$\vec{u}(x,y,z)$, $\vec{v}(x',y',z')$ و $\vec{w}(x'',y'',z'')$ ثلاث متجهات من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$.
 \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} مستوائية $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$

**2. مثال :**

نأخذ المثال السابق أدرس استوائية \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} .
بما أن : $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 14$ إذن $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$ وبالتالي \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} غير مستوائية .

خلاصة : \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} غير مستوائية .

III. تمثيل بارامترى لمستقيم:**01. تمثيل بارامترى لمستقيم:****1. نشاط :**

نعتبر الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. $\vec{u}(a, b, c)$ متجهة غير منعدمة من (\mathcal{E}) و $A(x_0, y_0, z_0)$ نقطة من (\mathcal{E}) .
نعتبر نقطة $M(x, y, z)$ من (\mathcal{E}) . أوجد تكافئ يكتب x و y و z بدلالة a, b, c, x_0, y_0, z_0 .
جواب :

$$M(x, y, z) \in D(A, \vec{u}) \Leftrightarrow \overline{AM} = t\vec{u}, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow t \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

لدينا : (المتجهتان \overline{AM} و \vec{u} مستقيمتان)

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \overline{AM} = t\vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

2. مفردات :

الكتابة المحصل عليها تسمى تمثيل بارامترى للمستقيم $D(A, \vec{u})$.

3. تعريف :

$$\text{النظمة : } t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \text{ تسمى تمثيل بارامترى للمستقيم } D\left(A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) \text{ من الفضاء } (\mathcal{E}) .$$

4. ملحوظة :

- لكل قيمة للوسيط t يوافق نقطة وحيدة و العكس صحيح . (مثلا $k = 0$ يوافق (أو يمثل) النقطة A)
- تمثيل بارامترى لمستقيم ليس بوحيد (هناك مالانهاية)

5. مثال :

الفضاء منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

$$D(A, \vec{u}) : \begin{cases} x = 2t \\ y = 5 + t \\ z = -4 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ هو : } D(A(0, 5, -4), \vec{u}(2, 1, -3))$$

- ندرس هل النقطة $B(-2, 4, -1)$ تنتمي إلى D

لدينا :



• (BG) و (HE) غير مستوائيين .

2. خاصية :

- $D(A, \vec{u})$ و $D'(B, \vec{v})$ مستقيمان من الفضاء (E) .
- $(D') = (D) \Leftrightarrow \vec{u}$ و \vec{v} مستقيمان و لهما نقطة مشتركة.
- (D) و (D') متوازيان قطعاً $\Leftrightarrow \vec{u}$ و \vec{v} مستقيمان و ليس لهما نقطة مشتركة.
- $(D') \cap (D) = \{I\} \Leftrightarrow \vec{u}$ و \vec{v} غير مستقيمين و $I \in (D') \cap (D)$.
- (D) و (D') غير مستوائيين $\Leftrightarrow \vec{u}$ و \vec{v} غير مستقيمين و ليس لهما نقطة مشتركة.

3. ملحوظة :

- $D(A, \vec{u})$ و $D'(B, \vec{v})$ غير مستوائيين $\Leftrightarrow \vec{u}$ و \vec{v} و \overline{AB} غير مستوائية .
- أو أيضا $D(A, \vec{u})$ و $D'(B, \vec{v})$ غير مستوائيين $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}, \overline{AB}) \neq 0$

4. مثال :

هل $D(A(0,5,-4), \vec{u}(0,1,2))$ و D' متوازيين حيث تمثيل بارامترى لـ D' هو كالتالي ؟ $t \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = -1 \\ y = -5 - 2t \\ z = 1 - 4t \end{cases}$

IV. تمثيل بارامترى لمستوى - معادلة ديكارتية لمستوى :

01. تمثيل بارامترى لمستوى :

1. نشاط :

$\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ متجهتان غير مستقيمتين من الفضاء منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ و $A(x_0, y_0, z_0)$ نقطة معلومة من الفضاء (E). نعتبر المستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$.

(1) ما هو الشرط الضروري والكافي الذي تحققه النقطة $M(x, y, z)$ لكي تنتمي إلى المستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ ؟

(2) أتمم العبارة التالية : $M(x, y, z) \in P(A, \vec{u}, \vec{v})$ مستعملا تكافؤات متتالية من أجل كتابة x و y و z بدلالة a , c , b , a' , c' , b' , z₀ , y₀ , x₀ , c' , b'

جواب :

(1) الشرط الضروري والكافي الذي تحققه النقطة $M(x, y, z)$ لكي تنتمي إلى المستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ هو :

المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \overline{AM} مستوائية .

(2) نتمم العبارة التالية : $M(x, y, z) \in P(A, \vec{u}, \vec{v})$ مستعملا التكافؤات المتتالية :

لدينا :

$$M(x, y, z) \in P(A, \vec{u}, \vec{v}) \Leftrightarrow (\vec{u} \text{ و } \vec{v} \text{ و } \overline{AM} \text{ مستوائية})$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} ; \overline{AM} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} ; \begin{cases} x = x_0 + \alpha a + a' \beta \\ y = y_0 + \alpha a + b' \beta \\ z = z_0 + \alpha a + c' \beta \end{cases}$$



2. تعريف:

$$\text{النظمة : } \alpha, \beta \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = x_0 + a\alpha + a'\beta \\ y = y_0 + b\alpha + b'\beta \\ z = z_0 + c\alpha + c'\beta \end{cases} \text{ تسمى تمثيل بارامترى للمستوى } P \left(A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} \right) \text{ من الفضاء } (\mathcal{E}) .$$

3. ملحوظة :

- لكل قيمة للوسيط α ثم للوسيط β يوافق نقطة وحيدة و العكس صحيح . (مثلا $\alpha = 0$ و $\beta = 0$ يوافق (أو يمثل) النقطة A)
- تمثيل بارامترى لمستوى ليس بوحيد (هناك ما لانهاية) .

4. مثال : الفضاء (E) منسوب إلى معلم (O; i; j; k)

$$P(A, \vec{u}, \vec{v}) : \begin{cases} x = 1 + 3\alpha + 2\beta \\ y = -2 + 5\alpha - 4\beta \\ z = 7 + 9\beta \end{cases} ; \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ هو } P \left(A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 9 \end{pmatrix} \right)$$

- ندرس هل النقطة $B(5, 12, -2)$ تنتمي إلى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ لدينا :

$$B(5, 12, -2) \in D \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} / \begin{cases} 5 = 1 + 3\alpha + 2\beta \\ 12 = -2 + 5\alpha - 4\beta \\ -2 = 7 + 9\beta \end{cases} \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} / \begin{cases} 5 = 1 + 3\alpha + 2\beta \\ 12 = -2 + 5\alpha - 4\beta \\ -9 = 9\beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} / \begin{cases} 5 = 1 + 3\alpha - 2 \\ 12 = -2 + 5\alpha + 4 \\ \beta = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} / \begin{cases} \alpha = 2 \\ \alpha = 2 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

خلاصة : $B(5, 12, -2) \in D$.

02. معادلة ديكارتية لمستوى:

$$1. \text{ نشاط : هل هناك طريقة أخرى لشرط الذي تحققه النقطة } M(x, y, z) \text{ لكي تنتمي إلى المستوى } P \left(A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} \right) ?$$

جواب : نعم هناك طريقة أخرى :

$$M(x, y, z) \in P(A, \vec{u}, \vec{v}) \Leftrightarrow (\vec{AM} \text{ و } \vec{v} \text{ و } \vec{u} \text{ مستوانية})$$

لدينا :

$$\Leftrightarrow \det(\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & a' & a'' \\ y - y_0 & b' & b'' \\ z - z_0 & c' & c'' \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0) \begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - (y - y_0) \begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x\Delta_x - y\Delta_y + z\Delta_z + (-x_0\Delta_x + y_0\Delta_y - z_0\Delta_z) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + b\Delta_y + c\Delta_z + d = 0$$

مع : $a = \Delta_x = b'c'' - c'b''$ و $b = \Delta_y = a'c'' - c'a''$ و $c = \Delta_z = a'b'' - b'a''$ و $d = -x_0\Delta_x + y_0\Delta_y - z_0\Delta_z$



2. مفردات : المعادلة المحصل عليها : $ax+by+cz+d=0$ تسمى معادلة ديكارتية للمستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$.

3. تعريف وخاصية :

$\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ متجهتان غير مستقيمتين من الفضاء (\mathcal{E}) منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ و نقطة $A(x_0, y_0, z_0)$ معلومة من الفضاء (\mathcal{E}) . نعتبر المستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$. لدينا :

المعادلة : $(x-x_0)\Delta_x - (y-y_0)\Delta_y + (z-z_0)\Delta_z = 0$ تسمى معادلة ديكارتية للمستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ مع Δ_x و Δ_y و Δ_z هي المحددات المستخرجة ل \vec{u} و \vec{v} .

وهذه المعادلة تكتب باختصار: $P(A, \vec{u}, \vec{v}) : ax+by+cz+d=0$ مع a و b و c و d من \mathbb{R} و $(a,b,c) \neq (0,0,0)$

4. ملحوظة :


المحددات المستخرجة $\Delta_x = \begin{vmatrix} a' & b' \\ c' & c' \end{vmatrix}$ و $\Delta_y = \begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix}$ و $\Delta_z = \begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}$ على الأقل واحدة منها غير منعدمة .

الأعداد a و b و c على الأقل واحدة منها غير منعدمة في المعادلة الديكارتية : $P(A, \vec{u}, \vec{v}) : ax+by+cz+d=0$

03. الأوضاع النسبية لمستويين :

1. نشاط : الفضاء منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

1. من خلال المستويات P و P_1 و Q استنتج الأوضاع النسبية الممكنة لمستويين في الفضاء . أعط الخاصية لكل حالة .



4. مفردات :

- (P) و (ABC) منطبقان إذن : (P) = (ABC) كذلك نقول إن : (P) و (ABC) متوازيان ونكتب : (P) || (P').
- (P) و (P₁) متوازيان قطعاً إذن: (P) ∩ (P₁) = ∅ نكتب : (P) || (P').
- (P) يقطع (Q) تبعا للمستقيم (KL) نكتب : (P) ∩ (P) = (KL)

2. خاصية :

(P) : ax+by+cz+d=0 و (P') : مستويان من الفضاء (E) : a'x+b'y+c'z+d'=0 .

- (P) و (P') منطبقان ((P') = (P)) ⇔ a' = ka و b' = kb و c' = kc و d' = kd و k ≠ 0 .
- (P) و (P') متوازيان قطعاً ((P') ∩ (P) = ∅) ⇔ a' = ka و b' = kb و c' = kc و d' ≠ kd .
- (P) و (P') متقاطعان ((P') ∩ (P) = (D)) ⇔ $\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ غير مستقيمتين.

3. ملحوظة :

مع العلم أن : (a,b,c) ≠ (0,0,0) و (a',b',c') ≠ (0,0,0)

- P(A, \vec{u} , \vec{v}) و P(B, \vec{u}' , \vec{v}') متوازيان يكافئ المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{u}' و \vec{v}' مستوائية وكذلك \vec{u} و \vec{v} و \vec{v}' مستوائية .
- أو أيضا : P(A, \vec{u} , \vec{v}) و P(B, \vec{u}' , \vec{v}') متقاطعان يكافئ $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}') \neq 0$ أو $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}') \neq 0$ (على الأقل إحدهما ≠ 0)

4. مثال :V. معادلتان ديكارتيتان لمستقيم :01. معادلتان ديكارتيتان لمستقيم :I. نشاط : من خلال التمثيل بارامترى لمستقيم.

- نأخذ a و b و c غير منعدمة أوجد قيمة t بدلالة a , b , c , x₀ , y₀ , z₀
- نأخذ a و b و c أحدهما على الأقل منعدم مثلا a = 0 . أوجد قيمة t بدلالة a , b , c , x₀ , y₀ , z₀

2. مفردات :

المعادلتين تسمى معادلتين ديكارتيتين للمستقيم D(A, \vec{u})

3. تعريف و خاصية :


D(A, \vec{u}) مستقيم من الفضاء (E) مع $\vec{u}(a,b,c)$ و A(x₀, y₀, z₀) نقطة من (E).

$$D(A, \vec{u}) \text{ مع } t \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

- a و b و c غير منعدمة : $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ ⇔ M(x,y,z) ∈ D(A, \vec{u})
- a و b و c أحدهما على الأقل منعدم مثلا a = 0 : $\frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ و x = x₀ ⇔ M(x,y,z) ∈ D(A, \vec{u})
- الكتابة السابقة تسمى معادلتين ديكارتيتين للمستقيم D(A, \vec{u}) أو أيضا نظمة معادلتين ديكارتيتين للمستقيم D(A, \vec{u}).

02. الأوضاع النسبية لمستقيم و مستوى:**1. نشاط:**

1. ما هي الأوضاع النسبية للمستقيم $D(A, \vec{u})$ و المستوى $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ من الفضاء ؟
2. أعط الخاصية لكل حالة .

**2. مفردات:**

- $(D_2) \subset (P)$ ونكتب $(D_2) \cap (P) = (D_2)$ ومنه $(D_2) \subset (P)$
- $(D_1) \cap (P) = \emptyset$ ونكتب $(D_1) \parallel (P)$ ومنه $(D_1) \cap (P) = \emptyset$
- $(D) \cap (P) = \{K\}$ ونكتب $(D) \cap (P) = \{K\}$ ومنه $(D) \cap (P) = \{K\}$

2. خاصية:

$D(B, \vec{w})$ مستقيم من الفضاء (E) و $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ مستوى من الفضاء (E) .

- (D) ضمن (P) يكافئ المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} مستوائية و $B \in (P)$. (أو أيضا $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ و $B \in (P)$)
- (D) خارج (P) يكافئ المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} مستوائية و $B \notin (P)$. (أو أيضا $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ و $B \notin (P)$)
- (D) يخترق (P) يكافئ المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} غير مستوائية . (أو أيضا $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$)

3. ملحوظة:

- بالنسبة ل (D) خارج (P) يجب نقطة من (D) لا تنتمي إلى (P) .
- أما نقطة من (P) لا تنتمي إلى (D) لا يعني بالضرورة أن (D) خارج (P) يمكن أن يكون (D) ضمن (P) .