


## تحليلية الفضاء

إحداثيات نقطة بالنسبة لمعلم-إحداثيات متوجهة بالنسبة لأساس

إذا كانت  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  و  $\vec{k}$  ثلاثة متغيرات غير مستوانيات و  $O$  نقطة من الفضاء .  
نقول إن المثلث  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  أساساً للفضاء و أن المربوّع  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  معلم للفضاء



ليكن  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  معلماً في الفضاء و لتكن  $M$  نقطة من الفضاء  
 $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$   $\diamond$   
 المثلث  $(x, y, z)$  يسمى إحداثيات  $M$  بالنسبة للمعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  و نكتب  $M(x, y, z)$   
 $x$  يسمى أقصى النقطة  $M$   
 $y$  يسمى أرتب النقطة  $M$   
 $z$  يسمى أنسوب النقطة  $M$

$\diamond$  لكل متوجهة  $\vec{u}$  من الفضاء توجد ثلاثة أعداد  $x$  و  $y$  و  $z$  حيث

لتكن  $\alpha \in \mathbb{R}$  و  $\vec{v}(x', y', z')$  و  $\vec{u}(x, y, z)$  متجهتين من الفضاء المنسوب إلى أساس  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  ولتكن

$$\left. \begin{array}{l} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{array} \right\} \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v} \quad \blacksquare$$

- مجموع المتجهتين  $\vec{u} + \vec{v}(x+x', y+y', z+z')$  هو المتجهة :
- ضرب عدد في متجهة :  $\alpha \vec{u}(\alpha x, \alpha y, \alpha z)$

لتكن  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  نقطتين من الفضاء المنسوب إلى معلم  $B(x_B, y_B, z_B)$  و  $A(x_A, y_A, z_A)$  و  $I$  منتصف القطعة  $[AB]$  ، لدينا :

► إحداثيات المتجهة  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) : \overrightarrow{AB}$

► إحداثيات  $I$  منتصف القطعة  $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) : [AB]$

### شرط استقامية متجهتين

لتكن  $\vec{v}(x', y', z')$  و  $\vec{u}(x, y, z)$  متجهتين من الفضاء.

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} = 0 \text{ و } \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} = 0 \text{ و } \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ و } \vec{v} \text{ مستقيمتان} \quad \diamond$$

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \neq 0 \text{ أو } \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \neq 0 \text{ أو } \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ و } \vec{v} \text{ غير مستقيمتين} \quad \diamond$$

### المتجهات المستوانية


لتكن  $(\vec{u}(x, y, z), \vec{v}(x', y', z'), \vec{w}(x'', y'', z'')$  ثلث متجهات من الفضاء.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ مستوانية} \quad \diamond$$

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ غير مستوانية} \quad \diamond$$

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix} : \text{حيث}$$

### تمثيل بارامטרי لمستقيم



الفضاء منسوب إلى معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

لتكن  $A(x_A, y_A, z_A)$  نقطة من الفضاء و  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$  متجهة غير منعدمة.

$$(t \in \mathbb{R}) \quad \overrightarrow{AM} = t \vec{u} \Leftrightarrow M \in (D)$$

تسمى تمثيلاً بارامترياً للمستقيم  $(D)$  المار من  $A(x_A, y_A, z_A)$  و الموجه

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

بالمتجهة  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$

### معادلتان ديكارتيتان لمستقيم في الفضاء

الفضاء منسوب إلى معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

إذا كان  $(D)$  مستقيماً ماراً من النقطة  $A(x_A, y_A, z_A)$  و  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$  متجهة موجهة له فإن النظمة :

$$\frac{x - x_A}{\alpha} = \frac{y - y_A}{\beta} = \frac{z - z_A}{\gamma} \quad (\text{مع } \alpha \neq 0 \text{ و } \beta \neq 0 \text{ و } \gamma \neq 0)$$

### تمثيل بارامטרי لمستوى

الفضاء منسوب إلى معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

لتكن  $A(x_A, y_A, z_A)$  نقطة من الفضاء و  $\vec{u}'(\alpha', \beta', \gamma')$  و  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$  متوجهين غير منعدمتين  $((t, t') \in \mathbb{R}^2)$   $\overrightarrow{AM} = t \vec{u} + t' \vec{u}' \Leftrightarrow M \in (P)$


النقطة  $M$  تسمى تمثيلاً بارامetricاً للمستوى  $(P)$  المار من  $A$  و الموجه بالمتوجهين  $\vec{u}'(\alpha', \beta', \gamma')$  و  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$   $\begin{cases} x = x_A + t\alpha + t'\alpha' \\ y = y_A + t\beta + t'\beta' \\ z = z_A + t\gamma + t'\gamma' \end{cases} ((t, t') \in \mathbb{R}^2)$

### معادلة ديكارتية لمستوى

الفضاء منسوب إلى معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

ليكن  $(P)$  مستوى المار من النقطة  $A(x_A, y_A, z_A)$  و الموجه بالمتوجهين  $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$  و  $\vec{v}(\alpha', \beta', \gamma')$

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow M(x, y, z) \in (P)$$



معادلة ديكارتية للمستوى  $(P)$  تكتب على شكل  $(ax + by + cz + d = 0)$   $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

### الأوضاع النسبية لل المستقيمات و المستويات في الفضاء

#### الأوضاع النسبية ل المستقيمين في الفضاء

- ليكن  $(\Delta) = D(\vec{B}, \vec{v})$  و  $(D) = D(\vec{A}, \vec{u})$  مستقيمين في الفضاء
- إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستقيمتين و  $B \in (\Delta)$  أو  $A \in (\Delta)$  فإن  $(D) = (\Delta)$
  - إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستقيمتين و  $A \notin (\Delta)$  فإن  $(D) \neq (\Delta)$  متوازيان قطعا
  - إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  غير مستقيمتين و  $\det(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$  فإن  $(D) \neq (\Delta)$  متقاطعان
  - إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  غير مستقيمتين و  $\det(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}) \neq 0$  فإن  $(D) \neq (\Delta)$  غير مستوانيين

#### الأوضاع النسبية ل المستويين في الفضاء

- ليكن  $(P) = P(\vec{B}, \vec{u}'', \vec{v}'')$  و  $(Q) = P(\vec{A}, \vec{u}, \vec{v})$  مستويين في الفضاء
- $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}'') = 0$  و  $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}'') = 0$  إذا وفقط إذا كانت  $(P) \parallel (Q)$
  - $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}'') \neq 0$  و  $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}'') \neq 0$  إذا وفقط إذا كانت  $(P) \cap (Q) \neq \emptyset$  متقاطعان

- $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$  حيث  $(P) : ax + by + cz + d = 0$   
 $(a', b', c') \neq (0, 0, 0)$  حيث  $(Q) : a'x + b'y + c'z + d' = 0$
- $\begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \neq 0$  أو  $\begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} \neq 0$  أو  $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$  إذا وفقط إذا كانت  $(P) \parallel (Q)$  متقاطعان
  - $(P) \parallel (Q)$  متوازيان قطعا إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي غير منعدم  $\lambda$  بحيث:  
 $d' = \lambda d$  و  $a' = \lambda a$  و  $b' = \lambda b$  و  $c' = \lambda c$
  - $(P) \parallel (Q)$  منطبقين إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي غير منعدم  $\lambda$  بحيث:  
 $d' = \lambda d$  و  $a' = \lambda a$  و  $b' = \lambda b$  و  $c' = \lambda c$

**الأوضاع النسبية لمستقيم و مستوى في الفضاء**

- ليكن  $(P) = P(A, \vec{u}, \vec{v})$  مستوى في الفضاء و  $(D) = D(B, \vec{w})$  مستقيم في الفضاء
- متوازيان إذا وفقط إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  مستوانيات أي  $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$
  - متقاطعان إذا وفقط إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  غير مستوانيات أي  $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

❖ لتكن  $B(x_B, y_B, z_B)$  و  $A(x_A, y_A, z_A)$

إحداثيات المتجهة  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) : \overline{AB}$

المسافة  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2} : AB$

إحداثيات  $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) : [AB]$  منتصف القطعة

❖ لتكن  $\vec{v}(x', y', z')$  و  $\vec{u}(x, y, z)$

منظم متجهة :  $\|\vec{v}\| = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$  و  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

الجداء السلمي:  $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$

خاصية:  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$

❖ تمثيل بارامترى لمستقيم:

ليكن  $(D)$  المستقيم المار من النقطة  $A(x_A, y_A, z_A)$  و موجه بالتجهيز  $\vec{u}$  و  $\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow M(x, y, z) \in (D)$  مستقيميتان

$$(t \in \mathbb{R}) \quad \overrightarrow{AM} = t \vec{u} \Leftrightarrow$$

$$(t \in \mathbb{R}) \quad \begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{cases} \Leftrightarrow$$

النقطة الأخيرة تسمى تمثيلاً بارامترياً لمستقيم  $(D)$

❖ معادلة ديكارتية لمستوى:

ليكن  $(P)$  المستوى المار من النقطة  $A$  و المتجه  $\vec{n}(a, b, c)$  منظمية لمستوى  $(P)$

$$M(x, y, z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0$$

خاصية:

إذا كان  $(P)$  مستوى معادلته  $ax + by + cz + d = 0$  فإن  $\vec{n}(a,b,c)$  هي متجهة منتظمة لمستوى  $(P)$ .

❖ مسافة نقطة عن مستوى :

ليكن  $(P)$  مستوى معادلته  $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$  و  $ax + by + cz + d = 0$  نقطة من الفضاء

$$d(\Omega, (P)) = \frac{|ax_\Omega + by_\Omega + cz_\Omega + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

### الفلكة

أ. تعريف :

لتكن  $\Omega$  نقطة و  $r$  عدداً حقيقياً موجباً قطعاً  
مجموععة النقط  $M$  من الفضاء التي تحقق  $\Omega M = r$  تسمى الفلكة التي مركزها  $\Omega$  وشعاعها  $r$  ونرمز لها بالرمز :  $S(\Omega, r)$

ب. معادلة ديكارتية لفلكة معرفة بمركزها وشعاعها :

معادلة ديكارتية لفلكة مركزها  $\Omega(a,b,c)$  وشعاعها  $r$  هي :  

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

ج. معادلة ديكارتية لفلكة معرفة بأحد أقطارها :

لتكن  $(S)$  فلكة أحد أقطارها  $[AB]$  و  $M$  نقطة من الفضاء  
 $M \in (S) \Leftrightarrow \overline{AM} \cdot \overline{BM} = 0$

د . دراسة  $E$  مجموعة النقط التي تحقق:

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{c}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}{4} \text{ تكافيء } x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

هناك ثلاثة حالات :

$$E : \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}{4} < 0 \quad \bullet$$


$$\left\{ \Omega \left( \frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}, \frac{-c}{2} \right) \right\} : \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}{4} = 0 \quad \bullet$$

$$r = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} \quad \Omega \left( \frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}, \frac{-c}{2} \right) \text{ وشعاعها} : \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}{4} > 0 \quad \bullet$$

الأوضاع النسبية لفلكة ومستوى

لتكن  $(S)$  فلكة مركزها  $\Omega$  وشعاعها  $R$ . نضع  $(P)$

لتكن  $H$  المسقط العمودي للمركز  $\Omega$  على المستوى  $(P)$



المستوى  $(P)$  يقطع الفلكة  $(S)$  وفق دائرة  $(C)$  مركزها  $H$  وشعاعها


$$r = \sqrt{R^2 - d^2}$$

المستوى  $(P)$  مماس للفلكة  $(S)$  في النقطة  $H$

المستوى  $(P)$  لا يقطع الفلكة  $(S)$

الأوضاع النسبية لفلكة ومستقيم

لتكن  $(S)$  فلكة مركزها  $\Omega$  وشعاعها  $R$ . نضع  $d = d(\Omega, \Delta)$  .  
لتكن  $H$  المسقط العمودي للمركز  $\Omega$  على المستوى  $(\Delta)$



المستقيم $(\Delta)$ يخترق الفلكة $(S)$ في نقطتين مختلفتين	المستقيم $(\Delta)$ مماس للفلكة $(S)$ في النقطة $H$	المستقيم $(\Delta)$ و الفلكة $(S)$ لا يتقاطعان
---	---	--

### الجداء المتجهي:

أ. الصيغة التحليلية للجداء المتجهي :

$$\vec{v} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad \vec{u} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} y & z \\ z & y \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ x & z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ x & y \end{vmatrix} \vec{k}$$

إذا كان  $x, y, z \neq 0$

ب. استقامية متجهتين :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \quad \text{إذا كان } \vec{u} \text{ و } \vec{v} \text{ مستقيمتان}$$

ج. استقامية ثلاث نقاط :

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0} \quad \text{إذا كان } A, B, C \text{ مستقيمية}$$

د. معادلة ديكارتية لمستوى :

إذا كان  $\vec{0} \neq \overrightarrow{AB}$  فإن النقطة  $A$  و  $B$  و  $C$  غير مستقيمية وبالتالي فهي تحدد لنا مستوى  $(ABC)$  و المتجهة  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$  هي متجهة منظمية للمستوى  $(ABC)$  و لدينا :  $M \in (ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0$  و منه نستنتج معادلة المستوى  $(ABC)$

ملاحظة : كل مستقيم عمودي على  $(ABC)$  يكون موجها بالتجهزة  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$

هـ. مساحة مثلث - مساحة متوازي الأضلاع:

$$S_{ABC} = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{2} \text{ هي } ABC \text{ مساحة مثلث}$$

$$S_{ABCD} = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \text{ هي مساحة متوازي الأضلاع}$$

وـ. مسافة نقطة عن مستقيم :

$$d(\Omega, (D)) = \frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} \text{ هي مسافة نقطة } \Omega \text{ عن مستقيم } (D) \text{ مار من نقطة } A \text{ و موجه بتجهزة } \vec{u}$$

زـ. متوازي و تعامد مستويين :

نعتبر مستويين  $(P')$ :  $a'x + b'y + c'z + d' = 0$  و  $(P)$ :  $ax + by + cz + d = 0$

$(P')$  و  $(P)$  هما متجهتان منظمتان للمستويان  $(P)$  و  $(P')$

$\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0}$  يكافي  $(P) // (P')$

$\vec{n} \cdot \vec{n}' = \vec{0}$  يكافي  $(P) \perp (P')$

كـ. تقاطع مستويين :

إذا كان  $(P)$  و  $(P')$  متتقاطعان فإن تقاطعهما هو مستقيم موجه بالتجهزة  $\vec{n} \wedge \vec{n}'$