

œ Baccalauréat S (obligatoire) Polynésie œ
septembre 2011

EXERCICE 1

5 points

Les 300 personnes travaillant dans un immeuble de bureaux de trois niveaux ont répondu aux deux questions suivantes :

- « À quel niveau est votre bureau? »
- « Empruntez-vous l'ascenseur ou l'escalier pour vous y rendre? »

Voici les réponses :

- 225 personnes utilisent l'ascenseur et, parmi celles-ci, 50 vont au 1^{er} niveau, 75 vont au 2^e niveau et 100 vont au 3^e niveau.
- Les autres personnes utilisent l'escalier et, parmi celles-ci, un tiers va au 2^e niveau, les autres vont au 1^{er} niveau.

On choisit au hasard une personne de cette population.

On pourra considérer les évènements suivants :

- N_1 : « La personne va au premier niveau. »
- N_2 : « La personne va au deuxième niveau. »
- N_3 : « La personne va au troisième niveau. »
- E : « La personne emprunte l'escalier. »

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2.
 - a. Montrer que la probabilité que la personne aille au 2^e niveau par l'escalier est égale à $\frac{1}{12}$.
 - b. Montrer que les évènements N_1 , N_2 et N_3 sont équiprobables.
 - c. Déterminer la probabilité que la personne emprunte l'escalier sachant qu'elle va au 2^e niveau.
3. On interroge désormais 20 personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres.
On appelle X la variable aléatoire qui, aux 20 personnes interrogées, associe le nombre de personnes allant au 2^e niveau.
 - a. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
 - b. Déterminer, à 10^{-4} près, la probabilité que 5 personnes exactement aillent au 2^e niveau.
 - c. En moyenne sur les 20 personnes, combien vont au 2^e niveau?
4. Soit n un entier inférieur ou égal à 300. On interroge désormais n personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres.
Déterminer le plus petit entier n strictement positif tel que la probabilité de l'évènement « au moins une personne va au 2^e niveau » soit supérieure ou égale à 0,99.

EXERCICE 2

4 points

Partie A

On rappelle que pour tous les points E et F de l'espace, $EF^2 = \overrightarrow{EF}^2 = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EF}$.

Soient A et B deux points distincts de l'espace et I le milieu de [AB].

1. Démontrer que, pour tout point M de l'espace, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2.$$

2. Déterminer la nature de l'ensemble (E) des points M de l'espace tels que

$$MA^2 + MB^2 = AB^2.$$

Partie B

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les plans (P) et (Q) d'équations respectives : $3x + 4y + z - 1 = 0$ et $x - 2y - z + 5 = 0$ et les points A et B de coordonnées respectives $(-1 ; 0 ; 4)$ et $(3 ; -4 ; 2)$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) sont sécants.
On nomme (Δ) la droite d'intersection des plans (P) et (Q).
 - a. Montrer que le point A appartient à la droite (Δ) .
 - b. Montrer que $\vec{u}(1 ; -2 ; 5)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) .
 - c. Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite (Δ) .
2. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
Soit (E) l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA^2 + MB^2 = AB^2$.
Déterminer l'ensemble des points d'intersection de (E) et de la droite (Δ) . On précisera les coordonnées de ces points.

EXERCICE 3

5 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) . L'unité graphique est 1 cm.
On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$, $z_B = i$ et $z_C = 6 - i$.
On réalisera une figure que l'on complétera au fur et à mesure des questions.

Partie A

1. Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.
2. En déduire la nature du triangle ABC.

Partie B

On considère l'application f qui, à tout point M d'affixe z distincte de i , associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{i(z - 2 + 3i)}{z - i}$$

1. Soit D le point d'affixe $z_D = 1 - i$. Déterminer l'affixe du point D' image du point D par f .
2. a. Montrer qu'il existe un unique point, noté E, dont l'image par l'application f est le point d'affixe $2i$.
b. Démontrer que E est un point de la droite (AB).
3. Démontrer que, pour tout point M distinct du point B, $OM' = \frac{AM}{BM}$.
4. Démontrer que, pour tout point M distinct du point A et du point B, on a l'égalité :

$$\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM'}\right) = \left(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}\right) + \frac{\pi}{2} \text{ à } 2\pi \text{ près.}$$

5. Démontrer que si le point M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$ alors le point M' appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
6. Démontrer que si le point M' appartient à l'axe des imaginaires purs, privé du point B , alors le point M appartient à la droite (AB) .

EXERCICE 4**6 points****Partie A Question de cours**

Soit I un intervalle de \mathbb{R} .

Soient u et v deux fonctions continues, dérivables sur I telles que les fonctions dérivées u' et v' soient continues sur I .

Rappeler et démontrer la formule d'intégration par parties sur un intervalle $[a; b]$ de I .

Partie B

On considère les fonctions f et g définies sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = (x-1)^2 e^{-x} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{3}{2}(x-1)^2.$$

On note respectivement \mathcal{C}_1 et \mathcal{C}_2 les courbes représentatives de f et g dans le plan muni d'un repère orthonormal (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Les courbes sont tracées en annexe.

1.
 - a. Déterminer les coordonnées des points communs à \mathcal{C}_1 et \mathcal{C}_2 .
 - b. Donner les positions relatives de \mathcal{C}_1 et \mathcal{C}_2 sur \mathbb{R} .
2.
 - a. À l'aide de deux intégrations par parties successives, déterminer $\int_0^1 f(x) dx$.
 - b. Calculer, en unités d'aire, l'aire de la partie du plan limitée par les courbes \mathcal{C}_1 , \mathcal{C}_2 et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Partie C

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_n = \int_0^1 (x-1)^{2n} e^{-x} dx.$$

1.
 - a. Démontrer que, pour tout x de $[0; 1]$ et pour tout entier naturel n non nul,

$$0 \leq (x-1)^{2n} e^{-x} \leq (x-1)^{2n}.$$

- b. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{2n+1}.$$

2. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

ANNEXE

EXERCICE 4

Cette page ne sera pas à rendre avec la copie

