

∞ **Corrigé du baccalauréat ES Polynésie** ∞
13 septembre 2012


EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

On veut étudier l'évolution de l'indice du PIB y en fonction du rang de l'année x .

1. a.



b. Les points ne sont pas alignés. Un ajustement affine n'est pas approprié.

2.	Rang de l'année : $x_i, 1 \leq i \leq 8$	0	3	6	9	12	15	18	20
	$z_i = \ln y_i, 1 \leq i \leq 8$	4,61	4,88	5,15	5,42	5,69	5,97	6,24	6,42

3. La calculatrice donne : $y = 0,09x + 4,61$.

4. 2012 correspond au rang 27. Donc $z = \ln y = 0,09 \times 27 + 4,61 \approx 7,04 \iff y = e^{7,04} \approx 1141,39$.

5. On a $z = \ln y = 0,09x + 4,61$ avec $y > 0$; donc $y = e^{0,09x+4,61} = e^{0,09x} \times e^{4,61}$; or $e^{4,61} \approx 100,48$.

Enfinement $y \approx 100,48e^{0,09x}$.

EXERCICE 2

5 points

Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes

PARTIE A


- Le pourcentage de feuillus dans la récolte totale est égal à :

$$\frac{11489}{33097} \times 100 \approx 35 \%$$
- Le pourcentage de bois destiné à l'industrie parmi les conifères est égal à :

$$\frac{6805}{21608} \times 100 \approx 31 \%$$

PARTIE B

1.



La probabilité qu'un lot pris au hasard soit destiné au bois d'œuvre est de 0,585.

2. D'après la loi des probabilités totales, on a :

$$p(\bar{I}) = p(C \cap \bar{I}) + p(\bar{C} \cap \bar{I}) \iff 0,585 = p(C \cap \bar{I}) + 0,3 \times 0,55 \iff p(C \cap \bar{I}) = 0,585 - 0,165 = 0,42.$$

$$\text{Or } p(C \cap \bar{I}) = p(C) \times p_C(\bar{I}) \iff 0,42 = 0,7 \times p_C(\bar{I}) \iff p_C(\bar{I}) = \frac{0,42}{0,7} = 0,6.$$

$$\text{On a donc } p_C(I) = 1 - p_C(\bar{I}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

$$\text{Enfin } p(I \cap C) = p(C) \times p_C(I) = 0,7 \times 0,4 = 0,28.$$

3. Il faut trouver $p_I(C) = \frac{p(I \cap C)}{p(I)}$.

$$\text{Or } p(I) = p(C \cap I) + p(\bar{C} \cap I) = 0,28 + 0,135 = 0,415.$$

$$\text{Donc } p_I(C) = \frac{p(I \cap C)}{p(I)} = \frac{0,28}{0,415} \approx 0,675.$$

4. On a une épreuve de Bernoulli avec $n = 4$ et $p = 0,585$.

L'évènement contraire de « il y a au moins un lot constitué de bois d'œuvre » est l'évènement « aucun lot ne contient du bois d'œuvre », dont la probabilité est $0,415^4$. La probabilité cherchée est donc égale à :

$$1 - 0,415^4 \approx 0,970.$$

EXERCICE 2

5 points


Pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

- a. En posant A_n l'évènement « l'habitant vient faire ses courses à Commerce Plus la semaine n » et B_n l'évènement « l'habitant ne vient pas faire ses courses à Commerce Plus la semaine n », on a :

$$p_{A_n}(A_{n+1}) = 0,55 \quad ; \quad p_{A_n}(B_{n+1}) = 0,45 ;$$

$$p_{B_n}(A_{n+1}) = 0,6 \quad ; \quad p_{B_n}(B_{n+1}) = 0,4.$$

On a donc le graphe probabiliste suivant :



La matrice M vérifiant $(a_{n+1} \ b_{n+1}) = (a_n \ b_n) \times M$ est la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,45 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

2. a. $P_2 = P_1 \times M = (0,8 \ 0,2) \times \begin{pmatrix} 0,55 & 0,45 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix} = (0,56 \ 0,44).$

De même $P_3 = P_2 \times M = (0,56 \ 0,44) \times \begin{pmatrix} 0,55 & 0,45 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix} = (0,572 \ 0,428).$

b. La dernier résultat signifie que 57,2 % des habitants vont aller à Commerce Plus la troisième semaine.

3. a. Les termes de la matrice de transition M étant non nuls, donc P_n converge vers un état stable $P = (x \ y)$ (avec $x + y = 1$) ne dépendant pas de l'état initial. Cette matrice P vérifie :

$P = P \times M$ d'où le système :

$$\begin{cases} x &= 0,55x + 0,6y \\ y &= 0,45x + 0,4y \\ x + y &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0,45x - 0,6y &= 0 \\ -0,45x + 0,6y &= 0 \\ x + y &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0,45x - 0,6y &= 0 \\ x + y &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0,45x - 0,6(1-x) &= 0 \\ y &= 1-x \end{cases} \iff \begin{cases} 1,05x - 0,6 &= 0 \\ y &= 1-x \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \frac{0,6}{1,05} \\ y &= 1-x \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \frac{4}{7} \\ y &= 1-x \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \frac{4}{7} \\ y &= \frac{3}{7} \end{cases} \text{ Donc } P = \left(\frac{4}{7} \ \frac{3}{7} \right)$$

b. Le dernier résultat montre qu'à terme sur 7 clients éventuels 4 iront faire leurs courses à Commerce Plus. Ce résultat est déjà pratiquement atteint la troisième semaine, car $\frac{4}{7} \approx 0,5714 \approx 0,572.$

EXERCICE 3

4 points

Commun à tous les candidats

1. f est la somme de fonctions dérivables sur $[1 ; 6]$ et sur cet intervalle, $f'(x) = \frac{2x}{2} + \frac{4}{x} = x + \frac{4}{x} > 0$ car somme de deux termes supérieurs à zéro. La fonction f est donc strictement croissante sur $[1 ; 6]$.

2. a. $C_M(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{\frac{x^2}{2} + 4 \ln x + 5,6}{x} = \frac{x}{2} + 4 \frac{\ln x}{x} + \frac{5,6}{x}.$

b. On a $C'_M(x) = \frac{1}{2} + 4 \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln x}{x^2} - \frac{5,6}{x^2} = \frac{1}{2} + 4 \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right) - \frac{5,6}{x^2} = \frac{1}{2} + \left(\frac{-1,6 - 4 \ln x}{x^2} \right) = \frac{x^2 - 3,2 - 8 \ln x}{2x^2}.$

3. a. $f'(x) = 2x - \frac{8}{x} = \frac{2x^2 - 8}{x} = \frac{2(x^2 - 4)}{x} = \frac{2(x+2)(x-2)}{x}.$

Les trois termes : 2, $x+2$, x sont supérieurs à zéro sur $[1 ; 6]$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x-2$, d'où positif pour $x \geq 2$ et négatif ailleurs.

Conclusion : f est décroissante sur $[1 ; 2]$ puis croissante sur $[2 ; 6]$.

On a par ailleurs $f(1) = -2,2$; $f(2) = 0,8 - 8 \ln 2 \approx -4,75$ et $f(6) = 32,8 - 8 \ln 6 \approx 18,5$.

- b. Sur l'intervalle $[2 ; 6]$, la fonction f est continue car dérivable et strictement croissante de $-4,75$ à $18,5$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc un réel unique α de l'intervalle $[2 ; 6]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

La calculatrice donne $f(3) \approx -2,99$ et $f(4) \approx 1,7$, donc $3 < \alpha < 4$, puis

$f(3,6) \approx -0,49$ et $f(3,7) \approx 0,02$, d'où $3,6 < \alpha < 3,7$ et enfin

$f(3,69) \approx -0,03$ et $f(3,70) \approx 0,02$, d'où $3,69 < \alpha < 3,70$.

Au dixième près $\alpha \approx 3,7$.

- c. Les variations de f montrent que $f(x) \leq 0$ sur $[1 ; \alpha]$ et $f(x) \geq 0$ sur $[\alpha ; 6]$.

4. a. On a vu que $C'_M(x) = \frac{f(x)}{2x^2}$ et comme $2x^2 > 0$ sur $[1 ; 6]$, le signe de $C'_M(x)$ est celui de $f(x)$, donc d'après la question précédente :

$C'_M(x) < 0$ sur $[1 ; \alpha]$, soit C_M est décroissante sur cet intervalle et

$C'_M(x) > 0$ sur $[\alpha ; 6]$, soit C_M est croissante sur cet intervalle.

D'où le tableau de variation suivant :

x	1	$\alpha \approx 3,7$	6
$C'_M(x)$	-	0	+
$C_M(x)$	6,1	$\approx 4,78$	$\approx 5,13$

- b. Le coût moyen minimal de production du mètre cube de produit est d'après le tableau $C_M(\alpha) \approx 4,78$, soit environ 4 780 €.

5. On a vu que la fonction C_T est croissante sur $[1 ; 6]$: le coût maximal est donc $C_T(6) = 18 + 4 \ln 6 + 5,6 \approx 30,77$, soit environ 30 770 €.

Pour ne pas perdre d'argent il faut récupérer ces 30 770 € avec une vente minimale de $x = 1$, soit 30,77 € le mètre cube.

EXERCICE 4

7 points

Commun à tous les candidats

Partie A

Question 1 :

Graphiquement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Question 2 :

Graphiquement : la fonction décroît à partir de $x = 3$: $f'(x) < 0$ sur $]3 ; 7]$.

Question 3 : Pour un accroissement de 3 en ordonnées l'accroissement de l'abscisse est de 2 : le coefficient directeur est donc égal à $\frac{3}{2} = 1,5$.

L'ordonnée à l'origine est égal à -1 , donc l'équation est $y = 1,5x - 1$.

Question 4 :

L'intégrale existe, est égale à l'aire de la surface limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 4$. On voit que cette aire est inférieure à celle du rectangle de longueur 2 et de largeur 0,5, donc inférieure à 1. Réponse :

$$0,5 \leq \int_2^4 f(x) dx \leq 1,5.$$

Partie B

$$g(x) = (-2x - 2) \times e^{-0,5x}$$

1. g est un produit de fonctions dérivables sur \mathbb{R} , donc :

$$g'(x) = -2e^{-0,5x} - 0,5(-2x - 2) \times e^{-0,5x} = e^{-0,5x}(-2 + x + 1) = (x - 1)e^{-0,5x}$$

2. On sait que quel que soit le réel x , $e^{-0,5x} > 0$; le signe de $g'(x)$ est donc celui de $(x - 1)$, donc négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$.

La fonction g est donc décroissante pour $x < 1$ et croissante pour $x > 1$. Elle a donc un minimum pour $x = 1$, $g(1) = -4e^{-0,5} \approx -2,426$.

3. On a $g(x) = -2xe^{-0,5x} - 2e^{-0,5x}$.

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-0,5x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -2e^{-0,5x} = 0, \text{ donc par somme de limites}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

L'axe des abscisses est asymptote horizontale au graphe de g au voisinage de plus l'infini.

D'autre part $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-0,5x} = +\infty$, d'où par produit de limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty.$$

4. Voir plus bas.

5. On lit graphiquement $-1 < x_I < 0$ et $-2 < y_I < -1$.

6. On a donc $g'(x) = f(x) \iff (x - 1)e^{-0,5x} = (-2x - 2) \times e^{-0,5x} \iff x - 1 = -2x - 2$ (car $e^{-0,5x} \neq 0$) $\iff 3x = -1 \iff x = -\frac{1}{3}$.

$$\text{L'ordonnée de } I \text{ est donc : } f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3} - 1\right) e^{\frac{0,5}{3}} = -\frac{4}{3} e^{\frac{1}{6}}.$$

7. La valeur moyenne de f sur $[0; 1]$ est :

$$V_m = \frac{1}{1 - 0} \int_0^1 f(x) dx = g(1) - g(0), \text{ car } g \text{ est une primitive de } f.$$

$$V_m = (-2 - 2) \times e^{-0,5} - ((-2) \times e^0) = -4e^{-0,5} + 2 = 2 - 4e^{-0,5} \approx -0,43. \text{ (une valeur négative est normale puisque sur l'intervalle } [0; 1], \text{ on } f(x) \leq 0.)$$

ANNEXE 1

À rendre avec la copie

Exercice 4

