

La Providence – Montpellier

CORRIGE – M. QUET

ACTIVITE : Une voiture fait un test d'endurance sur un circuit en roulant à une vitesse constante. On dit qu'elle a un **mouvement uniforme**.

DISTANCE (en km)	20	60	100	150	210	300	500	4800
DUREE (en h décimales)	0,1	0,3	0,5	0,75	1,05	1,5	2,5	24

- Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Oui Non
- Le pilote continue à rouler dans les mêmes conditions.
 - En combien de temps parcourra-t-il 500 km ?

EXERCICE 1

a. Escargot :

DISTANCE (en m)	0,5	1	3	5
DUREE (en s)	50	95	260	455

$$\frac{50}{0,5} = 100, \quad \frac{95}{1} = 95$$

mouvement uniforme : Oui Non

b. Concorde (Mach 1) :

DISTANCE (en km)	0,341	1,705	4,092	6,82
DUREE (en s)	1	5	12	20

$$\frac{0,341}{1} = 0,341, \quad \frac{1,705}{5} = 0,341, \quad \frac{4,092}{12} = 0,341,$$

$$\frac{6,82}{20} = 0,341 : \text{mouvement uniforme} : \text{X Oui}$$

c. Voiture de tourisme sur autoroute :

DISTANCE (en km)	210	310	410	510
DUREE (en h)	2	3	4	5

$$\frac{210}{2} = 105, \quad \frac{310}{3} \approx 103,3$$

mouvement uniforme : Oui Non

EXERCICE 2 : Un train

	Marseille	Valence	Lyon	Dijon	Paris
DISTANCE	0 km	250 km	360 km	?	810 km
DUREE (H)	0 h	1,25 h	?	2,9 h	?

Coefficient de proportionnalité : $\frac{1,25}{250} = 0,005$

a. Distance parcourue jusqu'à Dijon :

Calcul : $\frac{2,9}{0,005} = 580 \text{ km.}$

b. Temps nécessaire pour arriver à Lyon :

Calcul : $360 \times 0,005 = 1,8 \text{ h.}$

c. Temps nécessaire pour arriver à Paris ?

Calcul : $810 \times 0,005 = 4,05 \text{ h.}$

b. Quelle distance parcourra-t-il en 24 heures ?

EXERCICE 3

Un automobiliste roule sur une autoroute à une vitesse constante de 120 km/h.

a. Son mouvement est-il uniforme ?

Oui Non

Une vitesse constante traduit un mouvement uniforme.

b. $\frac{50}{120} \approx 0,417, \quad \frac{100}{120} \approx 0,833, \quad \frac{120}{120} = 1, \quad \frac{330}{120} = 2,75$

DISTANCE (en km)	50	100	120	330
DUREE (en h)	0,417	0,833	1	2,75

EXERCICE 4

DISTANCE (en m)	750	2250
DUREE (en s)	20	?

$3000 - 750 = 2250 \text{ m}$

$\frac{20}{750}$ ne « tombe pas juste », $\frac{750}{20} = 37,5$

$\frac{2250}{37,5} = 60$: il atteint le sol en 60 secondes.

EXERCICE 5

a. Cet avion se déplace-t-il de manière uniforme ?

DISTANCE	282 m	8,46 km	16,92 km	42,3 km	84,6 km
DUREE	1 s	30 s	1 min	2 min 30 s	5 min

Il faut tout convertir en mètres et secondes :

$\frac{8460}{30} = 282, \quad \frac{16920}{60} = 282, \quad \frac{42300}{150} = 282,$

$\frac{84600}{300} = 282$: uniforme Oui Non

b. Le mouvement est uniforme : 750 m en 1 s

DISTANCE	750 m	3 km	90 km	247,5 km
DISTANCE (m)	750 m	3 000	90 000	247 500
DUREE (s)	1 s	4	120	330
DUREE	1 s	4 s	2 min	5 min 30 s