



**أكاديمية  
الجهة  
الشرقية**

$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$  و  $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -4 + 4 = 0$  و  $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$   
 ومنه المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستقيمتين  
 $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4 \neq 0$  نحسب المحددات المستخرجة لدينا  
 ومنه المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{w}$  غير مستقيمتين

**تمرين 4:** تعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم  $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  النقط

$D(2; 3; 3)$  و  $B(2; 1; 3)$  و  $C(-1; 4; -3)$  و  $A(1; 2; 1)$   
 1. أدرس استقامية النقط  $A$  و  $B$  و  $C$   
 2. أدرس استقامية النقط  $A$  و  $B$  و  $D$   
**الأجوبة:** (1)  $\vec{AB}(1; -1; 2)$  يعني  $\vec{AC}(-2; 2; -4)$  يعني  $\vec{AC}(-1; -1; 4 - 2; -3 - 1)$   
 نحسب المحددات المستخرجة لدينا  
 $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$  و  $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -4 + 4 = 0$  و  $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$   
 ومنه المتجهات  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$  مستقيمتين وبالتالي النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  مستقيمية  
 $\vec{AD}(1; 1; 2)$  و  $\vec{AB}(1; -1; 2)$  (2)  
 ومنه المتجهات  $\vec{AB}$  و  $\vec{AD}$  غير مستقيمتين  
**تمرين 5:** تعتبر المتجهات  $\vec{u}(-1; 1; 1)$  و  $\vec{v}(0; -4; 4)$  و  $\vec{w}(-2; 0; 4)$   
 أحسب محددة المتجهات :  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$   
**الجواب:**  
 $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix}$   
 $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -1 \times -16 - 1 \times 8 + 1 \times (-8) = 16 - 16 = 0$

**تمرين 6:** تعتبر المتجهات  $\vec{u}(1; 1; 1)$  و  $\vec{v}(-2; 1; 1)$  و  $\vec{x}(0; 3; 3)$  و  $\vec{w}(0; 1; 2)$  و  $\vec{y}(1; m; 2)$  حيث  $m$  بارا متر حقيقي.

1. بين أن المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{x}$  مستوائية
2. بين أن المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  غير مستوائية
3. حدد العدد  $m$  بحيث تكون المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{y}$  مستوائية

في كل ما يلي الفضاء المنسوب إلى معلم  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

**تمرين 1:** نعتبر النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  بحيث :

$\overrightarrow{OB} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$  و  $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$   
 $\overrightarrow{AD} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$  و  $\overrightarrow{OC} = \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$   
 (1) حدد إحداثيات  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  في المعلم  
 (2) حدد إحداثيات المتجهات  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$  و  $\vec{AD}$  في الأساس  $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .  
**أجوبة 1:** (1)  $\vec{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$  يعني  $\vec{OB} = 2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$  يعني  $\vec{OC} = \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$   
 $\vec{OD} = \vec{AD} - \vec{AO} = \vec{AD} + \vec{OA}$  يعني  $\vec{AD} = \vec{AO} + \vec{OD}$   
 $\vec{OD} = \vec{AD} - \vec{AO} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k} + \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$  يعني  $\vec{D}(4; 4; 2)$   
 $\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = -\vec{OA} + \vec{OB} = -(\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) + 2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$  (2)  
 $\vec{AB}(1; 3; 6)$  و  $\vec{AB} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k} + 2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} = \vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$   
 $\vec{AC} = \vec{AO} + \vec{OC} = -\vec{OA} + \vec{OC} = -(\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) + \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$   
 $\vec{AC}(0; -6; 5)$  و  $\vec{AC} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k} + \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k} = 0\vec{i} - 6\vec{j} + 5\vec{k}$   
 $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k} - 2(0\vec{i} - 6\vec{j} + 5\vec{k}) = \vec{u} = \vec{AB} - 2\vec{AC}$  يعني  $\vec{u}(1; 15; -4)$  و  $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k} - 2(0\vec{i} - 6\vec{j} + 5\vec{k}) = \vec{i} + 15\vec{j} - 4\vec{k}$   
**تمرين 2:** تعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم  $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  النقط: (1)  $\vec{A}(-3; 2; 1)$  و (2)  $\vec{B}(5; 3; -1)$   

1. حدد متلوث إحداثيات المتجهة  $\vec{AB}$
2. حدد متلوث إحداثيات  $I$  منتصف القطعة  $[AB]$
3. أحسب المسافة  $AB$   
**الجواب:** (1)  $\vec{AB}(8; 1; -2)$  يعني  $\vec{AB}(5+3; 3-2; -1-1)$   
 $I\left(1; \frac{5}{2}; 0\right)$  يعني  $I\left(\frac{5+(-3)}{2}; \frac{3+2}{2}; \frac{-1+1}{2}\right)$  (2)

$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(5+3)^2 + (3-2)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{64+1+4} = \sqrt{69}$  (3)

**تمرين 3:** تعتبر في الفضاء المنسوب إلى الأساس  $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  المتجهات  $\vec{u}(1; 1; 2)$  و  $\vec{v}(-2; 2; -4)$  و  $\vec{w}(1; 1; 2)$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  و  $\vec{u}$  أدرس استقامية المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  أدرس استقامية المتجهات  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$   
**الأجوبة:** (1) نحسب المحددات المستخرجة لدينا

<p><b>أجوبة :</b></p> $\det(\bar{u}; \bar{v}; \bar{x}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ $= 3 - 3 + 6 - 6 = 0$ <p>ومنه : المتجهات <math>\bar{u}</math> و <math>\bar{v}</math> و <math>\bar{x}</math> مستوائية</p> $\det(\bar{u}; \bar{v}; \bar{w}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$ $= 1 + 4 - 2 = 3 \neq 0$ <p>ومنه : المتجهات <math>\bar{u}</math> و <math>\bar{v}</math> و <math>\bar{w}</math> غير مستوائية</p> <p>(3) <math>\bar{u}</math> و <math>\bar{v}</math> و <math>\bar{y}</math> مستوائية يعني</p> $\det(\bar{u}; \bar{v}; \bar{y}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & m \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$ <p>يعني <math>m = 2</math></p> $m = 2 \text{ يعني } \begin{vmatrix} 1 & m & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & m \end{vmatrix} = 0$ <p><b>تمرين 7:</b> نعتبر النقط <math>A(1; -3; 2)</math> و <math>B(0; 2; -1)</math> و <math>C(1; -1; -2)</math> و <math>D(-1; 1; 3)</math> و <math>E(1; 1; 2)</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. بين أن النقط <math>A</math> و <math>B</math> و <math>C</math> مستوائية</li> <li>2. بين أن النقط <math>A</math> و <math>B</math> و <math>C</math> و <math>E</math> مستوائية؟</li> </ol> <p><b>أجوبة :</b> (1) <math>\overline{AD}(-2; 0; 4)</math> و <math>\overline{AC}(0; -4; 4)</math> و <math>\overline{AB}(-1; 1; 1)</math> و <math>\overline{AE}(0; 0; 5)</math></p> $\det(\overline{AB}; \overline{AC}; \overline{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 0$ <p>ومنه : <math>\overline{AD}</math> و <math>\overline{AC}</math> و <math>\overline{AB}</math> مستوائية</p> <p>و بالتالي النقط <math>A</math> و <math>B</math> و <math>C</math> و <math>E</math> مستوائية</p> <p>(2) <math>\det(\overline{AB}; \overline{AC}; \overline{AE}) = \begin{vmatrix} -1 &amp; 0 &amp; 0 \\ 1 &amp; -4 &amp; 0 \\ 1 &amp; 4 &amp; 5 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -4 &amp; 0 \\ 4 &amp; 5 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 &amp; 0 \\ 4 &amp; 5 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 &amp; 0 \\ -4 &amp; 0 \end{vmatrix} = 20 \neq 0</math> <p>ومنه : <math>\overline{AC}</math> و <math>\overline{AB}</math> غير مستوائية</p> <p>و بالتالي النقط <math>A</math> و <math>B</math> و <math>C</math> و <math>E</math> غير مستوائية</p> <p><b>تمرين 8:</b> نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم <math>(o; \bar{i}; \bar{j}; \bar{k})</math> النقط :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>A(1; -3; 1)</math> و <math>B(2; 1; 2)</math> و <math>C(3; -3; 1)</math> و <math>D(2; -1; 0)</math> و المتجهة <math>\bar{u}(-1; 4; 1)</math> حدد تمثيلا بارا متريا للمستوى <math>P(A; \bar{u}; \bar{v})</math> حيث :</li> <li>2. هل النقط <math>D(2; -1; 0)</math> و <math>C(3; -3; 1)</math> و <math>B(2; 1; 2)</math> و <math>A(1; -3; 1)</math> تنتهي للمستقيم <math>(BC)</math>؟</li> <li>3. حدد تمثيلا بارا متريا للمستقيم <math>(BC)</math> المار من <math>A</math> و الموجه بالتجهيزين <math>\bar{u}(-1; 4; 1)</math> و <math>\bar{v}(-1; 0; 2)</math> و <math>\bar{u}(-2; 4; 1)</math> و <math>\bar{v}(-1; 0; 2)</math> غير مستوائيتين</li> <li>4. أدرس الوضع النسبي للمستقيمين <math>(BC)</math> و <math>(D)</math></li> </ol> <p><b>أجوبة :</b> (1) <math>\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})</math></p> <p>(2) <math>\begin{cases} t = -1 \\ t = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ t = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} 2 = 1 - t \\ 1 = 3 + 4t \\ 2 = 1 + t \end{cases}</math></p> </p>
---

أدرس الوضع النسبي للمستويين :  $(P)$  و  $(Q)$

**الجواب:** المستويان  $(P)$  و  $(P')$  متوازيان قطعا

**تمرين 14:** نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم  $(o; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

النقطة  $A(1;1;0)$  و المتجهتين  $\vec{u}(1;-1;2)$  و  $\vec{v}(1;1;1)$

و المستوى  $(Q)$  الذي معادلة ديكارتية :  $x+y-z+1=0$

(1) أعطى معادلة ديكارتية للمستوى  $(P)$  المار من  $A$  و الموجه

بالمتجهتين  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$

(2) أدرس الوضع النسبي للمستويين  $(Q)$  و  $(P)$ .

**الجواب:** نلاحظ أن  $(1;1;1)$  و  $(1;-1;2)$  غير مستقيميتن

يعني  $M(x; y; z) \in P(A; \vec{u}; \vec{v})$

$\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$  يعني  $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$

$$\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 1 \\ y-1 & 1 & -1 \\ z & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعني: } \overrightarrow{AM}(x-1; y-1; z)$$

$$(x-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (y-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعني: }$$

يعني :  $3(x-1) - (y-1) - 2z = 0$

(P) :  $3x-y-2z-2=0$  (Q) :  $x+y-z+1=0$  (2)

**تمرين 15:** حدد معادلتان ديكارتيتان للمستقيم  $(D) = D(A; \vec{u})$

في الحالات التالية :

(1)  $\vec{u}(1;2;3)$  و  $A(1;-1;2)$  متجهة موجهة له.

(2)  $\vec{u}(0;1;2)$  و  $A(1;-1;3)$  متجهة موجهة له.

**الجواب:** (1) يعني  $\frac{x-x_A}{a} = \frac{y-y_A}{b} = \frac{z-z_A}{c}$

$$\begin{cases} \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} \\ \frac{x-1}{1} = \frac{z-2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x-1) = y+1 \\ 3(x-1) = z-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-y-3=0 \\ 3x-z-1=0 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} x=1 \\ y+1=\frac{z-3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ 2(y+1)=z-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ 2y-z+5=0 \end{cases}$$

**تمرين 16:**  $D \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3+2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  و  $(P) : 3x-y-2z-2=0$

أدرس الوضع النسبي للمستوى  $(P)$  و المستقيم  $(D)$

**الجواب:**  $(P) : x+y-z+1=0$

اذن :  $0 = 0$  اذن :  $t = \frac{1}{2}$  يعني  $1+t + (2-t) - (3+2t)t + 1 = 0$  يقطع

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ y = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ z = 3 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 4 \end{cases} \quad \text{المستوى } (P) \text{ في النقطة:}$$

هي نقطة التقاطع  $A\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 4\right)$

**تمرين 12:** نعتبر النقط  $C(-1;2;-1)$  و  $B(1;1;2)$  و  $A(1;2;3)$

(1) بين أن النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  غير مستقيمية

(2) أعطى تمثيلا بارامتريا للمستوى  $(ABC)$

(3) أعطى معادلة ديكارتية للمستوى  $(ABC)$

**أجوبة:** (1)  $\overrightarrow{AB}(0;-1;-1)$  و  $\overrightarrow{AC}(-2;0;-4)$

$$d_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \quad \text{لدينا المحدد المستخرجة لدينا:}$$

و منه المتجهتين  $\overrightarrow{AB}$  و  $\overrightarrow{AC}$  غير مستقيمتين وبالتالي النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  غير مستقيمية

(2) لدينا المستوى  $(ABC)$  يمر من النقطة  $A$  و  $\overrightarrow{AB}$  و  $\overrightarrow{AC}$  متجهتين

موجهتين له

$$\text{اذن: } (t' \in \mathbb{R}) \text{ حيث } (t \in \mathbb{R}) \text{ هو تمثيل} \quad \begin{cases} x = 1 + 0t - 2t' \\ y = 2 - 1t + 0t' \\ z = 3 - 1t - 4t' \end{cases}$$

بارامترى للمستوى  $(ABC)$

(3) يعني  $M(x; y; z) \in (ABC)$

$$\det(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = 0 \quad \text{يعنى:}$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & -2 \\ y-2 & -1 & 0 \\ z-3 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعنى: } \overrightarrow{AM}(x-1; y-2; z-3)$$

$$(x-1) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - (y-2) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} + (z-3) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعنى: } 4x-4+2y-4-2z+6=0$$

$$4x-4+2y-4-2z+6=0 \quad \text{يعنى: } 4x+2y-2z-2=0$$

(P) :  $2x+y-z-1=0$  يعني  $4x+2y-2z-2=0$

**ملحوظة 1:** ليكن  $(P) = P(A; \vec{u}; \vec{v})$  و  $(Q) = P(B; \vec{u}'; \vec{v}')$  مستويين

من الفضاء لدينا:

1. إذا كان  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u}') = 0$  و  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{v}') = 0$

فإن  $(P)$  و  $(Q)$  منطبقان أو متوازيان قطعا.

2. إذا كان  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{v}') \neq 0$  أو  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u}') \neq 0$

فإن  $(P)$  و  $(Q)$  متقاطعان وفق مستقيم.

**ملحوظة 2:** ليكن  $(P)$  و  $(P')$  مستويين من الفضاء معرفين بمعادلتيهما

الديكارتيتين:

$$(a; b; c) \neq (0; 0; 0) \text{ مع } (P) : ax+by+cz+d=0$$

$$(a'; b'; c') \neq (0; 0; 0) \text{ مع } (P') : a'x+b'y+c'z+d'=0$$

1. يكون المستوىان  $(P)$  و  $(P')$  متقاطعين إذا و فقط إذا كان:

$ab' - ba' \neq 0$  أو  $ac' - ca' \neq 0$  أو  $bc' - cb' \neq 0$

2. يكون المستوىان  $(P)$  و  $(P')$  متوازيين إذا و فقط إذا وجد عدد

حقيقي غير منعدم  $k$  بحيث  $a' = ka$  و  $b' = kb$  و  $c' = kc$

3. يكون المستوىان  $(P)$  و  $(P')$  منطبقين إذا و فقط إذا وجد عدد

حقيقي غير منعدم  $k$  بحيث  $d' = kd$  و  $c' = kc$  و  $b' = kb$  و  $a' = ka$

**تمرين 13:** ليكن  $(P) = P(A; \vec{u}; \vec{v})$  و  $(Q) = P(B; \vec{u}'; \vec{v}')$  مستويين من الفضاء معرفين بمعادلتيهما

الديكارتيتين:

$$(P) : 3x-3y-6z-2=0 \quad (Q) : x-y-2z-3=0$$

$$(D) \begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+t \\ z=-2+4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{و } (P) : 3x-y-2z-2=0$$

أدرس الوضع النسبي لل المستوى  $(P)$  و المستقيم  $(D)$

**الجواب:**  $(P) : 5x+2y-3z-10=0$

اذن :  $5(1+2t)+2(-1+t)-3(-2+4t)-10=0$  يعني  $t=0$  غير ممكن اذن :  $(D)$  و  $(P)$  متوازيان قطعا

**ملاحظة:** ليكن  $(P) = P(\vec{B}; \vec{u}; \vec{v})$  و  $(D) = D(\vec{A}; \vec{w})$

إذا كان  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = 0$  فان  $A \in (P)$  و  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) \neq 0$

إذا كان  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = 0$  فان  $A \notin (P)$  و  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) \neq 0$

إذا كان  $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) \neq 0$  فان  $(D)$  يخترق  $(P)$ .

**تمرين 18:**  $\vec{u}(1; -1; 1) = P(\vec{B}; \vec{u}; \vec{v})$  و  $(D) = D(\vec{A}; \vec{w})$

و  $\vec{B}(1; 0; 0)$  و  $\vec{A}(0; 0; -1)$  و  $\vec{v}(0; 2; 0)$

1) حدد معادلة ديكارتية للمستوى  $(P)$

أدرس الوضع النسبي للمستوى  $(P)$  و المستقيم  $(D)$

**الجواب:** نلاحظ أن  $\vec{u}(1; -1; 1)$  و  $\vec{v}(0; 1; 0)$  غير مستقيمتين

يعني  $M(x; y; z) \in P(\vec{B}; \vec{u}; \vec{v})$  و  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مستوائية

$\det(\vec{AM}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$  يعني  $\det(\vec{AM}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$

$$\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 0 \\ y & -1 & 1 \\ z & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعني} \quad \vec{BM}(x-1; y; z)$$

$$(x-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{يعني:}$$

$$(P) : -x+z+1=0 \quad \text{يعني: } (x-1)-0+z=0$$

$$\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

ولدينا  $A \in (P)$  لأن:

$(D) \subset (P)$  ومنه  $(P) : -x+z+1=0$