

CONCOURS D'ENTREE en 1ère Année

Filières : Sciences Expérimentales et Techniques

Epreuve de Mathématiques

Mardi 09/08/11 - Durée : 2h 10mn

|| Questions à réponse précise, Partie I ||

Répondre dans la colonne Réponses (NB : Chaque question est notée sur (1Pt))	
Questions	Réponses
<p>Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?</p> <p>(a) La somme de deux fonctions monotones est monotone</p> <p>(b) $\forall x > 1, \frac{x-1}{\ln(x-1)} \in \mathbb{R}$</p> <p>(c) Soit A, B et C trois ensembles, on a $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$</p> <p>(d) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0 \implies x < 0$</p> <p>(e) La somme de deux irrationnels est un irrationnel</p>	
<p>Traduire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes :</p> <p>(a) La fonction f est constante sur $[0, 5]$</p> <p>(b) La fonction ψ est strictement décroissante et positive</p> <p>(c) La fonction g n'est pas injective sur l'ensemble E</p> <p>(d) La fonction h, définie sur \mathbb{R}, atteint toutes les valeurs de \mathbb{N}</p> <p>(e) Tout réel possède une racine carré dans \mathbb{R}</p>	

|| Questions à réponse précise, Partie II ||

Répondre dans la colonne Réponses (Chaque question est notée sur (2Pts))	
Questions	Réponses
Soit le segment $P_1(-8, 5)$ et $P_2(6, 11)$. Déterminer les coordonnées du point $P(x, y)$ situé aux deux tiers de ce segment à partir du point P_1	
Trouver les entiers relatifs a , b et c de sorte que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x - a)(x - 10) + 1 = (x + b)(x + c)$	
E , F et G étant trois ensembles finis, exprimer $\text{card}(E \cup F \cup G)$ en fonction des cardinaux des ensembles E , F , G , $E \cap F$, $E \cap G$, $F \cap G$ et $E \cap F \cap G$	
Exprimer à l'aide d'intervalles de \mathbb{R} l'ensemble suivant : $A = \{x \in \mathbb{R} / 2 \leq x < 4\}$	
Représenter graphiquement le domaine limité par : $x^2 + y^2 + 2y \leq 3$, $x + y \leq 0$ et $x > -1$	
Comment faire 21 avec les chiffres 1 5 6 et 7 utilisés qu'une fois chacun, et en utilisant à son gré les opérateurs simples +, -, * et /	
Calculer le nombre complexe $B = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{20}$	
Calculer $\alpha = \sum_{k=1}^n \frac{2^k + 3^{k+2}}{5^{k+1}}$	
Calculer $\beta = \sum_{k=1}^n (2k + 7)$	
Diviser $20xy + 5y^2 - 10y - 12x + 6$ par $5y - 3$ avec $x \in \mathbb{R}$ est un paramètre fixé	

|| Questions à réponse précise, Partie C ||

Répondre dans la colonne Réponses (NB : Chaque question est notée sur (2Pts))	
Questions	Réponses
<p>Pour quelles valeurs de $\beta \in \mathbb{R}$, l'équation $x^2 + \sqrt{x} - \beta = 0$ admet une unique racine dans l'intervalle $[0, 1]$?</p>	
<p>Déterminer la fonction f telle que $g \circ f(x) = 2 x$ sachant que g est la fonction définie par $g(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$</p>	
<p>Calculer $\int t^3 \cos t^2 dt$</p>	
<p>Soit la fonction f définie sur $I = [0, 3]$ par</p> $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ xe^{x^2} & \text{si } x \in]0, 2[\\ 1 & \text{si } x = 2 \\ \frac{2x}{1+x^2} & \text{si } x \in]2, 3] \end{cases}$ <p>Calculer $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ avec $x \in I$</p>	
<p>On considère, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'intégrale $I_n = \int_0^1 x^n e^{2x} dx$. Trouver une relation entre I_n et I_{n-1} avec $n > 1$</p>	
<p>Calculer la dérivée, lorsqu'elle existe, de la fonction suivante : $f(x) = x \ln x+1$</p>	
<p>Déterminer l'équation de la droite qui est asymptote à la courbe \mathcal{C}_f en $+\infty$ de la fonction f, définie sur \mathbb{R}^* par $f(x) = \frac{2e^x + 1}{1 - e^x}$</p>	
<p>Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{\sqrt[3]{x^3+3x}}$</p>	
<p>Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $E(x) = 3$ avec $E(x)$ est la partie entière de x</p>	
<p>Donner l'ensemble S des réels appartenant à l'intervalle $[0, 2\pi[$ vérifiant l'équation :</p> $(\sin x)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = 0$	