

يعني $\vec{GA} - 3\vec{GB} = \vec{0}$ يعني G مرجح النقطتين المترنيتين $(A; -3)$ و $(B; -1)$

وباستعمال العلاقة ① نجد $\vec{AG} = \frac{-1}{(-1)+(-3)} \vec{AB}$ يعني $\vec{AG} = \frac{1}{4} \vec{AB}$

ومنه الرسم:



تمرين 5: ليكن G مرجح النقطتين المترنيتين $(A; \sqrt{8})$ و $(B; -\sqrt{2})$

بين أن G مرجح النقطتين $(A; -2)$ و $(B; 1)$

الجواب: حسب خاصية الصمود نضرب وزني النقطتين في نفس العدد الحقيقي

و المرجح لا يتغير نأخذ: $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$

اذن: G مرجح النقطتين $(A; -\sqrt{8} \times \frac{1}{\sqrt{2}})$ و $(B; -\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}})$

أي: $(A; -2)$ و $(B; 1)$ نلاحظ أن: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

تمرين 6: ليكن E و F نقطتين من المستوى بحيث: $\vec{EG} = 2\vec{EF}$ و $E \notin (AB)$

بين أن: G مرجح النقطتين المترنيتين $(E; -1)$ و $(F; 2)$

2) استنتج أن المستقيمين (EF) و (AB) يتقاطعان محددًا نقطة تقاطعهما.

الأجوبة: 1) $\vec{EG} = 2\vec{EF}$ يعني

$\vec{EG} = 2(\vec{EG} + \vec{GF})$ (استعمال علاقة شال)

يعني $\vec{EG} = 2\vec{EG} + 2\vec{GF}$ يعني $\vec{EG} - 2\vec{EG} = 2\vec{GF}$

يعني $-1\vec{EG} - 2\vec{GF} = \vec{0}$

يعني $\vec{EG} + 2\vec{GF} = \vec{0}$ يعني $-\vec{GE} + 2\vec{GF} = \vec{0}$ يعني G مرجح النقطتين المترنيتين $(E; -1)$ و $(F; 2)$

2) لدينا G مرجح النقطتين المترنيتين $(A; 2)$ و $(B; -3)$

اذن: $G \in (AB)$

و لدينا G مرجح النقطتين المترنيتين $(E; -1)$ و $(F; 2)$

اذن: $G \in (EF)$

اذن المستقيمين (AB) و (EF) لديهم نقطة مشتركة

وغير منطقيين (لأن: $E \notin (AB)$)

وبالتالي: المستقيمين (EF) و (AB) يتقاطعان

و G هي نقطة تقاطعهما.

تمرين 7: لتكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوى.

ولتكن I منتصف القطعة $[AB]$ و G مرجح النقطتين $(A; 3)$ و $(B; -5)$

حدد مجموعة النقط G من المستوى P بحيث:

$$\|3\vec{MA} - 5\vec{MB}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB}\|$$

تمرين 1: لتكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوى

1) بين أنه توجد نقطة G بحيث: $4\vec{GA} - 5\vec{GB} = \vec{0}$ (E)

2) أنشئ النقطة G

الأجوبة: 1) نلاحظ أن: $4 + (-5) \neq 0$

$4\vec{GA} - 5\vec{GB} = \vec{0}$ يعني $4\vec{GA} - 5(\vec{GA} + \vec{AB}) = \vec{0}$ (استعمال علاقة شال)

يعني $4\vec{GA} - 5\vec{GA} - 5\vec{AB} = \vec{0}$ يعني $-\vec{GA} - 5\vec{AB} = \vec{0}$ يعني $\vec{AG} = 5\vec{AB}$

اذن توجد نقطة وحيدة G على المستقيم (AB) تحقق (E)

2)



تمرين 2: لتكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوى

هل توجد توجد نقطة G بحيث: $2\vec{GA} - 2\vec{GB} = \vec{0}$

الجواب: نلاحظ أن: $2 - 2 = 0$

$2\vec{GA} - 2\vec{GB} = \vec{0}$ يعني $2\vec{GA} - 2(\vec{GA} + \vec{AB}) = \vec{0}$ (استعمال علاقة شال)

يعني $2\vec{GA} - 2\vec{GA} - 2\vec{AB} = \vec{0}$ يعني $2\vec{AB} = \vec{0}$ وهذا غير ممكن

اذن لا توجد نقطة G تحقق (E)

ملاحظة 1: إذا كانت $a + b = 0$ فان النقطتين المترنيتين $(A; a)$ و

$(B; b)$ ليس لهم مرجح

ملاحظة 2: إذا كانت النقطة G مرجح النقطتين

المترنيتين $(A; a)$ و $(B; b)$ فان: $\vec{AG} = \frac{b}{a+b} \vec{AB}$ (استعمال علاقة شال)

وهذه الكتابة تستعمل لرسم النقطة G

تمرين 3: أنشئ G مرجح النقطتين $(A; -2)$ و $(B; 3)$ ثم أنشئ G'

مرجح النقطتين $(A; 2)$ و $(B; 1)$

1. أحسب \vec{GG}' بدلالة \vec{AB}

الأجوبة: 1) لدينا G مرجح النقطتين $(A; -2)$ و $(B; 3)$ باستعمال

العلاقة ① نجد:

$$\vec{AG} = \frac{3}{(-2)+3} \vec{AB} \text{ يعني } \vec{AG} = 3\vec{AB}$$

ولدينا G' مرجح النقطتين $(A; 2)$ و $(B; 1)$ وباستعمال العلاقة ① نجد

$$\vec{AG}' = \frac{1}{3} \vec{AB} \text{ يعني } \vec{AG}' = \frac{1}{1+2} \vec{AB}$$



2) اذن: $\vec{GG}' = \vec{GA} + \vec{AG}' = -\vec{AG} + \vec{AG}' = -3\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AB} = \left(-3 + \frac{1}{3}\right)\vec{AB} = -\frac{8}{3}\vec{AB}$

تمرين 4: أنشئ G مرجح النقطتين المترنيتين $(A; -0,003)$

و $(B; -0,001)$ حيث $A \neq B$

الجواب: G مرجح النقطتين المترنيتين $(A; -0,003)$ و $(B; -0,001)$

يعني $-0,003\vec{GA} - 0,001\vec{GB} = \vec{0}$ نضرب طرفي المتساوية في نفس العدد:

$k = 1000$

$$H(4;8) : \text{اذن } \begin{cases} x_H = 4 \\ y_H = 8 \end{cases} \text{ يعني } \begin{cases} \frac{x_H}{4} = 1 \\ \frac{y_H}{8} = 2 \end{cases} \text{ يعني } \overline{OG} = \frac{1}{4} \overline{OH}$$

$\overline{AH} = 3\overline{OB}$: نلاحظ أن $\overline{OB}(6;2)$ و $\overline{AH}(6;2)$ (3) ومنه المستقيمين (AH) و (OB) متوازيان لأن المتجهتين \overline{AH} و \overline{OB} مستقيمتان

تمرين 10: في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر النقطتين: $A(0;5)$ و $B(3;2)$ وليكن G مرجح النقطتين المتزنيتين $(A;1)$ و $(B;2)$

(1) أحسب إحداثيتي G

(2) حدد و أرسم مجموعة النقط M من المستوى P بحيث:


$$\|\overline{MA} + 2\overline{MB}\| = 6$$

$$G(2;3) : \text{اذن } \begin{cases} x_G = \frac{0+6}{3} = 2 \\ y_G = \frac{5+4}{3} = 3 \end{cases} \text{ (الأجوبة: 1)}$$

(2) $\|\overline{MA} + 2\overline{MB}\| = 6 \text{ cm}$ يعني $\|\overline{MG}\| = 6 \text{ cm}$ حسب الخاصية المميزة للمرجح

يعني $\|\overline{MG}\| = 6 \text{ cm}$ يعني $3\|\overline{MG}\| = 6 \text{ cm}$ يعني $MG = 2 \text{ cm}$

ومنه مجموعة النقط هي الدائرة (C) التي مركزها G وشعاعها $r = 2 \text{ cm}$



ملاحظة: إذا كان G مرجح النقط المتزنة $(A;a)$ و $(B;b)$ و $(C;c)$

$$\text{حيث } a+b+c \neq 0 \text{ فإن } \overline{AG} = \frac{b}{a+b+c} \overline{AB} + \frac{c}{a+b+c} \overline{AC}$$

وهذه العلاقة تمكننا من رسم النقطة G

تمرين 11: ليكن ABC مثلثا و G نقطة بحيث $2\overline{AC} = 3\overline{AG} - \overline{GB}$ بين أن G مرجح النقط المتزنة $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;2)$

و أنشئ النقطة G

$$\text{الجواب: } 2\overline{AC} = 3\overline{AG} - \overline{GB} \text{ يعني } 2\overline{AC} - 3\overline{AG} + \overline{GB} = \vec{0}$$

$$\text{يعني } 2(\overline{AG} + \overline{GC}) - 3\overline{AG} + \overline{GB} = \vec{0} \text{ يعني } -\overline{AG} + \overline{GB} + 2\overline{GC} = \vec{0}$$

$$\text{يعني } \overline{GA} + \overline{GB} + 2\overline{GC} = \vec{0}$$

ومنه G مرجح النقط المتزنة $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;2)$

$$\text{وحسب العلاقة } \textcircled{R} \text{ فإن } \overline{AG} = \frac{b}{a+b+c} \overline{AB} + \frac{c}{a+b+c} \overline{AC}$$

$$\text{أي: } \overline{AG} = \frac{1}{4} \overline{AB} + \frac{2}{4} \overline{AC} \text{ يعني } \overline{AG} = \frac{1}{4} \overline{AB} + \frac{2}{4} \overline{AC} \text{ ومنه رسم } G$$

$$\text{الجواب: } \|3\overline{MA} - 5\overline{MB}\| = \|\overline{MA} + \overline{MB}\|$$

G مرجح النقطتين $(A;3)$ و $(B;-5)$ اذن حسب الخاصية المميزة للمرجح فان:

$$3\overline{MA} - 5\overline{MB} = (3+(-5))\overline{MG} = -2\overline{MG}$$

ولدينا $\overline{MA} + \overline{MB} = \overline{MI} + \overline{IA} + \overline{MI} + \overline{IB} = 2\overline{MI} + \overline{IA} + \overline{IB}$ وبما أن I منتصف القطعة $[AB]$


$$\text{فان } \overline{IA} + \overline{IB} = \vec{0} \text{ منه } \overline{MA} + \overline{MB} = 2\overline{MI}$$

$$\| -2\overline{MG} \| = \| 2\overline{MI} \| \text{ يعني } -2\|\overline{MG}\| = 2\|\overline{MI}\|$$

$$\text{يعني } \|3\overline{MA} - 5\overline{MB}\| = \|\overline{MA} + \overline{MB}\|$$

$$\text{يعني } 2MG = 2MI \text{ يعني } MG = MI$$

ومنه مجموعة النقط هي واسط القطعة $[GI]$



تمرين 8: نعتبر النقطتين: $A(1;2)$ و $B(-4;6)$ وليكن G مرجح

النقطتين المتزنيتين $(A;2)$ و $(B;-1)$

أحسب إحداثيتي G

$$\text{الجواب: } G(6;-2) : \text{اذن } \begin{cases} x_G = \frac{2 \times 1 + (-1) \times (-4)}{2 + (-1)} = \frac{6}{1} = 6 \\ y_G = \frac{2 \times 2 + (-1) \times 6}{2 + (-1)} = \frac{-2}{1} = -2 \end{cases}$$

تمرين 9: في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر النقطتين: $A(-2;5)$ و $B(2;1)$ وليكن G مرجح النقطتين المتزنيتين $(A;1)$ و $(B;3)$

(1) أحسب إحداثيتي G

(2) حدد إحداثيتي النقطة H بحيث G مرجح النقطتين المتزنيتين $(H;1)$ و $(O;3)$

(3) بين أن: المستقيمين (AH) و (OB) متوازيان.

$$\text{الأجوبة: 1)} \text{ اذن } G(1;2) : \begin{cases} x_G = \frac{1 \times (-2) + 3 \times 2}{3+1} = \frac{4}{4} = 1 \\ y_G = \frac{1 \times 5 + 3 \times 1}{3+1} = \frac{8}{4} = 2 \end{cases}$$

2) **طريقة 1:** مرجح النقطتين المتزنيتين $(H;1)$ و $(O;3)$ يعني:

$$\begin{cases} x_G = \frac{1 \times x_H + 3 \times x_O}{3+1} = 1 \\ y_G = \frac{1 \times y_H + 3 \times y_O}{3+1} = 2 \end{cases}$$

$$\text{لدينا } O(0;0) \text{ يعني: } \begin{cases} \frac{x_H}{4} = 1 \\ \frac{y_H}{8} = 2 \end{cases} \text{ اذن } H(4;8)$$

طريقة 2: مرجح النقطتين المتزنيتين $(H;1)$ و $(O;3)$ يعني: $\overline{OG} = \frac{1}{4} \overline{OH}$

$$\overline{OG}(1;2) \text{ و } \frac{1}{4} \overline{OH} \left(\frac{1}{4} x_H; \frac{1}{4} y_H \right)$$

(1) بين أن \vec{v} متجهة غير مرتبطة بالنقطة M
 (2) لتكن K مرجح النقطتين المتزنتين $(B;1)$ و $(C;-3)$

$$\vec{v} = 2\vec{KA}$$

(3) ليكن G مرجح النقط المتزنة $(A;2)$ و $(B;-1)$ و $(C;-3)$

(أ) بين أن $2\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC} = 2\vec{GM}$ لكل نقطة M من المستوى
 (ب) استنتج مجموعة النقط M من المستوى بحيث :

$$\|2\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC}\| = \|2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}\|$$

الأجوبة: (1) $\vec{v} = 2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC} = 2\vec{MA} + \vec{MA} + \vec{AB} - 3(\vec{MA} + \vec{AC})$

$$\vec{v} = \vec{AB} - 3\vec{AC}$$

$$2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC} = \vec{AB} - 3\vec{AC}$$

مهما تكن M من المستوى

$$2\vec{KA} + \vec{KB} - 3\vec{KC} = \vec{AB} - 3\vec{AC}$$

ونعلم أن K مرجح النقطتين المتزنتين $(B;1)$ و $(C;-3)$ إذن :

$$\vec{KB} - 3\vec{KC} = \vec{0}$$

$$2\vec{KA} = \vec{v} \quad \text{ومنه نجد : } 2\vec{KA} = \vec{AB} - 3\vec{AC}$$

(3) حسب الخاصية المميزة للمرجح :

$$2\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC} = (2 + (-1) + (-3))\vec{MG} = -2\vec{MG} = 2\vec{GM}$$

$$\|2\vec{GM}\| = \|2\vec{KA}\| \quad \text{تعني } \|2\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC}\| = \|2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}\|$$

$$\text{تعني } 2GM = 2KA \quad \text{تعني } GM = KA$$

ومنه مجموعة النقط هي الدائرة (C) التي مركزها G وشعاعها $r = KA$

تمرين 17: ليكن ABC مثلثا و B' مرجح النقطتين $(A;-2)$ و $(C;1)$

ثم A' مرجح النقطتين $(A;2)$ و $(B;-3)$

و C' مرجح النقطتين $(C;-1)$ و $(B;3)$

$$(1) \text{ بين أن : } \vec{AA}' = 3\vec{AB} \quad \text{و} \quad \vec{AB}' = -\vec{AC} \quad \text{و} \quad \vec{BC}' = -\frac{1}{2}\vec{BC}$$

$$(2) \text{ بين أن : } \vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = \vec{0}$$

(3) استنتج أنه مهما تكن M نقطة من المستوى فان :

$$-\vec{MA}' - \vec{MB}' + 2\vec{MC}' = \vec{0}$$

(4) استنتج أن النقط A' و B' و C' مستقيمية.

الأجوبة: (1) مرجح النقطتين $(A;2)$ و $(C;1)$

$$\text{اذن : } \vec{AB}' = \frac{1}{1+(-2)}\vec{AC} = -\vec{AC}$$

$$\vec{AA}' = \frac{-3}{-3+2}\vec{AB} = 3\vec{AB} \quad \text{اذن : } (A;2) \text{ و } (B;-3)$$

$$\vec{BC}' = \frac{-1}{3+(-1)}\vec{BC} = -\frac{1}{2}\vec{BC} \quad \text{يعني } (B;3) \text{ و } (C;-1)$$

(2)

$$\vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = \vec{B}'A' + \vec{AA}' + 2(\vec{A}'B' + \vec{BC}') = \vec{AA}' - \vec{AB}' + 2\vec{BC}' - 2\vec{BA}'$$

$$\vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = 3\vec{AB} + \vec{AC} - 2 \times \frac{1}{2}\vec{BC} - 2(\vec{BA} + \vec{AA}') = \vec{0}$$

$$\vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = 3\vec{AB} + \vec{AC} - \vec{BC} + 2\vec{AB} - 6\vec{AB} = -\vec{AB} + \vec{AC} - \vec{BC}$$

$$\vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CB} = \vec{BB} = \vec{0}$$

$$-\vec{MA}' - \vec{MB}' + 2\vec{MC}' = -\vec{MA}' - (\vec{MA}' + \vec{A}'B') + 2(\vec{MA}' + \vec{A}'C')$$

$$-\vec{MA}' - \vec{MB}' + 2\vec{MC}' = -\vec{A}'B' + 2\vec{A}'C' = \vec{B}'A' + 2\vec{A}'C' = \vec{0}$$


(4) وجدنا أن : مهما تكن M نقطة من المستوى

$$-\vec{MA}' - \vec{MB}' + 2\vec{MC}' = \vec{0} \quad \text{فان :}$$

$$M = A' \quad \text{بوضع مثلا :}$$

$$\text{نجد : } 2\vec{A}'C' = \vec{A}'B' \quad \text{يعني } -\vec{A}'A' - \vec{A}'B' + 2\vec{A}'C' = \vec{0}$$

وهذا يعني أن : النقط A' و B' و C' مستقيمية.



تمرين 12: لتكن A و B و C ثلاث نقط من المستوى. و G مرجح النقط المتزنة $(A;2)$ و $(B;-1)$ و $(C;1)$

$$\text{حدد المجموعة : } E = \{M \in P / \|2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 6\text{cm}\}$$

حيث P هو المستوى.

$$\|2\vec{MG}\| = 6\text{cm} \quad \text{يعني } \|2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 6\text{cm}$$

حسب الخاصية المميزة للمرجح

$$\text{يعني } \|2\vec{MG}\| = 6\text{cm} \quad \text{يعني } 2MG = 6\text{cm} \quad \text{يعني } MG = 3\text{cm}$$

ومنه مجموعة النقط هي الدائرة (C) التي مركزها G وشعاعها $r = 3\text{cm}$

تمرين 13: ليكن G مركز ثقل المثلث ABC و I منتصف القطعة

$[BC]$ بين أن G مرجح النقطتين $(A;1)$ و $(I;2)$

الجواب : G مركز ثقل المثلث ABC يعني مرجح النقط

المتزنة $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;1)$

I منتصف القطعة $[BC]$ يعني : مرجح النقطتين $(B;1)$ و $(C;1)$

وحسب خاصية تجميعية المرجح فان :

G هو مرجح النقطتين $(A;1)$ و $(I;1+1)$

تمرين 14: لتكن A و B و C و D ثلاث نقط من المستوى

حدد مجموعة النقط من المستوى بحيث :

$$\|2\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC} - 5\vec{MD}\| = 5\text{cm}$$

تمرين 15: في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

نعبر النقط : $A(-1;1)$ و $B(0;2)$ و $C(1;-1)$ و $D(1;0)$

(1) حدد إحداثياتي K مرجح النقطتين المتزنتين $(A;2)$ و $(B;3)$

(2) حدد إحداثياتي L مركز ثقل المثلث ABC

(3) حدد إحداثياتي G مرجح النقط : $(A;2)$ و $(B;3)$ و $(C;1)$ و $(D;-1)$

$$\text{الأجوبة : (1)} \quad K \left(-\frac{2}{5}; \frac{8}{5} \right) \quad \text{اذن : } \begin{cases} x_K = \frac{-2+0}{5} = -\frac{2}{5} \\ y_K = \frac{2+6}{5} = \frac{8}{5} \end{cases}$$

(2) L مركز ثقل المثلث ABC يعني

L مرجح النقط المتزنة $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;1)$

$$\text{ومنه : } \begin{cases} x_L = \frac{1x_A + 1x_B + 1x_C}{1+1+1} = 0 \\ y_L = \frac{1y_A + 1y_B + 1y_C}{1+1+1} = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{اذن : } L \left(0; \frac{2}{3} \right)$$

$$(3) \quad \begin{cases} x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C + dx_D}{a+b+c+d} \\ y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C + dy_D}{a+b+c+d} \end{cases}$$

$$\text{يعني : } G \left(-\frac{2}{5}; \frac{7}{5} \right) \quad \text{اذن : } \begin{cases} x_G = \frac{2 \times (-1) + 3 \times 0 + 1 \times 1 + (-1) \times 1}{5} = -\frac{2}{5} \\ y_G = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 1 \times (-1) + (-1) \times 0}{5} = \frac{7}{5} \end{cases}$$

تمرين 16: لتكن A و B و C ثلاث نقط من المستوى.

و M من المستوى P بحيث : $\vec{v} = 2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}$

تمرين 18: ليكن I مرجح النقطتين $(A;2)$ و $(C;1)$ و J مرجح النقطتين

$(A;1)$ و $(B;2)$ و K مرجح النقطتين $(C;1)$ و $(B;-4)$

(1) أنشئ النقط I و J و K


(2) أثبت أن B مرجح النقطتين $(K;3)$ و $(C;1)$

(3) بين أن J منتصف $[KI]$

الأجوبة : (1) I مرجح النقطتين $(A;2)$ و $(C;1)$ اذن : $\overline{AI} = \frac{1}{3}\overline{AC}$

J مرجح النقطتين $(A;1)$ و $(B;2)$ اذن : $\overline{AJ} = \frac{2}{3}\overline{AB}$

K مرجح النقطتين $(C;1)$ و $(B;-4)$ اذن : $\overline{BK} = -\frac{1}{3}\overline{BC}$



(2) يكفي أن نبين أن : $3\overline{BK} + \overline{BC} = \overline{0}$ ؟؟؟؟

بما أن لدينا : $\overline{BK} = -\frac{1}{3}\overline{BC}$ يعني $3\overline{BK} = -\overline{BC}$

يعني $3\overline{BK} + \overline{BC} = \overline{0}$

(3) يكفي أن نبين أن : $\overline{JK} = \overline{IJ}$ ؟؟؟؟

لدينا : $\overline{AI} = \frac{1}{3}\overline{AC}$ و $\overline{AJ} = \frac{2}{3}\overline{AB}$

اذن : $\overline{IJ} = \overline{AJ} - \overline{AI} = \frac{2}{3}\overline{AB} - \frac{1}{3}\overline{AC} = \frac{1}{3}(2\overline{AB} - \overline{AC})$ ①

لدينا : $\overline{JK} = \overline{JA} + \overline{AB} + \overline{BK} = \frac{2}{3}\overline{AB} + \overline{AB} - \frac{1}{3}\overline{BC} = \frac{1}{3}(\overline{AB} + \overline{CB})$

② $\overline{JK} = \frac{1}{3}(\overline{AB} + \overline{CA} + \overline{AB}) = \frac{1}{3}(2\overline{AB} - \overline{AC})$

من : ① و ② نجد أن : $\overline{IJ} = \overline{JK}$ ومنه : J منتصف $[KI]$

حظ سعيد



« c'est en forgeant que l'on devient forgeron » dit un proverbe.
c'est en s'entraînant
régulièrement aux calculs et
exercices que l'on devient un
mathématicien