

المعادلات التفاضلية

المعادلة التفاضلية هي كل معادلة يكون المجهول فيها دالة عدديّة وتحتوي على مشتقات هذه الدالة حل معادلة تفاضلية ما يعني إيجاد جميع الدوال y التي تحقق هذه المعادلة . و مجموعة هذه الدوال تسمى الحل العام للمعادلة التفاضلية و كل عنصر من هذه المجموعة يسمى حل خاصا في هذا الدرس سنتطرق إلى نوعين من المعادلات التفاضلية :

- 1 - المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى :
- 2 - المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية: $y'' + ay' + b = 0$

I - المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى

1 - المعادلة التفاضلية من نوع : $y' = ay$

a - خاصية

ليكن $a \in \mathbb{R}$ الحل العام لمعادلة من نوع $y' = ay$ حيث A ثابتة حقيقة تحدد بالشروط البدنية

b - مثال

حدد الحل العام لمعادلة التفاضلية $y' = -3y$ و الذي يحقق الشرط $y(0) = \frac{1}{5}$ (E) :

الحل:

حسب الخاصية السابقة الحل العام لمعادلة (E) هو الدالة y المعرفة كما يلي: $y(x) = Ae^{-3x}$ حيث A ثابتة حقيقة سنحددها

$$y(0) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow Ae^0 = \frac{1}{5} \Leftrightarrow A = \frac{1}{5}$$

ومنه الحل العام لمعادلة التفاضلية $y' = -3y$ و الذي يحقق الشرط البدئي $y(0) = \frac{1}{5}$ هو الدالة y المعرفة

$$y(x) = \frac{1}{5}e^{-3x}$$

2 - المعادلة التفاضلية من نوع : $y' = ay + b$

a - خاصية

ليكن a و b عددين حقيقيين غير منعدمين الحل العام لمعادلة من نوع $y' = ay + b$ حيث A ثابتة حقيقة تحدد بالشروط البدئية

b - مثال

حدد الحل العام لمعادلة التفاضلية $y' = 7y + 5$ و الذي يحقق الشرط $y(-1) = 3$ (E) :

الحل:

حسب الخاصية السابقة الحل العام لمعادلة (E) هو الدالة y المعرفة كما يلي: $y(x) = Ae^{7x} - \frac{5}{7}$ حيث A ثابتة حقيقة سنحددها

$$y(-1) = 3 \Leftrightarrow Ae^{-7} - \frac{5}{7} = 3$$

$$\Leftrightarrow Ae^{-7} = 3 + \frac{5}{7} = \frac{26}{7}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{26}{7}e^7$$

لدينا ادن الحل العام للمعادلة التفاضلية $y' = 7y + 5$ و الذي يحقق الشرط البدئي $y(-1) = 3$ هو الدالة y

$$y(x) = \frac{26}{7}e^7 e^{7x} - \frac{5}{7} = \frac{26}{7}e^{7(x+1)} - \frac{5}{7}$$

// - المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية:

1 - تحديد الحل العام لمعادلة تفاضلية من الرتبة الثانية:

لتكن (E) : $y'' + ay' + by = 0$ معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية

المعادلة التالية $r^2 + ar + b = 0$ تسمى المعدلة المميزة للمعادلة التفاضلية (E)

وليكن $\Delta = a^2 - 4b$ مميز المعدلة المميزة


الجدول التالي يلخص الحالات الثلاثة المرتبطة بإشارة $\Delta = a^2 - 4b$ و كيفية تحديد الحل العام للمعادلة (E)

إشاره المميز Δ	حلول المعادلة المميزة	الحل العام للمعادلة (E)
$\Delta = 0$	$r = \frac{-a}{2}$ المعادلة المميزة لها حل وحيد	الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow (Ax + B)e^{rx}$
$\Delta > 0$	$r_2 = \frac{-a + \sqrt{\Delta}}{2}$ و $r_1 = \frac{-a - \sqrt{\Delta}}{2}$ المعادلة المميزة لها حلين حقيقيين هما:	الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$
$\Delta < 0$	المعادلة المميزة لها حلين عقديين مترافقين يكتبان على شكلهما الجري: $r_2 = \rho - i\omega$ و $r_1 = \rho + i\omega$	الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))e^{\rho x}$

ملاحظة:

A و B ثابتان حقيقيتان تحددان بالشروط البدئية (انظر الأمثلة)

يمكن تلخيص مضمون الجدول أعلاه في الخطاطة التالية و التي تبين أهم المراحل الضرورية والكافية لحل معادلة تفاضلية من النوع (E)



الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))e^{\rho x}$ حيث $r_2 = \rho - i\omega$ و $r_1 = \rho + i\omega$ هما الحلين عقديين للمعادلة التفاضلية	الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ حيث r_1 و r_2 هما الحلين ال حقيقيين للمعادلة المميزة	الحل العام للمعادلة (E) يكتب على شكل: $y : x \rightarrow (Ax + B)e^{rx}$ حيث r هو الحل الوحيد للمعادلة المميزة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - أمثلة
مثال رقم 01:

لتكن (E) المعادلة التفاضلية التالية: $y'' - 2y' + 3y = 0$
حدد الحل العام لهذه المعادلة
الحل

المعادلة المميزة لهذه المعادلة التفاضلية هي: $r^2 - 2r + 3 = 0$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(3) = 4 - 12 = -8 = (i\sqrt{8})^2$$

لدينا $\Delta < 0$ ادن المعادلة المميزة لها حلین عقیبین وهم:

$$r_2 = \frac{2+i\sqrt{8}}{2} = 1+i\sqrt{2} \quad \text{و} \quad r_1 = \frac{2-i\sqrt{8}}{2} = \frac{2-2\sqrt{2}}{2} = 1-i\sqrt{2}$$

ومنه الحل العام للمعادلة (E) هو:

مثال رقم 02:

حدد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية $2y'' - 3y' - 2y = 0$
و الذي يحقق الشرطين البدئيين $y(0) = 1$ و $y'(0) = -1$
الحل

المعادلة المميزة للمعادلة $2y'' - 3y' - 2y = 0$ هي كما يلي:

$$\Delta = 3^2 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25 \quad \text{مميز هذه المعادلة المميزة هو: } \Delta > 0$$

ادن المعادلة المميزة لها حلین حقیقیین وهم:

$$r_2 = \frac{3+\sqrt{25}}{4} = 2 \quad \text{و} \quad r_1 = \frac{3-\sqrt{25}}{4} = \frac{-1}{2}$$

ومنه الحل العام للمعادلة التفاضلية (E) هو: $y : x \rightarrow Ae^{\frac{-1}{2}x} + Be^{2x}$ حيث A و B ثابتان حقیقیتان تحددان
بالشروط البدئية: $A = 1$
لدينا:

$$y(0) = 1 \Leftrightarrow Ae^0 + Be^0 = 1$$

$$\Leftrightarrow A + B = 1$$

و لدينا

$$y'(0) = -1 \Leftrightarrow \frac{-1}{2}Ae^0 + 2Be^0 = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{-1}{2}A + 2B = -1$$

لدينا ادن النظمة التالية:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ \frac{-1}{2}A + 2B = -1 \end{cases}$$

من السهل حل هذه النظمة ونحصل على $A = \frac{6}{5}$ و $B = \frac{-1}{5}$

و منه الحل العام للمعادلة التفاضلية (E) و الذي يتحقق الشرطين البدئيين $y(0) = 1$ و $y'(0) = -1$ هو:

$$y : x \rightarrow \frac{6}{5}e^{\frac{-1}{2}x} - \frac{1}{5}e^{2x}$$