

سلسلة 2	النهايات والاتصال	السنة 2 بكالوريا علوم رياضية
<p>تمرين 1 : نعتبر الدالة المعرفة كما يلي : $f(x) = \frac{3-x^2}{1+x^2}$</p> <p>1- حدد D_f حيز تعريف الدالة ثم ادرس زوجيتها.</p> <p>2- تحقق أن : $\forall x \in Df \quad f(x) = -1 + \frac{4}{1+x^2}$</p> <p>3- بين أن f تناقصية قطعاً على $[0; +\infty[$ ثم ضع جدول تغيراتها</p> <p>4- احسب $f([0,1])$ و $f(]2,3])$ و $f(]-2,0])$ و $f(]-\infty,-1])$ و $f(]1,+\infty[)$ و $f(]-3,2])$</p>		
<p>تمرين 2 : نعتبر الدالة المعرفة كما يلي : $f(x) = x^3 - 3x + 1$</p> <p>حدد صور المجالات : $I = [0; +\infty[$ و $J = [0; 1[$ و $K =]-\infty; 0[$</p>		
<p>تمرين 3 : f دالة متصلة على مجال $[a, b]$ حيث $\forall x \in [a, b] \quad f(x) > 1$</p> <p>بين أن : $\exists \alpha > 1 / \forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq \alpha$</p>		
<p>تمرين 4 :</p> <p>1. بين أن المعادلة : $x^5 + x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ تقبل على الأقل حلاً في $[-1; 0]$</p> <p>2. بين أن المعادلة : $3 \sin(x) + \cos^2(x) = x$ تقبل على الأقل حلاً في $[0; \pi]$</p> <p>3. بين أن المعادلة : $x^3 + \frac{1}{x} = 3$ تقبل على الأقل حلاً في $[-2; 2]$</p> <p>4. بين أن المعادلة : $x^3 + 3x - 10 = 0$ تقبل حلاً وحيداً في \mathbb{R}</p> <p>5. نعتبر الدالة $f(x) = x^4 + x - 1$ بين أن C_f منحنى الدالة f يقطع محور الأفاصيل في المجال $[-1; 1]$</p> <p>6. نعتبر الدالتين $f(x) = \sqrt{x+1}$ و $g(x) = -x^3$</p> <p>بين أن C_f و C_g يتقاطعان في نقطة وحيدة أفصولها α يحقق : $\frac{-7}{8} < \alpha < \frac{-3}{4}$</p>		
<p>تمرين 5 : لتكن f دالة متصلة على $[0; 1]$ بحيث : $f(0) = 0$ و $f(1) = 1$</p> <p>بين أن : $\exists c \in]0; 1[: f(c) = \frac{1-c}{1+c}$</p>		
<p>تمرين 6 : لتكن f دالة متصلة وموجبة على $[0; +\infty[$ حيث $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = l$ و $l < 1$</p> <p>بين أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل على الأقل حلاً في $[0; +\infty[$</p>		