



Mathématiques : 2 Bac SPC-SVT-STE-STM

Séance 9 (Nombres complexes – Partie 1)

Professeur : Mr CHEDDADI Haitam

Sommaire

I- Introduction aux nombres complexes

1-1/ Définitions

1-2/ Vocabulaire

II- Présentation géométrique d'un nombre complexe

2-1/ Introduction

2-2/ Propriétés des affixes

III- Conjugué d'un nombre complexe

3-1/ Définition

3-2/ Propriétés

IV- Module d'un nombre complexe

4-1/ Définition

4-2/ Propriétés 1

4-3/ Propriétés 2

V- Argument d'un nombre complexe non nul

5-1/ Définition

5-2/ Propriétés

VI- Écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul

6-1/ Définition

6-2/ Propriétés

VII- Opérations sur les formes trigonométriques

VIII- Exercices

8-1/ Exercice 1

8-2/ Exercice 2

8-3/ Exercice 3

8-4/ Exercice 4

8-5/ Exercice 5

8-6/ Exercice 6

I- Introduction aux nombres complexes

1-1/ Définitions

Un nombre complexe est un nombre tel que son écriture est de la forme $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et i est un nombre imaginaire avec $i^2 = -1$.

Les nombres complexes constituent un ensemble est appelé ensemble des nombres complexes, on le note $\mathbb{C}$.

L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni de deux opérations : l'addition notée $+$ et la multiplication notée $\times$, qui ont les mêmes propriétés de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{R}$ (commutativité, associativité).

$$a + bi = a' + b'i \Leftrightarrow (a = a' \text{ et } b = b')$$

Exemple

1-2/ Vocabulaire

Les nombres $1 + i$ et $1 - i$ sont appelés nombres complexes.

En général : un nombre complexe est écrit de la forme $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Le nombre complexe $z' = a - ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est appelé le nombre complexe conjugué de z noté $\overline{z}$.

- Exemple : $\{ z = 3 + 4i$

$$z' = -5 - 2i$$

$$\Rightarrow \{ \overline{z} = 3 - 4i$$

$$\overline{z'} = -5 + 2i$$

L'écriture $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est appelée l'écriture (ou la forme) algébrique de z .

Le réel a est appelé la partie réelle, et on note $Re(z) = a$.

Le réel b est appelé la partie imaginaire, et on note $Im(z) = b$.

1-3/ Opérations dans l'ensemble $\mathbb{C}$

$$z = x + yi, z' = x' + y'i \in \mathbb{C} \text{ avec } x, y, x', y' \in \mathbb{R}$$

Addition dans $\mathbb{C}$

$$z + z' = x + yi + x' + y'i = (x + x') + (y + y')i$$

Multiplication dans $\mathbb{C}$

$$z \times z' = (x + yi) \times (x' + y'i) = (xx' - yy') + (xy' + yx')i$$

L'inverse de z

$$z = a + bi \neq 0 \ ((a, b) \neq (0, 0))$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{\overline{z}}{z \cdot \overline{z}} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$$

Le quotient de z par z'

$$\frac{z}{z'} = \frac{x+yi}{x'+y'i} = \frac{z \times \overline{z'}}{z' \times \overline{z'}}$$

$$\frac{z}{z'} = \frac{xx' + yy'}{x'^2 + y'^2} + \frac{yx' - xy'}{x'^2 + y'^2}i$$

Exemples


II- Présentation géométrique d'un nombre complexe

2-1/ Introduction

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

À tout nombre complexe $z = x + yi$ de $\mathbb{C}$ on lui associe le point $M(x, y)$ de (P) tel que :

$$f(z) = f(x + yi) = M(x, y)$$



Le plan (P) est appelé le plan complexe.

Le point $M(x, y)$ est l'image du complexe $z = x + yi$.

2-2/ Propriétés des affixes

$A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $I(z_I)$ sont 4 points du plan complexe (P) .

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $k(z_B - z_A)$.

Le point I milieu de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \ (k \in \mathbb{R})$ càd $z_C - z_A = k(z_B - z_A)$, d'où les points A et B et C sont alignés ($z_B - z_A \neq 0$).


Exemple

III- Conjugué d'un nombre complexe

3-1/ Définition

Le nombre complexe $z' = x - yi$ est appelé le conjugué du nombre complexe $z = x + yi$

On note $z' = \overline{z} = x - yi$.



3-2/ Propriétés

Soient $z = x + yi$ et $z' = x' + y'i$ deux nombres complexes avec $(x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4$. On a :

$$z + \overline{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$$

$$z - \overline{z} = 2yi = 2i\operatorname{Im}(z)$$

$$z \times \overline{z} = x^2 + y^2$$

$$\overline{(\overline{z})} = z$$

$$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$$

$$\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$$

$$z \in \mathbb{R} \leftrightarrow \overline{z} = z$$

$$z \in i\mathbb{R} \leftrightarrow \overline{z} = -z$$

Exemple

IV- Module d'un nombre complexe

4-1/ Définition

Soit $z = x + yi \in \mathbb{C}$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Le nombre réel positif $\sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ s'appelle le module de z .

On le note $|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

4-2/ Propriétés 1

Soient $z_A = x_A + y_A i$ et $z_B = x_B + y_B i$ et $z_C = x_C + y_C i$ les affixes des points A et B et C avec $z_A \neq z_C$.

On a $AB = z_B - z_A = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

$$\left| \frac{z_B - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AB}{AC}$$

Si $\left| \frac{z_B - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AB}{AC} = 1$ alors le triangle ABC est isocèle en A .

4-3/ Propriétés 2

$$\begin{aligned} |\overline{z}| &= |-z| = |z| = |-\overline{z}| \\ |z + z'| &\leq |z| + |z'| \\ |z| &= 0 \Leftrightarrow z = 0 \\ \left| \frac{1}{z'} \right| &= \frac{1}{|z'|} \text{ et } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \\ |z \times z'| &= |z| \times |z'| \\ |z^p| &= |z|^p ; p \in \mathbb{Z} \text{ et } z \neq 0 \end{aligned}$$

V- Argument d'un nombre complexe non nul

5-1/ Définition

Soit $M(z)$ ($M(z) \neq O \Leftrightarrow z \neq 0$) est un point du plan complexe $\Rightarrow P$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.


Toute mesure α de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ s'appelle argument du nombre complexe non nul z .

On note

$$\arg(z) = \alpha [2\pi]$$

$$\arg(z) = \overline{(\vec{u}, \overrightarrow{OM})} [2\pi]$$

$$\arg(z) = \alpha + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}.$$



5-2/ Propriétés

z et z' deux complexes non nuls :

$$\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{1}{z'}\right) \equiv -\arg(z') \quad [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$$

$$p \in \mathbb{Z} ; \arg(z^p) \equiv p \times \arg(z) \quad [2\pi]$$

$$k > 0 \Rightarrow \arg(kz) \equiv \arg(z) \quad [2\pi]$$

$$k < 0 \Rightarrow \arg(kz) \equiv \pi + \arg(z) \quad [2\pi]$$

VI- Écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul

6-1/ Définition

Soit $z = x + yi$ un nombre complexe non nul tel que $\arg(z) \equiv \alpha \quad [2\pi]$ et $r = |z|$.

Le nombre complexe non nul z s'écrit de les formes suivantes :

$$z = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} (\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

$$[|z|, \arg(z)] = [r, \alpha]$$

Chaque écriture précédente est appelé la forme (ou l'écriture) trigonométrique du nombre complexe non nul $z = x + yi$.

6-2/ Propriétés

$$z = a > 0 \Rightarrow z = [a, 0]$$

$$z = a < 0 \Rightarrow z = [-a, \pi]$$

$$z = bi ; b > 0 \Rightarrow z = [b, \frac{\pi}{2}]$$

$$z = bi ; b < 0 \Rightarrow z = [b, -\frac{\pi}{2}]$$

$$z = [r, \alpha] \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -z = [r, \pi + \alpha] \\ \overline{z} = [r, -\alpha] \\ -\overline{z} = [r, \pi - \alpha] \end{array} \right.$$

VII- Opérations sur les formes trigonométriques

z et z' deux complexes non nuls tel que : $\begin{cases} z = [r, \alpha] = r (\cos \alpha + i \sin \alpha) \\ z' = [r', \alpha'] = r' (\cos \alpha' + i \sin \alpha') \end{cases}$

On a :

$$\begin{aligned}
z \times z' &= [r, \alpha] \times [r', \alpha'] = [r \times r', \alpha + \alpha'] = rr' (\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha')) \\
z^n &= [r, \alpha]^n = [r^n, n\alpha] \\
[1, \alpha]^n &= [1^n, n\alpha] = [1, n\alpha] \Leftrightarrow [(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)] \\
\frac{1}{z'} &= \frac{1}{[r', \alpha']} = \left[\frac{1}{r'}, -\alpha'\right] \\
\frac{z}{z'} &= \frac{[r, \alpha]}{[r', \alpha']} = \left[\frac{r}{r'}, \alpha - \alpha'\right] \\
\Leftrightarrow \frac{z}{z'} &= \frac{r(\cos \alpha + i \sin \alpha)}{r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')} = \frac{r}{r'} (\cos(\alpha - \alpha') + i \sin(\alpha - \alpha'))
\end{aligned}$$

VIII- Exercices

8-1/ Exercice 1

1. Écrire les nombres complexes sous forme algébrique :

$$\begin{aligned}
1 \quad z_1 &= \frac{1}{2-3i} \\
2 \quad z_2 &= \frac{1-i}{3+i} \\
3 \quad z_3 &= \frac{2i}{1-2i} + \frac{(1+i)^2}{i} \\
4 \quad z_4 &= (3+i)(1-5i) \\
5 \quad z_5 &= \frac{3-6i}{3+i} + \frac{4}{3-i}
\end{aligned}$$

8-2/ Exercice 2

1. Donner une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned}
1 \quad z_1 &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\
2 \quad z_2 &= \sqrt{6} - \sqrt{2}i \\
3 \quad z_3 &= \frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{2}i \\
4 \quad z_4 &= (1-i)(-\sqrt{3}+i) \\
5 \quad z_5 &= \frac{1+\sqrt{3}i}{1+i} \\
6 \quad z_6 &= (1+i)^5
\end{aligned}$$

8-3/ Exercice 3

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = 2 - 2i\sqrt{3}$ et $z_B = 2 + 2i\sqrt{3}$ et $z_C = 8$.

1. Donner une forme trigonométrique des nombres complexes z_A , z_B et z_C .
2. Placer les points A , B et C sur le repère.

On pose : $Z = \frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$

3. Déterminer $|Z|$ et $\arg(Z)$.
4. En déduire la nature du triangle ABC .

8-4/ Exercice 4

On considère dans le plan complexe les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = -\sqrt{2}$ et $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i$.

1. Placer les points A , B et C sur un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
2. Déterminer le module et l'argument de $Z = \frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$.
3. Déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}\right)$.
4. Déterminer la forme algébrique puis une forme trigonométrique du quotient $\frac{z_A - z_B}{z_A}$.
5. Déduire $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

8-5/ Exercice 5

Dans le plan complexe, soit $z = x + yi$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$.

On considère le nombre complexe $U = (z - 2i)(\bar{z} - 1)$, et soit M l'image du nombre complexe z .

1. Écrire en fonction de x et y la partie réel et la partie imaginaire de U .
2. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ du plan tels que U est réel.
3. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que U est imaginaire pur.

8-6/ Exercice 6

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

on considère les points A , B , C , D , E et F qui ont pour affixes $z_A = 2$, $z_B = -2i$, $z_C = 2 + 2i$, $z_D = 3i$, $z_E = -3$ et $z_F = -2 + 2i$

1. Représenter les points A , B , C , D , E et F dans le plan complexe.
2. En utilisant la représentation, déterminer l'argument des complexe z_A , z_B , z_C , z_D , z_E et z_F ,