

# Mathématiques : 3ème Année Collège

Séance 11 (Vecteurs et translation)

**Professeur: Mr BENGHANI Youssef** 

#### **Sommaire**

#### I- Les vecteurs

- 1-1/ Vocabulaire
- 1-2/ Égalité de deux vecteurs
- 1-3/ Vecteur opposé
- 1-4/ Somme de deux vecteurs
- 1-5/ Relation de Chasles
- 1-6/ Produit d'un vecteur par un nombre réel
- 1-7/ Propriété des points alignés et des droites parallèles
- 1-8/ Vecteur et milieu d'un segment

#### II- La translation

- 2-1/ Image d'un point par une translation
- 2-2/ Image des figures usuelles par une translation

# **III- Exercices**

- 3-1/ Exercice 1
- 3-2/ Exercice 2
- 3-3/ Exercice 3
- 3-4/ Exercice 4
- 3-5/ Exercice 5
- 3-6/ Exercice 6
- 3-7/ Exercice 7


### I- Les vecteurs

1-1/ Vocabulaire

**Définition** 

Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est caractérisé par trois composantes :

- La direction : la direction de la droite (AB)
- ullet Le sens : de A vers B
- ullet La Longueur : la distance AB



#### Remarque

Tout point A définit un vecteur nul noté  $\overset{
ightarrow}{0}$  , on écrit :  $\overset{
ightarrow}{AA}=\overset{
ightarrow}{0}$  .

# 1-2/ Égalité de deux vecteurs

#### **Propriété**


 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  signifie que :

- ullet  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  ont la même direction  $:(AB)\parallel(CD)$
- ullet A $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  ont le même sens
- ullet  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  ont la même longueur : AB=CD

# Remarque

Si  $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$  tel que les points ne sont pas alignés, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme.

# **Exemple**



# 1-3/ Vecteur opposé

#### **Définition**

Le vecteur opposé d'un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est le vecteur  $\overrightarrow{BA}$ , et on écrit :  $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ 

### Remarque

Deux vecteurs opposés ont la même direction et même longueur, mais ils ont des sens opposés.

#### **Exemple**




### 1-4/ Somme de deux vecteurs

#### **Définition**

La somme de deux vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AD}$  est le vecteur  $\overrightarrow{AC}$  tel que ABCD soit un parallélogramme.

On écrit : 
$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

#### **Exemple**




# 1-5/ Relation de Chasles

# Propriété

Pour tous les points A, B et C, on a :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ 

C'est appelé : Relation de Chasles

Exemple



# 1-6/ Produit d'un vecteur par un nombre réel

#### **Définition**

Soit k un nombre réel et  $\overrightarrow{AB}$  un vecteur non nul.

Le vecteur  $\overrightarrow{AC}$  est le produit du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  par le nombre réel k si  $C \in (AB)$  tel que  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{kAB}$ 

- ullet Si k>0 alors  $AC=\ k$  . AB et  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  ont le même sens.
- ullet Si k<0 alors  $AC=\ k.\ AB$  et  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  ont des sens contraires.

#### **Exemple**

1-7/ Propriété des points alignés et des droites parallèles


### Propriété 1

Si  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{kAB}$  alors A, B et C sont des points alignés.



#### Propriété 2

Si  $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{kMN}$  alors  $(AB)\parallel(MN)$ , on dit que les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{MN}$  sont colinéaires.



#### **Exemple**

1-8/ Vecteur et milieu d'un segment

### **Propriété**

A, B et M sont des points.

M est le milieu de  $\left[AB\right]$  signifie que :

$$\left\{ egin{aligned} \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} = rac{1}{2}\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \stackrel{
ightarrow}{0} \ \overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB} \end{aligned} 
ight.$$



# **Exemple**

# II- La translation


2-1/ Image d'un point par une translation

#### **Définition**

A et B sont deux points distincts.

M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que :

- ullet  $\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AB}$
- ullet ABM'M est un parallélogramme



#### Remarque

Si  $M\in (AB)$  alors M' l'image de M par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$  appartient à la droite (AB).




#### **Propriété**

Soient M et N deux points du plan.

Si M' et N' sont les images respectives des points M et N par une translation, alors  $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$ .

### **Exemple**



# 2-2/ Image des figures usuelles par une translation

# **Propriété**


L'image d'une droite (AB) par une translation est une droite (A'B') parallèle à (AB).

# **Exemple**

### **Propriété**

L'image d'un segment [AB] par une translation est un segment [A'B'] de même longueur.


# **Exemple**



# **Propriété**

L'image d'un angle  $\widehat{ABC}$  par une translation est un angle  $\widehat{A'B'C'}$  de même mesure.


#### **Exemple**



### **Propriété**

L'image d'un cercle  $(\mathscr{C})$  par une translation est un cercle  $(\mathscr{C}')$  de même rayon.

# **Exemple**



# **III- Exercices**

### 3-1/ Exercice 1

Exprimer le plus simple possible les expressions suivantes :

$$\bigcirc \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = \ \bigcirc \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DB} = \ \bigcirc \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{OA} = \ \bigcirc$$

$$\underbrace{ \left( \!\!\! \begin{array}{c} \stackrel{\textstyle \bullet}{OA} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{DO} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AB} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{CD} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{BC} = \\ \stackrel{\textstyle \bullet}{O} \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AD} - \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{FD} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{ED} - \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AF} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{BE} + \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AB} = \\ \stackrel{\textstyle \bullet}{O} \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AD} \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{AD} - 2 \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{DA} - 2 \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{DA} - 2 \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{DA} =$$

### 3-2/ Exercice 2

On considère un triangle ABC.

Construire les points K, L, M et N tel que :

$$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$$
 $\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 
 $\overrightarrow{AM} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ 
 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ 

### 3-3/ Exercice 3

ABC est un triangle

- 1. Construire le point M l'image du point C par la translation qui transforme A en B.
- 2. Construire le point N tel que :  $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$
- 3. Montrer que le point C est le milieu du segment [MN].

### 3-4/ Exercice 4

EFG est un triangle et le point I est le milieu de [EG] et le point H est le symétrique du point F par rapport au point I.

Soit t la translation qui transforme E en F.

- 1. Construire le point K l'image de G par la translation t.
- 2. Montrer que G est l'image de H par la translation t.
- 3. En déduire que G est le milieu de [HK].

Soit (C) le cercle de diamètre HK.

4. Déterminer l'image du cercle (C) par la translation t.

### 3-5/ Exercice 5

Soient A, B, C et D des points dans le plan.

- 1. Prouver que les point B, C et D sont alignés si  $5\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$ .
- 2. Prouver que les point A, C et D sont alignés si  $\overrightarrow{7BC} = \overrightarrow{4BA} + \overrightarrow{3BD}$ .

# 3-6/ Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- 1. Construire les points D et E tel que  $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{AB}$ .
- 2. Montrer que :  $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$  et  $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ .
- 3. En déduire que les points A, E et D sont alignés.

#### 3-7/ Exercice 7

EFG est un triangle et O est le milieu de [FG].

On considère t la translation qui transforme E en  $\mathcal{O}$ .

- 1. Construire les points A et B tel que A est l'image de F par la translation t et  $\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{EG}+\overrightarrow{EO}.$
- 2. Prouver que B est l'image de G par la translation t.
- 3. Déterminer l'image de la droite (EF) par la translation t.
- 4. Montrer que  $\widehat{FEG} = \widehat{AOB}$ .

Soit K un point tel que :  $\overrightarrow{FK} = -2\overrightarrow{EO}$ .

- 5. Construire le point K.
- 6. Montrer que les points A, K et F sont alignés.