

Sommaire**I- Projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite****1-1/ Vocabulaire****1-2/ Définition****1-3/ Cas particulier****II- Théorème de Thalès direct et réciproque en utilisant la projection****2-1/ Théorème de Thalès direct****2-2/ Théorème de Thalès réciproque****III- Conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs****IV- Exercices****4-1/ Exercice 1****4-2/ Exercice 2****4-3/ Exercice 3****4-4/ Exercice 4**


---

**I- Projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite****1-1/ Vocabulaire**

Le point  $M'$  est appelé projection du point  $M$  sur  $(D)$  parallèlement à la droite  $(\Delta)$ .

La droite  $(\Delta)$  est appelée la direction de la projection .

Le point  $M_1$  est appelé projection du point  $M$  sur  $(\Delta)$  parallèlement à la droite  $(D)$ .




## 1-2/ Définition

$(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes en  $O$ .

$M$  est un point du plan  $(P)$ .

La droite qui passe par le point  $M$  et parallèle à la droite  $(\Delta)$  coupe la droite  $(D)$  en un point  $M'$  qui est appelé la projection du point  $M$  sur  $(D)$  parallèlement à la droite  $(\Delta)$ .



## 1-3/ Cas particulier

Si  $(D) \perp (\Delta)$ , le point  $M'$  est appelé la projection orthogonale de  $M$  sur la droite  $(D)$ .

La relation  $p$  est appelé la projection orthogonale dans le plan  $(P)$ .

Si  $(D)$  n'est pas perpendiculaire à  $(\Delta)$ , La relation  $p$  est appelé projection oblique ou simplement projection.

## II- Théorème de Thalès direct et réciproque en utilisant la projection

### 2-1/ Théorème de Thalès direct

#### Énoncé du théorème

$(D_1)$  et  $(D_2)$  sont deux droites sécantes en  $O$ .

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts de  $(D_1)$ .

Soient  $A'$  et  $B'$  deux points distincts de  $(D_2)$  tel que  $(AA') \parallel (BB')$

On a :

$$\frac{OB}{OA} = \frac{OB'}{OA'} = \frac{BB'}{AA'}$$


### Théorème direct de Thalès exprimé en utilisant la projection

$(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes à une troisième droite.

$A$  et  $B$  et  $C$  sont trois points distincts alignés tel que  $(AB)$  n'est pas parallèle à  $(\Delta)$ .

$A'$  et  $B'$  et  $C'$  sont leurs projections respectivement sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$ .

On a :  $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}$



### 2-2/ Théorème de Thalès réciproque

#### Énoncé du théorème

$(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes en  $A$ .

$A$  et  $B$  et  $C$  sont trois points de  $(D)$ .

$A'$  et  $B'$  et  $C'$  sont trois points de  $(\Delta)$  dans le même ordre que  $A$  et  $B$  et  $C$ .


Si  $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}$  alors  $(BB') \parallel (CC')$ .

### III- Conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs

$(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes et  $\overrightarrow{CD} = k \overrightarrow{AB}$  ( le nombre  $k$  s'appelle le coefficient de colinéarité des vecteurs  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{AB}$  )

si  $A'$  et  $B'$  et  $C'$  et  $D'$  sont les projetés respectifs des points  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , et  $D$  sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$ .

Alors on a  $\overrightarrow{C'D'} = k \overrightarrow{A'B'}$ , on dit la projection conserve le coefficient de colinéarité de deux vecteurs.



## IV- Exercices

### 4-1/ Exercice 1

$ABC$  est un triangle et  $I$  est le milieu de  $[BC]$ .

Soit  $D$  un point vérifiant  $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AI}$ .

$E$  est le projeté de  $D$  sur  $(BC)$  parallèlement à  $(AB)$ , et  $F$  est le projeté de  $D$  sur  $(BC)$  parallèlement à  $(AC)$ .

1. Construire une figure.
2. Montrer que  $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{5} \overrightarrow{BI}$  et  $\overrightarrow{CF} = \frac{3}{5} \overrightarrow{CI}$ .
3. En déduire que  $I$  est le milieu de  $[EF]$ .

### 4-2/ Exercice 2

Soit  $ABC$  un triangle et soient  $D$  un point de la droite  $(BC)$  ( $D \notin [BC]$ ), et  $O$  un point du plan tel que  $\overrightarrow{AO} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AD}$ .

Soient  $E$  et  $F$  deux points du plan tels que :

$E$  est le projeté du point  $D$  sur la droite  $(AC)$  parallèlement à la droite  $(OC)$ .  
 $F$  est le projeté du point  $D$  sur la droite  $(AB)$  parallèlement à la droite  $(OB)$ .

1. Montrer que  $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AE}$ .
2. Montrer que  $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AF}$ .
3. Montrer que  $(EF) \parallel (BC)$ .

### 4-3/ Exercice 3

$ABCD$  un parallélogramme et  $E$  un point tel que  $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AC}$ .

$F$  est le projeté du point  $E$  sur  $(BC)$  parallèlement à  $(AB)$ .

1. Montrer que  $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{4} \overrightarrow{CB}$ .
2. Montrer que  $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$ .

Soit  $M$  un point tel que  $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ .

3. Montrer que  $(ME) \parallel (BC)$ .

#### 4-4/ Exercice 4

$ABC$  est un triangle.

Soient  $E$  et  $F$  deux points du plan tels que:  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ .

On considère  $E'$  et  $F'$  les projetés respectifs de  $E$  et  $F$  sur la droite  $(AC)$  parallèlement à  $(BC)$ .

1. Construire une figure convenable.

2. Écrire les vecteurs  $\overrightarrow{AE'}$  et  $\overrightarrow{AF'}$  en fonction de  $\overrightarrow{AC}$ .

3. En déduire que  $\overrightarrow{EE'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{FF'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ .

4. Conclure que  $\frac{\overrightarrow{EE'}}{\overrightarrow{FF'}} = \frac{2}{3}$ .