AlloSchool

Mathématiques : Tronc Commun

Séance 5 (L'ordre dans IR)

Professeur : Mr ETTOUHAMY Abdelhak

Sommaire

I- Ordre et opérations dans l’ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

1-1/ Ordre dans $\mathbb{R}$

1-2/ Propriétés de l’ordre et les opérations

II- Les intervalles – L'encadrement

2-1/ Les intervalles

2-2/ L'encadrement

III- Intersections et réunions d’intervalles

3-1/ Intersections d’intervalles

3-2/ Réunions d’intervalles

IV- Valeur absolue d’un nombre réel

4-1/ Définition

4-2/ Propriétés de la valeur absolue

4-3/ Distance et valeur absolue

V- Approximation – Approximation décimale

5-1/ Approximation

5-2/ Approximation décimale

VI- Exercices

6-1/ Exercice 1

6-2/ Exercice 2

6-3/ Exercice 3

6-4/ Exercice 4

I- Ordre et opérations dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

1-1/ Ordre dans $\mathbb{R}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$

- Si $a \leq b$ alors $(a-b) \leq 0$, on dit que $(b-a) \in \mathbb{R}^-$
- Si $a < b$ alors $(a-b) < 0$, on dit que $(b-a) \in \mathbb{R}^{-}*$
- Si $a \geq b$ alors $(a-b) \geq 0$, on dit que $(b-a) \in \mathbb{R}^+$
- Si $a > b$ alors $(a-b) > 0$, on dit que $(b-a) \in \mathbb{R}^{+}*$
-

Exemple

1-2/ Propriétés de l'ordre et les opérations

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Si $a \leq b$ et $b \leq c$, alors $a \leq c$ (l'ordre est transitive).

Si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$ et $a - c \leq b - c$.

Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + d$ (l'ordre est compatible avec l'addition).

Si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $a \times c \leq b \times c$ et $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$.

Si $a \leq b$ et $c < 0$, alors $a \times c \geq b \times c$ et $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$.

Si a et b sont non nuls et de même signe, on a : $a \leq b$ équivaut à $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

Si a et b sont positifs, on a $a \leq b$ équivaut $a^2 \leq b^2$.

Si a et b sont positifs, on a $a \leq b$ équivaut $a^n \leq b^n$ (avec $n \in \mathbb{N}$)

Si a et b sont positifs, on a $a \leq b$ équivaut $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

II- Les intervalles – L'encadrement

2-1/ Les intervalles

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $a < b$.

Pour les intervalles suivants $[a, b]$ et $]a, b[$ et $[a, b[$ et $]a, b]$, on a :

a et b sont appelés les extrémités des intervalles.

Le nombre positif $b - a$ est appelé la distance entre a et b.

Le nombre positif $b - a$ est appelé la longueur (ou capacité) des intervalles précédents.

Le nombre $x_0 = \frac{a+b}{2}$ représente le centre des intervalles précédents .

Le nombre positif $r = \frac{b-a}{2}$ représente le rayon des intervalles précédents.

Les deux symboles $-\infty$ et $+\infty$ et ne sont pas des nombres.

$\mathbb{R}^{+}* =]0; +\infty[$
$\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$
$\mathbb{R}^{-}* =]-\infty; 0[$

$\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$
$]a; a[= \emptyset$
$\emptyset$ est un intervalle appelé ensemble vide.

2-2/ L'encadrement

Soit $x \in \mathbb{R}$.

Réaliser un encadrement du nombre x, c'est trouver deux nombres réels a et b tel que $a \leq x \leq b$ ou bien $a \leq x < b$ ou bien $a < x \leq b$ ou bien $a < x < b$.

Le nombre réel positif $b - a$ s'appelle l'amplitude de cet encadrement.

III- Intersections et réunions d'intervalles

3-1/ Intersections d'intervalles

A et B sont deux ensembles.

Tous les éléments communs de A et de B constituent l'ensembles noté $A \cap B$ appelé intersection de A et B.

Donc : $A \cap B = \{x / x \in A \; et \; x \in B\}$



3-2/ Réunions d'intervalles

A et B sont deux ensembles.

Tous les élémentsqui appartiennent soit à A ou soit à B constituent l'ensembles noté $A \cup B$ appelé union de A et B.

Donc : $A \cup B = \{x / x \in A \; ou \; x \in B\}$



IV- Valeur absolue d'un nombre réel

4-1/ Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$.

(D) est une droite graduée d'origine O et d'unité de mesure $OI = 1$.

Le point M est un point de (D) dont l'abscisse est x.

La valeur absolue du nombre x est la distance OM, on note $OM = |x|$.

Remarques

$$|-x| \geq 0$$
$$x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$$
$$x \leq 0 \Rightarrow |x| = -x$$
$$|0| = 0$$
$$|-x| = |x|$$

4-2/ Propriétés de la valeur absolue

Pour tout a de $\mathbb{R}$, on a $\sqrt{a^2} = |a|$.

Pour tous a et b de $\mathbb{R}$, on a $|a \times b| = |a| \times |b|$.

Pour tout a de $\mathbb{R}$, on a $|a^n| = |a|^n \ (n \in \mathbb{N})$ et $|a^{-n}| = |a|^{-n} \ (n \in \mathbb{N})$.

Pour tous a et b de $\mathbb{R}$, on a $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Pour tout b de $\mathbb{R}$*, on a $\left|\frac{1}{b}\right| = \frac{1}{|b|}$.

Pour tous a de $\mathbb{R}$ et b de $\mathbb{R}$, on a $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$.

Pour tous a et b de $\mathbb{R}$, on a $|a| = |b|$ équivaut à $a = b$ ou $a = -b$.

Exemple

4-3/ Distance et valeur absolue

Définition

Soit une droite graduée d'origine O.

Notons A d'abscisse a et B d'abscisse b.

Le nombre positif $|b - a|$ est appelé la distance entre les points entre A et B.

On a $AB = |b - a|$.



Propriétés

Soit $x \in \mathbb{R}$ de et $r \in \mathbb{R}^+$

$|x| \leq r$ équivaut à $-r \leq x \leq r$.

$|x| < r$ équivaut à $-r < x < r$.

$|x| \geq r$ équivaut à $x \leq -r$ ou $x \geq r$.

$|x| > r$ équivaut à $x < -r$ ou $x > r$.

$|x - x_0| \leq r$ équivaut à $x_0 - r \leq x \leq x_0 + r$.

On a $[a,b]=[x_0-r,x_0+r]$ avec $x_0=\frac{a+b}{2}$ centre de l'intervalle et $r=\frac{b-a}{2}$ son rayon.

V- Approximation – Approximation décimale

5-1/ Approximation

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $r\in\mathbb{R}^{+}*$.

- On dit que a est une valeur approchée (ou approximation) de x à r près (ou à la précision r) lorsque x vérifie $|x-a|\leq r$.

- On dit que a est une valeur approchée par défaut de x à $b-a$ près lorsque x vérifie $a\leq x\leq b$.

- On dit que b est une valeur approchée par excès de x à $b-a$ près lorsque x vérifie $a\leq x\leq b$.

- On dit que $\frac{a+b}{2}$ est une valeur approchée de x à $\frac{a-b}{2}$ près (ou à la précision r) lorsque x vérifie $a\leq x\leq b$.

Exemple

5-2/ Partie entière

Pour tout nombre réel x il existe un nombre entier relatif unique p tel que $p\leq x<p+1$.

Le nombre p s'appelle la partie entière de x, on note : $E(x)=p$.

5-2/ Approximation décimale

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{Z}$ alors il existe un entier naturel p tel que $n\times10^{-p}\leq x\leq(n+1)\times10^{-p}$), d'où :

Le nombre décimal $n\times10^{-p}$ est appelé approximation décimale par défaut du nombre x à la précision 10^{-p} .

Le nombre décimal $(n+1)\times10^{-p}$ est appelé approximation décimale par excès du nombre x à la précision 10^{-p} .

VI- Exercices

6-1/ Exercice 1

Soient $A=3\sqrt{18}-\sqrt{72}$ et $B=\sqrt{28}+\sqrt{32}-2\sqrt{2}$

1. Montrer que $A-B=\sqrt{2}-2\sqrt{7}$
2. Comparer A et B

On pose $x=2\sqrt{5}-3\sqrt{2}$ et $y=\sqrt{39-12\sqrt{10}}$

3. Montrer que $x\geq0$
4. Calculer x^2 et y^2

5. Comparer $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{y}$

Soient a et b des nombres réels avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$

On pose $X = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $Y = \sqrt{ab} + 1$

6. Montrer que $X^2 - Y^2 = (a-1)(1-b)$
7. Comparer X et Y

6-2/ Exercice 2

Soient a et b deux réels tels que $3 \leq a \leq 9$ et $2 \leq b \leq 7$

1. Encadrer les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ccc} \leq a+b \leq & ; & \leq a-b \leq \\ \leq a \times b \leq & ; & \leq 2a+3b \leq \\ \leq -a+5b \leq & ; & \leq \frac{a}{b} \leq \\ \leq \frac{2a+3b}{-a+5b} \leq & ; & \leq a^2+b^2 \leq \end{array}$$

Soient x et y deux réels tels que $1 \leq x \leq 2$ et $5 \leq y \leq 9$

2. Encadrer les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ccc} \leq x+y \leq & ; & \leq x-y \leq \\ \leq x \times y \leq & ; & \leq \frac{x}{y} \leq \end{array}$$

6-3/ Exercice 3

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ avec $a \in]0;1[$ et $b = \frac{1+\sqrt{a}}{2}$

1. Montrer que $\frac{1}{2} < b < 1$
2. Montrer que $b - 1 = \frac{a-1}{2(1+\sqrt{a})}$
3. En déduire que $|b-1| < \frac{1}{2}|a-1|$
4. Déduire une valeur approchée de $\frac{1+\sqrt{0{,}6}}{2}$ à 2×10^{-1} prés.

6-4/ Exercice 4

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On pose $E = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Montrer que $E - 1 = \frac{-x^2}{\sqrt{1+x^2}+1+x^2}$
2. Montrer que $x^2 + \sqrt{1+x^2} + 1 \geq 2$
3. Déduire que $|E-1| \leq \frac{1}{2}|x^2|$
4. Déterminer une valeur approchée de $\frac{1}{\sqrt{1{,}0004}}$ à 2×10^{-4} prés.