



Mathématiques : Tronc Commun

Séance 12 (Transformations du plan)

Professeur : Mr ETTOUHAMY Abdelhak

### Sommaire

I- Transformations dans le plan

II- Symétrie axiale

III- Symétrie centrale

IV- Translation

V- Homothétie

VI- Propriétés caractéristiques de  $t_{\vec{u}}$ ,  $S_{\Omega}$  et  $h(\Omega, k)$

6-1/ Propriétés

6-2/ Les images de certaines figures géométriques par les transformations

6-3/ Tableau récapitulatif

VII- Exercices

7-1/ Exercice 1

7-2/ Exercice 2

7-3/ Exercice 3

7-4/ Exercice 4

---

## I- Transformations dans le plan

### Définition

Toute relation qui associe à tout point  $M$  du plan  $(P)$  au point  $M'$  de  $(P)$  tel que  $M'$  vérifie une ou plusieurs conditions, on l'appelle transformation du plan  $(P)$ , on la note  $t$  ou  $h$  ou  $r$  ou  $S_{(D)}$  ....

On écrit  $t : (P) \rightarrow (P)$

$$M \mapsto t(M) = M'$$


On dit que le point  $M$  a pour image  $M'$  par la transformation  $t$ , ou encore le point  $M'$  est l'image du point  $M$ .

### Exemple

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan  $(P)$ .

Soit la transformation  $f$  du plan  $(P)$  définie par  $f(M) = M'$  tel que

$$\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}$$




## II- Symétrie axiale

### Définition

La symétrie axiale  $S_D$  de droite  $(D)$  du plan  $(P)$  est la transformation qui transforme tout point  $M$  de  $(P)$  au point  $M'$  tel que la droite  $(D)$  soit la médiatrice du segment  $[MM']$ .

On écrit  $S_D(M) = M'$

### Exemple




## III- Symétrie centrale

### Définition

La symétrie centrale  $S_I$  de centre le point  $I$  du plan  $(P)$  est la transformation qui transforme tout point  $M$  de  $(P)$  au point  $M'$  tel que le point  $I$  soit le milieu du segment  $[MM']$ .

On écrit  $S_I(M) = M'$

### Exemple



**symétrie centrale de centre I**

### Remarques

$S_I(M) = M'$  équivaut à  $\overrightarrow{IM'} = -\overrightarrow{IM}$

$S_I(M) = M'$  équivaut à  $S_I(M') = M$

$I$  est le seul point invariant par la symétrie centrale  $S_I$ , d'où  $S_I(I) = I$ .

## IV- Translation


### Définition

La translation du vecteur  $\vec{u}$  du plan  $(P)$  est la transformation qui transforme tout point  $M$  de  $(P)$  au point  $M'$  tel que le point  $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ .

On note la translation par  $t_{\vec{u}}$

On écrit :  $t_{\vec{u}}(M) = M'$

### Exemple



**translation de vecteur  $\vec{u}$**

### Remarques

$t_{\vec{u}}(M) = M'$  équivaut à le quadrilatère  $ABM'M$  est parallélogramme (avec  $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ )

$t_{\vec{u}}(M) = M'$  équivaut à  $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$

$t_{\vec{u}}(M) = M'$  équivaut à  $t_{-\vec{u}}(M') = M$

Si  $\vec{u} \neq \vec{0}$  aucun point de  $(P)$  est invariant.

Tous les points du plan sont invariant par la translation de vecteur nul

$$\left( \vec{u} = \vec{0} \right)$$

## V- Homothétie

### Définition


L'homothétie de centre un point  $\Omega$  donné du plan ( $P$ ) et de rapport  $k$  est la transformation qui transforme tout point  $M$  de ( $P$ ) au point  $M'$  tel que

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}.$$

On note l'homothétie par  $h(\Omega, k)$

On écrit :  $h(M) = M'$

### Exemple



### Remarques

Si  $h(M) = M'$ , on a  $M$  et  $M'$  et  $\Omega$  sont alignés.

Si  $k = 0$ , on a  $h(M) = \Omega$  (tous les points ont pour image  $\Omega$  - l'homothétie n'est pas intéressante).

Si  $k = 1$ , on a  $h(M) = M$  (tous les points sont invariants - l'homothétie n'est pas intéressante).

Pour cela on prend  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

Si  $k = -1$ , on a  $h(M) = M'$  avec  $\Omega$  est le milieu de  $[MM']$ , l'homothétie  $h$  est la symétrie centrale  $S_\Omega$ , ou encore  $h(\Omega, -1) = S_\Omega$ .

Si  $k > 0$ , on a  $h(M) = M'$  avec  $M' \in [\Omega M)$ .

Si  $k < 0$ , on a  $h(M) = M'$  avec  $M'$  appartienne à la demi droite opposée à  $[\Omega M)$ .

## VI- Propriétés caractéristiques de $t_{\vec{u}}$ , $h(\Omega, k)$

### 6-1/ Propriétés

Soit  $f$  une transformation dans le plan ( $P$ ) tel que pour tous points  $A$  et  $B$  de ( $P$ ) on a  $f(A) = A'$  et  $f(B) = B'$ .

- La transformation  $f$  est une translation si et seulement si  $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ .
- La transformation  $f$  est une homothétie si et seulement si  $\overrightarrow{A'B'} = k\overrightarrow{AB}$  et  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

## VI- Propriétés caractéristiques de $t_{\vec{u}}$ , $S_{\Omega}$ et $h(\Omega, k)$

### 6-2/ Les images de certaines figures géométriques par les transformations

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan  $(P)$  et  $A'$  et  $B'$  leurs images par l'une des transformations suivantes : symétrie axiale  $S_D$  ou symétrie centrale  $S_{\Omega}$  ou translation  $t_{\vec{u}}$  ou homothétie  $h(\Omega, k)$ .

- 1- L'image de la droite  $(AB)$  par les transformations précédentes est la droite  $(A'B')$ , et  $(AB) \parallel (A'B')$ .
- 2- L'image du segment  $[AB]$  par les transformations précédentes est le segment  $[A'B']$ , et  $A'B' = AB$ , sauf l'homothétie ( $A'B' = k \cdot AB$ ).
- 3- L'image du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  par les transformations précédentes est le vecteur  $\overrightarrow{A'B'}$ , sauf l'homothétie  $\left(k\overrightarrow{AB}\right)$ .
- 4- L'image du cercle  $\mathcal{C}(A, r)$  par les transformations précédentes est le cercle  $\mathcal{C}'(A', r)$ , sauf l'homothétie (le cercle  $\mathcal{C}''(A', |k| \times r)$ ).
- 5- L'image de l'angle géométrique  $AOB$  par les transformations précédentes est l'angle géométrique  $A'O'B'$  de mêmes mesure.
- 6- Les transformations précédentes conservent les distance (sauf l'homothétie), et le milieu, et les mesures des angles géométriques, et le coefficient de colinéarité, et le parallélisme, et l'orthogonalité, et l'intersection des figures.

### 6-3/ Tableau récapitulatif

transformation $f \rightarrow$	$S_D$	$t_{\vec{u}}$	$S_\Omega$	$h_{(\Omega, k=2)}$
Figures $\rightarrow$				
Construire les images des figures				
	Images par $S_D$	Images par $t_{\vec{u}}$	Images par $S_\Omega$	Images par $h_{(\Omega, k=2)}$
La droite (AB)				
Le segment [AB]				
Le cercle $C(0,2)$				
Angle géométrique [AIB]				
Le vecteur $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$				
transformation $f \rightarrow$ conserve (oui ou non) $\downarrow$	$S_D$	$t_{\vec{u}}$	$S_\Omega$	$h_{(\Omega, k=2)}$
Les distances				
Le milieu				
Coefficient de colinéarité				
parallélisme				
orthogonalité				
Mesures des angles géométriques				
Intersection des figures				

## VII- Exercices

### 7-1/ Exercice 1

Soit  $\vec{u}$  un vecteur du plan.

$ABCD$  est un quadrilatère du plan tel que  $B$  est l'image de  $A$  par la translation de vecteur  $\vec{u}$  et  $D$  est l'image de  $C$  par la translation de vecteur  $2\vec{u}$ .

1. Montrer que :  $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ .

Soit  $I$  le milieu du segment  $[CD]$ .

2. Montrer que  $ABIC$  est un parallélogramme.

$ABC$  est un triangle.

Pour tout point  $M$  du plan on considère le  $M'$  tel que

$$\overrightarrow{MM'} - 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$$

3. Montrer que  $M'$  est l'image de  $M$  par une translation de vecteur à préciser.

## 7-2/ Exercice 2

1. Exprimer vectoriellement la proposition suivante :  $B$  est l'image de  $C$  par l'homothétie  $h$  de centre  $A$  et de rapport  $k = -\frac{3}{2}$ .
2. Exprimer la relation vectorielle  $\overrightarrow{JK} = \frac{5}{4}\overrightarrow{JL}$  par une homothétie.
3. Déterminer le centre et le rapport de l'homothétie  $h'$  qui transforme  $A$  en  $B$  dans les cas suivants :

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0} \\ 2 \quad \overrightarrow{MB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} \end{array}$$

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan ( $P$ ).

Soit  $T$  la transformation plane qui à tout point  $M$  associe le point  $M'$  tel que

$$\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}.$$

4. Montrer que  $T$  a un unique point invariant  $I$  ( $T(I) = I$ ).
5. Exprimer  $\overrightarrow{IM'}$  en fonction de  $\overrightarrow{IM}$ .
6. En déduire la nature de la transformation  $T$ .

## 7-3/ Exercice 3

$OABC$  est un rectangle.

On considère  $t$  la translation de vecteur  $2\overrightarrow{OA}$ .

Soient  $O'$ ,  $A'$ ,  $B'$  et  $C'$  les images respectives de  $O$ ,  $A$ ,  $B$  et  $C$  par  $t$ .

1. Montrer que  $O'A'B'C'$  est un rectangle.

On considère les points  $M$  et  $N$  du plan définis par  $\overrightarrow{OM} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{O'N} = \frac{2}{5}\overrightarrow{O'A'}$

2. Montrer que  $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{C'N}$ .

## 7-4/ Exercice 4

$ABCD$  est un parallélogramme et  $I$  et  $J$  sont deux points du plan tels que

$$\overrightarrow{CI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB} \text{ et } \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{DC}.$$

1. Construire une figure convenable.
2. Montrer que la droite  $(BJ)$  est l'image de la droite  $(AI)$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .

Soit  $h$  l'homothétie de centre  $I$  et qui transforme  $B$  en  $C$ .

3. Montrer que le rapport de  $h$  est  $k = -2$ .

Soit  $K$  l'image de  $J$  par  $h$ .

4. Montrer que  $\overrightarrow{KI} = 2\overrightarrow{AB}$